328. *L parasema* Ach. var. *convexa* Fr. II.
329. *L. parasema* Ach. (state on beech.) — II.
330. *L. parasema* Ach. var. *enteroleuca* Nyl. (*saxicola*) — I.
331. *L. sabuletorum* Schreb. v. *coniops* Fr. — I.
332. *L. scabrosa* Ach. (*lignicola*) — III.
333. *L. prominula* Borr. var. B. — E. Bot. supp. 2687. f. 1. — I.
334. *L. decipiens* Ach. E. Bot. 870. — IV.
335. *L. vesicularis* Ach. E. Bot. 1139. — IV.
336. *L. amylacea* Ehr. (*saxicola*) *Lich. candidus* E. Bot. 1138. — I.
337. *L. contigua* Fr. var. — I.
338. *Opegrapha atra* Pers. v. *arthonoidea*. — II.
339. *Graphis scripta* Ach. v. *radiata* Leight. br. graph. 29. — II.
340. *G. serpentina* Ach. v. *radiata* Leight. br. graph. 35. — II.
341. *Pertusaria ceuthocarpa* T.B. (variolose or sorediate state) — I.
342. *Isidium microsticticum* T.B. and Pertus. ceuthoc. growing together. — II.
343. *Verrucaria cinerea* Pers. Leight. ang. lich. 39. t. 17. f. 2. — II.
344. *V. punctiformis* Pers. Leight. ang. lich. 41. t. 17. f. 5. — II.
345. *Collema flaccidum* Ach. — II.?
346. *C. crispum* Borr. E. Bot. 2716. f. 1. IV.
347. *Spilonema paradoxum* Born. trois lich. nouv. 4. t. 1. 2.
348. *Rhacodium rupestre* Fr. — I.
349. *Lepraria ochracea* T.B. lich. br. 8. — II.
350. *L. viridis* T.B. l. br. 6. — E. Bot. 2148. — II.

(Schluss folgt.)

Thienemann, Pflanzen Masurens.

(Fortsetzung.)

Salicinae.

Salix pentandra L., fragilis L., alba L., amygdalina L., purpurea L., viminalis L., caprea L., aurita L., Starkeana Willd., stylaris Sering., repens L., rosmarinifolia L. — Populus alba L., tremula L., nigra L.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0727-9

Polygoneae.

Rumex maritimus L., sanguineus L., obtusifolius L., hydrolapathum Huds., acetosa L., acetosella L. — Polygonum bistorta L., amphibium L., lapathifolium L. — Polygonum persicaria L., hydropiper L., minis Huds., aviculare L., convolvulus L., dumetorum L.

Chenopodiaceae.

Atriplex latifolium, patulum. — Chenopodium bonus henricus L., rubrum, glaucum, urbicum, album, hybridum, polyspermum. — Amarantis Blitum L.

Ceratophylleae.

Ceratophyllum demersum L.

Callitricheae.

Callitriche verna L.

Daphneae.

Daphne mezereum L.

Santalaceae.

Thesium ebracteatum Hayne.

Aristolochinae.

Asarum europaeum L.

2. Monopetalae.

Plantagineae.

Plantago major L., media L., lanceolata L.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L. — Lysimachia thyrsiflora L., vulgaris L., nummularia L. — Trientalis europaea L. — Primula officinalis Jacq. — Hottonia palustris L.

Ericaceae,

Vaccinium vitis idaea L., myrtillus L., uliginosum L, oxycoccos L. — Arctostaphylos procumbens E. M. — Andromeda polifolia L. — Calluna vulgaris Salisb. — Ledum palustre L. — Pyrola uniflora L., umbellata L., rotundifolia L., chlorantha Sw., minor L., secunda L. — Hypopithis glabra.

Utricularinae.

Utricularia vulgaris L., intermedia Hayne, minor L.

Orobancheae.

Lathraea squamaria.

Scrophularinae.

Melampyrum nemorosum L., pratense L. — Pedicularis palustris L., sceptrum carolinum L. — Alectorolophus major

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0728-5

Reichb., minor Reichenb. — Euphrasia odontites L., officinalis L. — Veronica scutellata L., anagallis L., beccabunga L., chamaedrys L., officinalis L., prostrata L., latifolia L., spicata L, serpyllifolia L., arvensis L. verna L., triphyllos L., agrestis L., hederaefolia L. — Digitalis grandiflora Lam., (ambigua Lam. ochrocense Lindl.) — Scrophularia nodosa L., aquatica L. — Linaria vulgaris Mill. — Verbascum thapsus L., thapsiforme Schrad., nigrum L.

Solaneae.

Hyoscyamus niger L., β. pallidus häufig. — Datura stramonium L. — Solanum dulcamara L., nigrum L. (nie mit rothen Beeren).

Convolvulaceae.

Convolvulus sepium L., Conv. arvensis L., Cuscuta europaea L., epilinum Weihe.

Polemoniaceae.

Polemonium caeruleum L.

Labiatae.

Mentha sylvestris L, aquatica L., sativa L., arvensis L. — Lycopus europaeus L. — Origanum vulgare L. — Thymus serpyllum L., chamaedrys Fr., acinos L. — Clinopodium vulgare L. — Hyssopus officinalis L. — Nepeta cataria L. — Glechoma hederacea L. — Lamium album L., maculatum L., purpureum L., amplexicaule. — Galeobdolon luteum Huds. — Galeopsis ladanum L., tetrahit L., versicolor Curt., pubescens Bess. — Stachys sylvatica L., palustris L., annua. — Betonica officinalis L — Marrubium vulgare L. — Leonurus Cardiaca L.

Ajugeae.

Ajuga reptans L., genevensis L.

Scutellarinae.

Prunella vulgaris L., grandiflora Jacq. Selten. — Scutellaria galericulata L.

Monardeae.

Salvia pratensis L. Selten.

Borragineae.

Echium vulgare L. — Pulmonaria angustifolia L., officinalis L. — Lithospermum arvense L. — Myosotis palustris With., caespitosa Schultz, sylvatica Hoffm., intermedia Link, arenaria Schrad., sparsiflora. — Anchusa officinalis L. — Lycopsis arvensis L. — Symphytum officinale L. — Asperugo procumbens L. — Echinospermum lappula Lehm. selten. — Cynoglossum officinale L.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0729-3

Gentianeae.

Erythraea Centaurium Pers. — Gentiana cruciata L. selten. Pneumonanthe L., amarella L. — Menyanthes trifoliata L.

Apocyneae.

Vinca minor L., selten.

Asclepiadeae.

Cynanchum Vincetoxicum R.Br.

Oleinae.

Fraxinus excelsior L.

Galieae.

Galium Aparine L., uliginosum L., palustre L., boreale L., sylvaticum L., mollugo L. — Asperula odorata L.

Compositae.

Eupatoriaceae.

Eupatorium cannabinum L. — Petosites officinalis Mönch. — Tussilago Farfara L.

Asteroideae.

Aster Amellus L. — Erigeron canadense L., acre L. — Bellis perennis L. selten. — Solidago Virgaurea L. (In Rademachers Arzneilehre wieder zu Ehren gebracht). — Inula Helenium L., salicina L., britannica L. — Pulicaria vulgaris Gärtn.

Senecionideae.

Gnaphalium arenarium L , sylvaticum L., uliginosum L. — Filago minima Fr., arvensis L. — Antennaria dioica R. Br. — Senecio vulgaris L., sylvaticus L., vernalis Waldst. sehr häufig. Jacobaea L., barbaraefolius Krocker. — Arnica montana L. — Chrysanthemum segetum L. selten, leucanthemum L., inodorum L. — Matricaria chamomilla L. selten. — Tanacetum vulgare L. — Anthemis tinctoria L. sehr häufig, arvensis L., cotula L. — Achillaea Millefolium L., ptarmica. — Artemisia Absynthium L. vulgaris, campestris. — Bidens tripartita L., cernua L. — Xanthium strumarium.

(Schluss folgt.)

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Botanische Section.

1) In der Sitzung vom 13. Oktober hielt Herr Dr. Rosenthal einen Vortrag über Nutzpflanzen. Der Volksinstinct habe

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0730-4

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Thienemann H. W.

Artikel/Article: Pflanzen Masurens 725-728