Die Sporen dieser Steine bewohnenden Varietät sind constant 4zellig und kleiner, als bei obiger *Bil. cinerea*.

ad nr. 223. (p. 537) *Tomasellia* Mass. — Diese neue in Flora 1856 nr. 18 beschriebene Gattung rechtfertigt Mass. *essame compar.* 53 im Verhältnisse zu *Melanotheca* Nyl. durch nachstehende Bemerkung: „, il genere Melanotheca Fèe (*Porodothium* Fr.) „è ottimo, e differisce dalle Tomas: e dalle Parmentarie e dai „Celothelium etc. oltre che pelle spore 4 loculari alla foggia „delle Pyrenula, per la mancanza di peritecii singolari che rav- „volgono e coprono i nuclei independentemente dal sarcotecio, „come in tutti gli altri generi quivi nominati. — Tipo di questo „genere è la *Melan. anomala* Mass. (*Melan. Achariana* Fèe! „*Porodothium* Acharii Fr., *Trypethel anom.* Ach.)" —

ad nr. 140. (p. 536 Zeile 12) der Druckfehler Hepp 140 ist in Hepp 440 zu berichtigen.

ad nr. 343. (p. 537 Zeile 5) zwischen die Worte zwei Nrn. ist: „vorausgehenden" einzuschalten.

Thienemann, Pflanzen Masurens.

(Schluss.)

Cynareae.

Carlina acaulis L. selten; vulgaris. — Centaurea Jacea L., austriaca Willd., cyanus L., Scabiosa L., maculosa tam. — Onopordon Acanthium L. — Carduus crispus L., acanthoides L., nutans L. selten. — Cirsium lanceolatum Scop., palustre Scop., rivulare Allion., oleraceum Scop., acaule Allion. selten, arvense Scop. — Lappa major Gärtn., minor DC., tomentosa Allion. — Serratula tinctoria L.

Cichoriaceae.

Lapsana communis L. — Cichorium Intybus L. — Hypochaeris radicata L. (?), maculata L. — Leontodon autumnalis L. — Picris hieracioides L. — Tragopogon pratensis L., orientalis L. — Scorzonera humilis L. — Taraxacum officinale Wigg. — Lactuca scariola L., muralis Less. — Sonchus arvensis L., oleraceus L., asper Vill. — Crepis tectorum L., biennis L., praemorsa L., paludosa Mönch. — Hieracium Pilosella L., Auricula L., Bauhini Schult., pratense Tausch., echioides L. mintz, murorum L., sylvaticum G., umbellatum L.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0758-2

Die Sporen dieser Steine bewohnenden Varietät sind constant 4zellig und kleiner, als bei obiger *Bil. cinerea*.

ad nr. 223. (p. 537) *Tomasellia* Mass. — Diese neue in Flora 1856 nr. 18 beschriebene Gattung rechtfertigt Mass. *essame compar.* 53 im Verhältnisse zu *Melanotheca* Nyl. durch nachstehende Bemerkung: „, il genere Melanotheca Fèe (*Porodothium* Fr.) „è ottimo, e differisce dalle Tomas: e dalle Parmentarie e dai „Celothelium etc. oltre che pelle spore 4 loculari alla foggia „delle Pyrenula, per la mancanza di peritecii singolari che rav- „volgono e coprono i nuclei independentemente dal sarcotecio, „come in tutti gli altri generi quivi nominati. — Tipo di questo „genere è la *Melan. anomala* Mass. (*Melan. Achariana* Fèe! „*Porodothium* Acharii Fr., *Trypethel anom.* Ach.)" —

ad nr. 140. (p. 536 Zeile 12) der Druckfehler Hepp 140 ist in Hepp 440 zu berichtigen.

ad nr. 343. (p. 537 Zeile 5) zwischen die Worte zwei Nrn. ist: „vorausgehenden" einzuschalten.

Thienemann, Pflanzen Masurens.

(Schluss.)

Cynareae.

Carlina acaulis L. selten; vulgaris. — Centaurea Jacea L., austriaca Willd., cyanus L., Scabiosa L., maculosa tam. — Onopordon Acanthium L. — Carduus crispus L., acanthoides L., nutans L. selten. — Cirsium lanceolatum Scop., palustre Scop., rivulare Allion., oleraceum Scop., acaule Allion. selten, arvense Scop. — Lappa major Gärtn., minor DC., tomentosa Allion. — Serratula tinctoria L.

Cichoriaceae.

Lapsana communis L. — Cichorium Intybus L. — Hypochaeris radicata L. (?), maculata L. — Leontodon autumnalis L. — Picris hieracioides L. — Tragopogon pratensis L., orientalis L. — Scorzonera humilis L. — Taraxacum officinale Wigg. — Lactuca scariola L., muralis Less. — Sonchus arvensis L., oleraceus L., asper Vill. — Crepis tectorum L., biennis L., praemorsa L., paludosa Mönch. — Hieracium Pilosella L., Auricula L., Bauhini Schult., pratense Tausch., echioides L. mintz, murorum L., sylvaticum G., umbellatum L.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0758-2

Dipsaceae.

Succisa pratensis Mönch. — Scabiosa ochroleuca L., arvensis L.

Valerianeae.

Valeriana officinalis L., dioica L. — Valerianella auricula.

Lonicereae.

Linnaea borealis L. — Lonicera xylosteum L. — Sambucus nigra L. — Viburnum Opulus L.

Campanulaceae.

Jasione montana L. — Phyteuma spicatum L. — Campanula cervicaria L., glomerata L, Trachelium L., rapunculoides L., bononiensis L., rotundifolia L., patula L., persicifolia L. — Adenophora lilifolia Ledeb.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.

Polypetalae.

Paronychinae

Herniaria glabra L. — Spergularia rubra Presl. — Spergula arvensis L.

Scleranteae.

Scleranthus annuus L., perennis L.

Alsineae.

Sagina procumbens L., nodosa Bartl. — Arenaria serpyllifolia L., trinervia L. — Holosteum umbellatum L. — Stellaria nemorum L., media Vill, holostea L., glauca With., graminea L. — Cerastium semidecandr. L., triviale Lind., arvense L., sylvaticum Waldst. u. Kit — Malachium aquaticum Fr.

Sileneae.

Dianthus superbus L., arenarius L., deltoides L., carthusianorum L., selten. — Saponaria officinalis L. — Gypsophila fastigiata L., muralis L. — Silene inflata Sm., nutans L., chlorantha Erh. selten, otites Sm., noctiflora L. — Viscaria vulgaris Röhling. — Lychnis alba Mill., rubra Weigel, Flos. cuculi L., Agrostemma Githago L.

Cruciferae.

Thlaspi arvense L., in Rademachers Arzneischatz aufgenommen. — Lepidium ruderale L. — Capsella Bursa pastoris Mönch — Camelina sativa Crtz. — Berteroa incana DC. — Draba verna L. — Cochlearia armoracia L. — Nasturtium

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0759-0

sylvestre R Br., palustre DC. — Turritis glabra L. — Arabis hirsuta Scop., arenosa Scop., thaliana L. — Cardamine amara L. pratensis L. — Sisymbrium officinale Scop., sophia L., Alliaria Scop. — Erysimum cheiranthoides L. — Sinapis arvensis L. — Raphanistrum arvense Wallr. — Neslia paniculata Desv.

Fumariaceae.

Corydalis intermedia Merat., Halleri Willd. — Fumaria officinalis L. — Chelidonium majus L. — Papaver argemone L. dubium L. — Berberis vulgaris L. — Empetrum nigrum L. — Mercurialis perennis L. — Euphorbia helioscopia L., Esula L., Peplus L.

Celastrinae.

Evonymus europaea L., verrucosa Scop.

Rhamneae.

Rhamnus cuthartica L, Frangula L.

Lorantheae.

Viscum album L.

Araliaceae.

Cornus sanguinea L — Hedera Helix L.

Adoxeae.

Adoxa moschatellina L.

Umbelliferae.

Sanicula europaea L. — Eryngium planum L. selten. — Cicuta virosa L. — Aegopodium Podagraria L. — Carum Carvi L. — Pimpinella saxifraga L. — Sium latifolium L. — Oenanthe Phellandrium Lam. — Aethusa Cynapium L. — Libanotis montana All selten. — Seseli annuum L — Angelica sylvestris L. — Peucedanum Oreoselinum Mönch., palustre Mönch. — Pastinaca sativa L. — Heracleum spondylium L. — Laserpitium latifolium L., prutenicum L selten. — Daucus Carota L. — Torilis Anthriscus Gm. — Anthriscus sylvestris Hoffm. — Chaerophyllum temulum L., aromaticum L. Conium maculatum L.

Saxifrageae.

Saxifraga granulata L., tridactylites L., Hirculus L. — Chrysosplenium alternifol. L.

Crassulaceae.

Sedum Telephium L., acre L

Hypericinae.

Hypericum perforatum L., quadrangulare L., tetrapterum Fries, montanum.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0760-1

Oxalideae.

Oxalis Acetosella L.

Droseraceae.

Drosera longifolia L., rotundifolia L.

Parnassinae.

Parnassia palustris L.

Violeae.

Viola palustris L., oderata L., hirta, mirabilis, arenaria Dc., canina L., tricolor L.

Cistineae.

Helianthemum vulgare Gärtn.

Lineae.

Linum catharticum L.

Geraniaceae.

Geranium sylvaticum L., pratense L., palustre L., sanguineum L., pusillum L., columbinum L selten, robertianum L. — Erodium cicutarium Herit.

Balsamineae.

Impatiens Nolitangere L.

Polygaleae.

Polygala comosa Schk., vulgaris L., amara L.

Acerinae.

Acer platanoides L.

Malvaceae.

Malva Alcea L., sylvestris L. selten, rotundifolia L.

Tiliaceae.

Tilia parvifolia Ehrh.

Ranunculaceae.

Delphinium Consolida L. — Aquilegia vulgaris L. — Isopyrum thalictroides L. selten. — Trollius europaeus L. — Caltha palustris L. — Ficaria ranunculoides Mönch. — Batrachium aquatile E. Mey. — Ranunculus Flammula L., Lingua L., auricomus L, cassubicus L, acris L., lanuginosus L., repens L., bulbosus L., sceleratus L., arvensis L. selten. — Myosurus minimus L. — Hepatica triloba Chaix. — Anemone sylvestris L., nemorosa L., ranunculoides L. — Pulsatilla patens Miller., pratensis Mill. — Thalictrum aquilegifolium L., minus L., angustifolium L., flavum L.

Paeoniaceae.

Actaea spicata L.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0761-7

Nymphaeaeae

Nuphar luteum Smith. — Nymphaea alba L.

Ribesinae.

Ribes Grossularia L., rubrum L., nigrum L., alpinum L.

Onothereae.

Epilobium angustifolium R., hirsutum L., parviflorum Retz., montanum L., palustre L. — O Lenothera biennis L. — Circaea alpina L.

Halorrhageideae.

Myriophyllum spicatum L., verticillatum L.

Lythrariae.

Peplis portula L. — Lythrum Salicaria L.

Papilionaceae.

Genista germanica L. — Anthyllis vulneraria L. — Medicago falcata L., lupulina L. — Melilotus officinalis Pers, vulgaris Willd. — Trifolium Lupinaster L., montanum L., repens L., hybridum L., fragiferum L. selten, arvense L., pratense L., medium L., alpestre L., rubens L., procumbens L. — Lotus corniculatus L. — Astragalus arenarius L., glycyphyllos L., pilosus L. selten. — Coronilla varia L. — Vicia sylvatica L., dumetorum L., Cracca L., villosa Roth, tenuifolia Roth., sepium L., sativa L., angustifolia Roth. — Lathyrus sylvestris L., pratensis L. — Orobus tuberosus L., vernus L., niger L.

Amygdaleae.

Prunus spinosa L.

Rosaceae.

Spiraea Filipendula L., ulmaria L. — Crataegus Oxyacantha L. — Pyrus communis L., Malus L. — Mespilus Cotoneaster — Sorbus aucuparia L. — Rosa canina L., tomentosa Smith., rubiginosa L. — Agrimonia Eupatorium L. — Geum rivale L., urbanum L., hispidum Fr. selten. — Potentilla alba L., rupestris L., supina L., anserina L., norvegica L., Tormentilla Schrk, reptans L., argentea L., verna L., opaca L. — Comarum palustre L. — Fragaria vesca L., collina Ehrh. — Rubus saxatilis L., idaeus L., caesius L. selten, fruticosus selten. — Alchemilla vulgaris L. — Aphanes arvensis L.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05976-0762-3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Thienemann H. W.

Artikel/Article: Pflanzen Masurens 756-760