FLORA.

№ 9.

Regensburg: 7. März. **1860.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNG. Hasskarl, die indischen Euphorbiaceen. — GELEHRTE ANSTALTEN UND VEREINE. Verhandlungen der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg. — PERSONAL-NOTIZEN. Ehrenbezeigungen. Todesfälle. — ANZEIGE.

Die indischen Euphorbiaceen nach Miquel's Flora Indiae Batavae I_{II}. 353 — 431. Von Dr. I. K. Hasskarl.

Kaum hatte ich meine letzte Betrachtung der interessanten Arbeit des Herrn Klotzsch über die Euphorbiaceen für die Flora niedergeschrieben, als ich die neuesten Hefte des oben vermeldeten höchst wichtigen und umfangreichen Werkes erhielt, welche auch die Euphorbiaceen befassen; zugleich wurde mir auch ein freundliches Schreiben des Herrn Verfassers, worin derselbe mich auffordert, die Synonymie aufzuklären, die entsanden ist, indem ihm das früher besprochene Werk von Baillon erst nach dem Drucke dieser Abtheilung der Flora Ind. Bat. zugekommen ist. Indem ich mir desshalb vorbehalte, eine ausführliche Besprechung dieser Flora (von welcher gegenwärtig I_I, I_{II} und II fertig vorliegt und deren III. und letzter Band in erster Zeit zu erwarten ist) nach Beendigung des ganzen Werkes in diesen Blättern zu liefern, will ich hier nur den Wünschen des Herrn Verfassers Genüge leisten, indem ich nur einfach referire, zu welchen der Baillon'schen Gattungen die in der Miquel'schen Flora besprochenen Arten gehören. Bei dieser Gelegenheit habe ich bedauernd anzumerken, dass in der Flora eine Menge NNro des Zollinger'schen Herbariums indischer Pflanzen nicht genannt sind, die H. Baillon untersucht hat und von welchem derselbe die Gattung, wozu sie gehören, bestimmt angibt. Dagegen sind wieder von H. Miquel andere NNro. desselben Herbariums angeführt, die H. Baillon nicht vorgelegen zu

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0131-0

haben scheinen, so dass dadurch manche Arten in beiden Werken gegenseitig nicht genauer verglichen werden können. Ich werde hier an die Baillon'sche Anordnung anschliessen, dabei die Zahl der von H. Miquel aufgeführten Arten angeben, die neu aufgestellten Arten aufführen, und, wo es möglich ist, die Synonymie aufklären.

Euphorbia (Miq. Fl. Ind. Bat. I. II. 418 — 422) ist durch 20 Arten repräsentirt, wovon zwei zweifelhafte; da Herr Baillon bei dieser Gattung keine Arten näher angegeben hat, so lässt sich hier keine Synonymie aufstellen; neu ist *E. bimensis* Miq. (Zoll. hrb. 3454) und *E. orbiculata* Miq. (Zoll. herb. 2975). — *Ricinus* (Miq. l. c. 390) zählt 7 Arten, deren mehrere nach Baillon nur Varietäten von *R. communis* sind, als *R. inermis* und vielleicht *R. rugosus* und *spectabilis* (Baillon l. c. 290.) — *Spathiostemon* Bl. (Baill. l. c. 202) ist bei H. Miquel *Adelia* Schreb. (l. c. 388): *Spathiostemon salicinus* Hsskl. = *Adelia neriifolia* Wght. (Miq. l. c. 389. 2.); *Sp. juvensis* Bl. = *Adelia javanica* Miq. (l. c. 388. 1) und *S. cordifolius* Baill. = *Ad. cordifolia* Rxb. (Miq. l. c. 389. 3. Baill. l. c. 293. cnf. Rxb. Fl. Ind.) — *Jatropha* (Miq. l. c. 391) mit 1 Art, die aus Amerika eingeführt ist: *J. multifida* L., ebenso *Janipha Manihot* (Miq. l. c.) = *Manihot utilissima* Pohl. (Baill. l. c. 306). — *Galearia* Zoll. (Miq. l. c. 429, mit *Antidesma* zu der besondern Ordnung *Antidesmeae* Sweet gezogen) mit 7 Arten, wovon *G. phlebocarpa* Mq. (Bennetia R. Br.), *G. Finlaysoni* Mq., *G. affinis* Mq., *G. Jackiana* Mq. und *G. fulva* Mq. (*Cremostachys* Tulasn.) neu. Zu den Bennetien citirt Miq. Wall. cat. 8585 A — D, Baillon dagegen (l. c. 312) Wall. Cat. 8555, wo letzteres wahrscheinlich ein Druckfehler ist. Die *Cremostachys* hat Baillon auch schon zu dieser Gattung gerechnet, die derselbe aber *Bennetia* nennt. — *Curcas purgans* Medic. (Baill. l. c. 314) = *Jatropha Curcas* L. (Miq. l. c. 392). — *Elaeoccoca Vernicia* Jss. (Baill. l. c. 319. 2. Miq. l. c. 384. 1. et 687). — *Ryparia* Bl. ist nur mit 1 Art, *R. caesia* Bl. (Baill. l. c. 339. 1. Miq. l. c. 361. 1. *Aspidandra fragrans* Hsskl. Flora 1859. 638. (Miq. l. c. p. 411) vertreten, während *R. dubia* Bl. (Baill. l. c. 2.) bei Miq. (l. c.) mit Stillschweigen übergangen wird. — *Trigonostemon* Bl. zeigt 2 Arten: *T. serratum* Bl. und *T. heteranthum* Wght. Ic., welche beide auch Baill. (l. c. 341) anführt. — *Aleurites amboinense* W. (Baill. l. c. 347) = *A. triloba* Frst. (Mq. l. c. 385. 1.) — Von *Croton* ist nur *C. Tiglium* L. (Miq. l. c. 379 1) auch bei Baill. (l. c. 361) aufgeführt, die übrigen 11

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0132-6

Arten sind bei Baill. nicht angegeben; neu ist *C. Zollingeri* Miq. (l. c. 381. 8.) = Zoll herb. 963; *C. sumatranum* Miq. (l. c. 381. 9.) (*C. denticulatum* Zoll nec. Bl.) und *C. glabrescens* Miq. (l. c. 382. 11.) = Zoll herb. 2702. — *Codiaeum variegatum* Bl. (Baill. (l. c. 385. 1) = *C. moluccanum* Decsn.; *Cod. obovatum* Zoll. (Baill. l. c. 2.) = *Junghuhnia glabra* Miq. (l. c. 412 et 687), eine neue Gattung, die der Herr Verfasser zwischen *Elaterospermum* Bl. und *Stillingia* aufgestellt hat. Die dritte Art *C. timorense* A. Jss. (Baill. l. c. 3) hat Miq. (l. c.) nicht erwähnt. — *Ostodes* ist bei Miq. (l. c. 384) nur durch *O. paniculata* Bl. (Baill. l. c. 391. 1) vertreten, während die zweite hier angeführte Art: *O. corniculata* Baill. (= Zoll. herb. 471) übergangen ist. — *Baliospermum axillare* Bl. (Baill. l. c. 385. 2) ist die einzige von Mq. (l c. 410. 1) angegebene Art, zu welcher Miq. Zoll. herb. rechnet, die bei Baill. (l. c. 3) als besondere Art *B. Moritzianum* Baill. aufgeführt ist. — *Suregada* (Baill. l. c. 395) ist von Miq. (l. c. 389) als *Gelonium* dargestellt. *Sur. bilocularis* Rxb. (Baill. l. c. 306. 1) = *Gel. bifarium* Wlld. (Miq. l. c. 1); *Sur. glomerulata* Baill. (l. c. 2). = *Gel.* Endl. (Miq. l. c. 390. 2); *Sur. spicata* Baill. (l. c. 3.) = *Gal.* Endl. (Miq. l. c. 3.) — *Elateriospermum* hat bei Baill. (l. c. 398) et Miq. (l. c. 412) nur die beiden Blume'schen Arten. — *Melanolepis* hat ausser der Zollingerschen Art bei Miq. (l. c. 399. 2) noch eine *M.*? *calcosa* Miq. (*Ricinus dicoccus* Rxb., *Folium calcorum* Rumph. IV. p. 129 t. 64), welche Baillon nirgends erwähnt. — *Cleidion* Bl. hat bei Baill. (l. c. 405) et Miq. (l. c. 409) nur 1 Art: *Cl. javanicum* Bl.; ebenso *Trewia nudiflora L.* (Baill l. c. 409. Miq. l. c. 400); dagegen hat Miq. (l. c. 414) die *Tr. macrophylla* Bl., die Baillon (l. c. 409) *Wetria* nannte, *Pseudotrewia* genannt (cf. Hsskl. Flor, 1859. 639). — *Adelia* L. (Baill. l. c. 417) ist nicht *Adelia* Schreb. (Miq. l. c. 388), wie diess oben nachgewiesen ist. — *Cheilosa* Bl. hat bei beiden Autoren (Baill. l. c. 420 et Miq. l. c. 410) nur 1 Art: *Ch. montana* Bl. — *Rottlera* hat bei Miq. mit Einschluss von *Plagianthera oppositifolia* (Miq. l. c. 398), die Baill. (l. c. 424 a.) zu *Rottlera* zieht, 19 Arten aufzuweisen. — Von der von Baillon als *Stylanthus affinis* † bezeichneten, der *Rottlera floribunda* Hsskl. (Baill. l. c. 426. 1. Miq. l. c. 393. 3) verwandten Art (Zoll. herb. 1143, welches Miq. l. c. adnot. nicht gesehen hat), hat nach Miq.'s Angabe Moritzi erklärt, dass sie auf demselben Stamm mit *R. floribunda* wachsen solle. — *R. subpeltata* Baill. (l. c. 423. 12) ist ebenso von Miq. (l. c. 394. 6) genannt,

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0133-2

wird von diesem aber der Untergattung *Stylanthus*, von Baillon der *Euretilera* zugezählt. — *R. ricinoides* A. Jss. (1824) (Baill. l. c. 423. 6) = *R. Zippelii* Hsskl. (Miq. l. c. 394. 8.) — *R. peltata* Rxb. (Miq. l. c. 395. 9) = *R. Zippelii* R. et Zoll. (Zoll. herb. 3119), *R. acuminata* A. Jss. et *R. Blumeana* Decn. (Miq. l. c. 423. 584) sind (Miq. l. c. 395. 11) zu einer Art zusammengezogen. — *R. operiana* Bl. (herb. Lgd. Baill. l. c. 3) ist bei Miq. nicht zu finden, dagegen ist *R. oblongifolia* Miq. Zoll. herb. 245 neu. — *Mappa tomentosa* Bl. (Miq. l. c. 401. 2) ist nach Baill. (l. c. 429. 2) von *M. Tauaria* Spreng. (Miq. l. c.) nicht zu trennen. Von dieser Gattung finden sich bei Miq. 10 Arten, worun R. (*Adenoceras*) *rhynchophylla* Miq. (l. c. 403. 8) neu ist. — *Acalypha* zählt (l. c. 404) 12 Arten, von denen *A. paniculata* Miq. (l. c. 406. 7) neu ist, ebenso wie die zur Miquel'schen Untergattung *Caturus* gehörige *A. bracteata* Miq. = Rmph. III. 107. t. 127? — *Stipellaria Zollingeri* Baill. (l. c. 451. not. Hsskl. Flor. 1859. p. 639) nennt Miq. (l. c. 408) *Bleekeria Zollingeri* Miq. genus nov. — *Cnesmone javanica* Bl. (Baill. l. c. 459, Miq. l. c. 409. 1). — *Tragia hirsuta* Bl. (Baill. l. c. 461. 22. Miq. l. c. 415. 1). — *Aparisthmium javense* Endl. (Miq. l. c. 407. 1. *A. javanicum* Baill. l. c. 468). — *Cladogynos orientalis* Zipp. (Baill. l. c. 479, Miq. l. c. 408. 1); *Calpigyne frutescens* Bl. (Miq. l. c. 407. 1) scheint. Baill. (l. c. adnot.) zu *Cladogynos* zu gehören. — *Coelodepas bantamensis* Hsskl. (Baill. l. c. 653 Hsskl. Flora 1859. 639. Miq. l. 398. 1). — *Adenogynum discolor* Baill. R. et Zoll. (Miq. l. c. 400. 1. Hsskl. Flor. 1859. 638. 639) = *Chloradenia discolor* Baill. (l. c. 472). — *Sajorium* (*Hedracostylus*) *corniculatum* Baill. (l. c. 484 = *Plucknetia corniculata* Prs. (Mq. l. c. 409. 1). — *Dalechampia* (*Cremophyllum*) *bidentata* Bl. (Baill. l. c. 487. citat. Blumei, Miq. l. c. 417. 1) — *Claoxylon* hat bei Miq. (l. c. 385) 9 Arten; *C. spiciflorum* A. Jss. (Baill. 493. 3) = *Cl. indicum* Endl. (Miq. l. c. 1); *Cl. longifolium* Endl. (Miq. l. c. 388. 4. Baill. l. c.); *Cl. affine* Zoll. (herb. 2290. Baill. l. c. 6). = *Mytilicoccus costulatus* Miq. et *grandifolius* Miq. (l. c. 388. t. 2). gen. novum Zoll. Miq. (l. c. 387) „*Claoxyli* habitu sed ovarii inter sepala et petala (sic glandulas dico auctorum) situ nec non singulari capsulae adspectu differens.“ — *Cl. coriaceum* Baill. (l. c. 493. 7). = *Cl. erythrophyllum* Miq. (l. c. 387. 6); neu sind *Cl. rubescens* Miq. (l. c. 7). = Zoll. herb. 3218 und *Cl. glabrifolium* Miq. (l. c. 8). = Zoll. herb. 1328. — *Dodecastemon Teysmanni* (cf. Hsskl. Flor. 1859. 639. Miq. l. c. 360. 1). = *Cyclo-*

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0134-8

stemon serratum Bl. (Baill. l. c 562. 5). = *Pycnosandra* Bl. Mus. II. 191. — *Stillingia sinensis* Lour. (Baill. l. c. 512. 1). = *St. sebifera* Willd. (Miq. l. c. 413. 1). — *St.* (*Excoecaria*) *agallocha* Baill. (l. c. 508. 1). = *Excoecaria agallocha* L. (Miq. l. c. 415); — St (E.) *virgata* Baill. (l. c. 3). = *Excoec.* Zoll. (Miq l. c. 426. 2); *St.* (E.) *oppositifolia* Baill. (l. c 4). *Excoec.* Jck. (Miq. l. c. 3); *St.* (E) *bicolor* Baill. = *Excoecaria bicolor* Zoll. (Miq. l. c. 4.); ausserdem sind noch *E. crenulata* Wght. et *E integrifolia* Rxb. aufgeführt (Miq. l. c. 4. adnot. et 5). — *Carumbium* Rnwdt. (1823 ex Bl. cat. p. 105) = *Omalanthus* A. Jss. (1823) (Baill. l. c. 537), der Reinwardt'sche Gattungsname ist mit Recht daher vorzuziehen; nur hat Miq. als erste Art *C. amboinicum* Miq. (l. c. 413. 1), mein *Pimelodendron amboinicus* (cf. Flora 1859. 640) aufgeführt, das habituell wenigstens davon sehr verschieden ist, sich aber auch durch klappige Knospenlage des Kelches, der zweispaltig und am Grunde fleischig ist, sowie durch grössere Zahl der Staubgefässe auszeichnet (vide Hsskl. Flor. 1859 Clav. analyt Nr. 124). Miquel schliesst aber mein Citat des Rumphius aus (II. 239? t. 83. male). Als zweite Art hat Miq. (l. c. 414. 2) *C. populifolium* Rnw. = *Omalanthus populifolius* Grah. (Baill l. c. 538. 2), dazu zieht er aber auch *Omalanthus Leschenaultianus* A. Jss., eine Art, die Baill. (l. c. 1) als verschieden aufgestellt hat Als 5. Art hat Miq. (l. c. 3) *Carumbium petiolellatum* Miq. (*Omalanthus* Bnth.) und endlich als 4. Art (l. c. 687) *giganteum* Miq. (*Omal. gig.* Zoll. Baill. l. c. 2), von welcher Baill zweifelt, ob sie nicht mit *C. populifolium* zu vereinigen sei. — *Hura crepitans* (Baill. l. c. 542. Miq. l. c. 417.) — *Pachystemon trilobus* Bl. (Baill. l. c. 551. Miq. l. c 417. 1). — *Pierardia* ist mit 3 Arten aufgeführt: *P. dulcis*, die auch von Baill. (l. c. 558) citirt wird; *P. racemosa* Bl. (Miq. l. c. 358. 2. Baill. l. c.) und *P. dasystachya* Miq. (l. c. 3) = Zoll. herb. 751. Von dieser beschreibt Miq. nur die ♀ Blüthenstände ohne Blätter; gehört vielleicht meine *Pierardia rhacodiscus* (*Hemicyclia* Hsskl. Hrt. bog. 43. Miq. l. c. 411. 1) Flor. 1759. 640 zu dieser Art? — *Cyclostemon macrophyllus*, *longifolius* et *mucronatus* Bl. (Miq. l. c. 361. 1 — 3. Baill. l. c. 562. 63. 2). — *Cycl. serratus* Bl. (Miq. l. c. 5). = *Dodecastemon* vid. supra; *Cycl. cuspidatum* Bl. (Baill. l. c. 1.) fehlt bei Miq. — Von *Daphniphyllum* Bl., welches Miq. nebst *Aporosa* als Ordnung *Aporoseae* l. mod. trennt, zählt er *D. glaucescens* Bl. auf (Miq. l. c. 431. 1), während Baill., der dieses auch citirt (l. c. 565. 1) nur *D. Blumeanum*

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0135-4

Baill. = Zoll. herb. 2140 anführt. Ob beide dieselben sein sollen, lässt sich nur vermuthen, nicht aber behaupten, da Miq. das Zoll. herb. nicht citirt. — *Savia* (*Actephila*) *actephila* Hsskl. (Baill. l. c. 571. 1). = *Actephila javanica* Miq. (l. c. 356. 1); als zweite Art findet sich (Miq. l. c. 2) *Act. bantamensis* Miq. = Zoll. herb. 1662 = *Savia bantamensis* Hsskl., welche der *Act. neilgherrensis* Wght. Icon. 1910 (Baill. l. c) verwandt ist. — *Andrachne australis* Zoll. (Baill. l. c. 577. 5, Miq. l. c. 686. 3); *A. australis* M. var.? (Baill. l. c. 4. = Zoll. herb. 2795) = *A. fruticosa* L. (Miq. l. c. 365. 1 nec Baill. l. c 576. 2); ausserdem ist *A. tenera* Miq. (l. c. 2) = *Agyneia tenera* Zoll. herb. 2799. — *Nanopetalum myrianthum* Hsskl. (Miq. l. c. 357. 1, Baill. l. c. 657, Hsskl. Flora 1859, 640). — *Bridelia* sind 4 Arten bei Baill. (l. c. 583. 1 et 584. 6. 8. 9.) und Miq. (l. c. 364. 1 — 4) gleich; 2 neue Arten finden sich aber bei Miq: *Bridelia Zollingeri* Miq. = Zoll. herb. 8782; diess ist aber wohl Druckfehler, da die Nummern des Zoll. herb. nicht so hoch steigen, wäre es 2882, dann würde es *Glochidion* sp. 43 (Baill. l. c. 638) sein; sodann *Bridelia*? *diversifolia* Miq. — *Flüggea* zählt ausser der *F. microcarpa* Bl. (Baill. l. c. 592. 4. Miq. l. c. 356. 1) noch *F. javanica* Bl. und eine neue Art: *F.*? *serrata* Miq. (l. c. 3). — *Bischofia* Bl. hat bei Miq. (l. c. 363. 1) nur eine Art, die *B. javanica* Bl. welche auch Baill. (l. c. 595. 5) anerkennt, dagegen ist die von Miq. hinzugezogene *Andrachne trifoliata* Rxb. als *B. Roeperiana* Baill. (l. c. 1) aufgeführt. — *Leiocarpus* Bl. (Baill. l. c. 655 et 596 vid. Hsskl. Flora 1859. 640, Miq. l. c. 352) hat bei beiden Autoren übereinstimmend die zwei Arten Blume's. — *Adenocrepis javanica* Bl. (Baill. l. c. 601, Miq. l. c. 357. 1); Baill. sagt aber ausdrücklich, dass zu dieser Gattung noch Zoll. herb. 3048 (flor. 6-andr.) et ibid. 1517 (flor. 4-andr.) gehören, die bei Miq. (l. c.) nicht erwähnt sind. — Von *Antidesma*, welches Miq. (l. c. 422) nach Sweet von den Euphorbiaceen trennt, ist nur *A. diandrum* Sprng. (l. c. 602. Miq. l. c. 426. 6) bei beiden aufgeführt; die übrigen 21 Arten bei Miq. sind bei Baill. nicht erwähnt; neu sind keine Arten und *A. litorale* Bl. wird aus der Gattung und wohl auch aus der Verwandtschaft der Euphorbiaceen ausgestossen. — *Kirganelia dubia* Baill. (l. c. 614. 4) = *Anisonema dubium* Bl. (Miq. l. c. 375. 1), ebenso *K. eglandulosa* Bl. (l. c. 5). = *A. eglandulosum* Bl. (Miq. l. c. 2) und *K. intermedia* Baill. (l. c. 3) = *A. intermedium* Bl. (Miq. l. c. 3); neu ist *K. Zollingeri* (*Anisonema* Miq. l. c. 4) Hsskl. *K. timoriensis* Decn. (Baill. l. c. 614. 2., Miq. l. c. 373. 1). — *Cicca*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0136-0

disticha L. (Baill. l. c. 618. 1) = *C. nodiflora* Lam. (Miq. l. c. 372. 1) — *Phyllanthus* (*Euphyllanthus*) (Baill. l. c. 624) zählt (Miq. l. c. 368) 4 Arten, nebst einer neuen *P. acutissimus* Miq. (*Scepasma longifolium* Hsskl.) deren Baill. keine Erwähnung thut. *Ph.* (Emblica) *Emblica* L. Baill. (l. c. 627. 1) = *Emblica officinalis* Grtn. (Miq. l. c. 372. 1); *Ph.* (Ceramanthus) *gracilis* Baill. (l. c. 630) = *Ceramanthus gracil.* Hsskl. Miq. (l. c. 372. 1). — *Agyneia impubes* Vent. (Baill. l. c. 631. 1) an *A. impubera* Miq. (l. c. 367. 4); *A. bacciformis* A. Jss. (Baill. l. c. 2. Miq. l. c. 1), weitere Arten hat Baill. nicht angegeben, Miq. hat aber noch 6 andere Arten, wovon *A. orata* Miq. neu und die drei letzten: *A. hirsuta*, *dioica* und *pinnata* Miq. (l. c. 368. 6 — 8) von Baill. (l. c. 638. 15 — 17) zu *Glochidion* gerechnet werden. — Von *Melanthera* (Baill. l. c. 633. Miq. l. c. 370) sind die Arten übereinstimmend, nur hat Miq. noch *M. anceps* Miq. = *Phyllanthus anceps* Vhl. und *M. rupestris* Miq. neu. — Von *Sauropus* hat Miq. ausser den beiden Blume'schen Arten (Baill. l. c. 635. 2. 5) auch die beiden von mir in der Retzia beschriebenen aufgeführt. — *Glochidion* befasst bei Miq. (l. c. 376) 15 Arten, von denen neu sind: *Gl. villosum* Miq., was von *Gl. molle* Bl. (Baill. l. c. 638. 32) getrennt ist, welche Baill. vereinigt hat = Zoll. herb. 1543; *Gl. fulvirameum* Miq. = Zoll. herb. 1146. 3538; *Gl. Zollingeri* Miq. (l. c 686. 4. 6). = Zoll. herb. 2260; *Gl. cyrtostylum* Miq. = Zoll. herb. 1229, 1340, 1773? 2269. Baill. l. c. 42); die übrigen Arten stimmen bei beiden Autoren überein. — *Glochidiniopsis sericea* Bl. (Baill. l. c. 640, Miq. l. c. 375. 1). — *Aporosa* (cf. Hsskl. Flora 1859. 640 Tetractinostigma Hsskl. Miq. l. c. 362) von Miq. in besonderer Ordnung *Aporoseae* aufgeführt; *A. frutescens* Bl. (Miq. l. c. 431. 1, Baill. l. c. 645. 11); *A. aurita* Baill. (l. c. 5. Miq. l. c. 2). — *Epistylium* (*Eriococcus*) bei Mq. (l. c. 373) als *Reidia* Wght. aufgeführt. *E. Roxburghii* Baill. (l. c. 3, Hsskl. Flora 1859. 640) = *Hedycarpus javanicus* Miq. l. c. 359. 1.); *E.* (E.) *gracile* Baill. (l. c. 1). = *Reidia grac.* Miq (l. c. 373. 1); *E.* (E.) *glaucescens* Baill. (l. c. 4) = *Reidia glauc.* Miq. (l. c. 374. 2); *Reidia*? *glabrescens* Miq. (l. c. 3) ist Zoll. herb. 1116 und *Reidia gracilipes* Miq. = Zoll. herb. 1553, welche Nr. Baill. (l. c. 1) zu *Epistylium gracile* Baill. zieht. — *Scepasma buxifolia* Bl. (Baill. l. c. 649 Miq. l. c. 378. 1). — *Euchidium* Jck. (Baill. l. c. 652) ist von Miq. (l. c. 363) an der Spitze der *Phyllantheae* angeführt; Baill. zählt diese Gattung zu den *Euphorbiaceae* incertae sedis und Miq. hat schon (l. l. 969) das-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0137-6

selbe Citat Rumph's zu *Actinodaphne Rumphii* Bl. citirt, was stets bei *Euchidium* erwähnt ist, nur hier mit dem Druckfehler t. 160? statt 106 (cf. Hasskl. Flor. 1859. 655. adnot.) — *Echinus Lour.* (Baill. l. c. 659. gen. incrt. sed.) „vix hujus ordinis" Miq. (l. c. 598). — *Sarcococca* Lndl. (Baill. l. c. 667 bei den Buxaceen) steht bei Miq. (l. c. 357) zwischen *Adenocrepis* und *Pierardia* und ist durch eine Art vertreten. — *Hedycarpus* Jck. (Baill. l. c. 668 bei den Sapindaceen) steht bei Miq (l. c. 259) nach *Pierardia* und hat hier 4 Arten, deren letztere unter dem Namen *H. javanica* Mlq. (l. c. 3) dieselbe Pflanze ist, die ich im Hort. bog. I. 61 als *Hedycarpus*? beschrieben habe und die ich (Flora 1859 640) zu *Epistylium Roxburghii* Baill. (l. c. 648. 3) gezogen habe; s. oben. Die beiden andern Arten sind *H. malayanus* Jck. und eine neue *H. lanceolatus* Miq. (l. c. 2) = Zoll. herb. 3265. — *Periptery gium* Hsskl. (Baill. l. c. 668) = *Cardiopteris* Wll. (Miq. l. c. I. I. 798).

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Sitzung der königlich bayerischen botanischen Gesellschaft vom 11. Jan. 1860.

Der Director Dr. Fürnrohr legte die eben aus der Presse hervorgegangene erste Abtheilung des IV. Bandes der Denkschriften der Gesellschaft, welche ausser den Statuten und dem Mitgliederverzeichnisse Abhandlungen von E. v. Martens, H. Schacht, Wydler, Gümbel und Reinsch enthält, vor, und stellte den Antrag, dass dieselbe demnächst als Geschenk den mit der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vereinen mitgetheilt, ein Theil der Exemplare aber auch dem Buchhandel übergeben werden solle, womit die Gesellschaft sich einverstanden erklärt.

Derselbe erstattet Vortrag über die verschiedenen Sammlungen von Zellenpflanzen in dem Herbarium der Gesellschaft. „Seit zwei Jahren war es eine Lieblingsbeschäftigung in den mir nur sparsam zugewiesenen Mussestunden, die verschiedenen Sammlungen von Kryptogamen, welche unsere Gesellschaft theils durch den Fleiss ihrer Mitglieder, theils durch grossmüthige Geschenke, theils durch Ankäufe nach und nach zusammengebracht hat, einer genauen Durchsicht zu unterwerfen, und das reichhaltige, aber vielfach zersplitterte Materiale zu einem systematischen Ganzen, nach den neuesten Bestimmungen der Wissenschaft, an einander zu reihen. Ich

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0138-1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: 43

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: Die indischen Euphorbiaceen nach Miquel's Flora Indiae Batavae 129-136