FLORA.

№ 19.

Regensburg. 21. Mai. **1860.**

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNG. Palacky, die Schimpersehen Pflanzen aus Abyssinien nach der Bestimmung von A. Richard. — ANZEIGE der für die k. botanische Gesellschaft eingegangenen Beiträge. — Berichtigung.

Die Schimper'schen Pflanzen aus Abyssinien, nach der Bestimmung von A. Richard im Tentamen Fl. Abyss. zusammengestellt von Dr. Palacky.

Clematis glaucescens Fresen. = Nr. (Schimpers) 212 u. 1481.
„ longicauda Steud. = Nr. 1284.
„ simensis = 395 et 1512.
Thalictrum rhynchocarpum (= longepedunculatum St.) = 558, 1137, 1858.
Ranunculus oreophytus (= tenuirostris St.) = 1308.
„ Schimperianus = 1175.
„ destropodius St. 754.
„ oligocarpos St. 553.
„ stagnalis St. 554.
„ steneocarpus St. 985.
„ distrias St. 1258.
„ striatus St. 140.

Stenaphia abyssinica Rich. (= Menispermum Schimperi St. = 178. (bei Kotschy It. nub. 182.
Chasmanthera dependens = 654, 1666.

Caylusea abyssinica (Astrocarpus Hochst., Reseda Fresenius) = 1927.

Arabis cuneifolia = 997.
„ falcata (Braya Hochst.) = 1309 et 93.
Cardamine pusilla = 1311.
„ trichocarpa Hochst. =
„ obliqua H. = 989.
„ hirsuta (= var. simensis H.) 552 et 571.
Erysimum amplexicaule = 586 pro p.
Lepidium abyssinicum H. = 741.
Brassica amplexicaulis H. = 586 pro p.
Crambe hispanica L. (= juncea H.) = 1249.
Erucastrum arabicum = 1099.

Cleome monophylla = 1924 et 1731. (= subcordata.)
Boscia senegalensis (= angustifolia Rich. Tent. fl. seneg.) 723.
„ reticulata H. 1835.
Cadaba glandulosa (= mollis St.) = 1028.
Maerua angolensis (= lucida 1410. = retusa 905).

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0291-3

Roumea abyssinica (612 = Flacourtia obtusata.)
Aberia verrucosa 1594.
Polygala rupicola H. 354.
„ quartiniana 615 (= stenoptera Fres.)
„ petitiana (= tetrasepala H.) = 1188, 1656.
„ abyssinica R. Br. (= adoensis H.) = 1109.
„ granulata 1225 (= punctulata 20).
Lophostylis angustifolia H. (15, Securidaca longipedunculata Fres.)
„ oblongifolia = 771.

Pittosporum abyssinicum = 946, 1122, 1313.

Dianthus leptoloma = 1761.
„ longiglumis (= abyssinicus R. Br.) 841 et 994.
Silene flammulaefolia St. 676.
„ macrosolen St. 651.
Cerastium glomeratum 1379.
„ octandrum H. 1641.
Hebelinia abyssinica H. 302 (= spathulaefolia = 569.)
Arenaria rubra H. 1089.
Sagina abyssinica H. 1148.
Alsine Schimperi 549, 1892.
Glinus lotoides 1772.

Linum gallicum (= abyssinicum H. 1107.
„ strictum = 70.

Pavonia Schimperiana (tomentosa H.) 1405 (= 926.)
Lebretonia acuminata (= Pavonia crenata H.) 1498, 1910 = 364 (in sch. Urena mollis.)
Hibiscus adoensis 341, 1863.
„ dongolensis 1681.
„ macranthus H. 362, 1883.
„ modaticus H. 1029.
„ corymbosus H. 787.
„ crassinervius H. 646. (= eriospermus. H. 130.)
„ grandifolius 516, 1717.
Gossypium punctatum (= religiosum H. 691.)
Sida rhombifolia (= riparia 1103).
„ Schimperiana H. 305.
„ permutata 1911.
Abutilon laxiflorum (= Wissadula heterosperma) = 1502.
„ bidentatum (Sida in sch. 1003.)
„ longicuspe (Sida H. 258, 1511.)
Lagunea abyssinica 1676.

Hermannia quartiniana (Mahernia abyssinica 1103).
Dombeya Bruceana (Pentapetes, Xeropetalum Br. 378.
„ Schimperiana (hirsuta) 845.
Sparmannia abyssinica 567.
Corchorus trilocularis (1423).
„ tridens (= quinquenervius H. 1465.
„ quinquenervius 1454.
„ muricatus 1191.
Triumfetta flavescens 1020, 1442, 1794.
„ trichoclada (= Schimperi 368), 774, 1455.
„ trichocarpa 1204, 1682, 1683.
„ cuneata 1445, 1460, 1756.
Grewia corylifolia 878, 1278.
„ discolor Fresen. (= pallida H. 727.)
„ ferruginea 183, 215 (= columnaris 967.)
„ velutina 966.
„ carpinifolia (= tembensis 831.)
„ trichocarpa 1216.
„ parvifolia 978.

Apodytes acutifolia 1315.
Ximenia americana 876.
Balanites aegyptiaca 1022.

Hypericum intermedium 1062.
„ leucoptychoides = 834 et 1177.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0292-9

Hyperic. Roeperianum 886.
„ Schimperi 132, 1160.
Hippocratea Schimperiana 35.
Cardiospermum clematideum (= molle 791.)
Schmidelia africana (Alloptilus Palis., S. abyssinica H., Azumara trifoliata 377.)
„ rubifolia 1613, 1699.
Dodonaea viscosa (arabica 705, 314.)

Ekebergia Rüppelliana Rich. (Trichilia Fres.) 284.
Turrea abyssinica H. 28 et 191.
Schizocalyx coriaceus H. 1744.

Cissus cyphopetala Fr. 267.
„ subdiaphana St. 802 et 1646 part.
„ adenocaulis St. 1646 part. 1703.
„ serpens 1702.
Vitis abyssinica 1715.
„ Schimperiana 1725.
„ erythodes 198.
„ oxyphylla (Cissus Schimperi 180.

Erodium cicutarium 1488.
Geranium simense (670; = frigidum 1061.)
„ latistipulatum 1873.
„ favosum 806.
Pelargonium quinquelobatum H. 792.
„ multibracteatum H. 1489.
Impatiens tinctoria Rich. (flagellifera 1591.)
„ micrantha 1151.
Biophytum abyssinicum 1206.
Oxalis procumbens 1165.
„ obliquifolia 1643.
Tribulus terrestris 1131
Teclea nobilis Rich. = Aspidostigma acuminatum H. 1293.
Ochna leucophlaeos H. 1408.
Celastrus luteolus = sinuatodentatus 840
„ serratus H. 1908.
„ obscurus (edulis H.) 129.
„ Schimperi 118
Celastrus arbutifolius H. 832.

Catha Forskalii = Trigonotheca serrata H. = 649.
Zizyphus abyssinicus (= xylopyrus 713) = 1694.
Rhamnus pauciflorus H. 1276.
Odina triphylla H. 891.
„ Schimperi H. 657. et 1281.
„ fruticosa 707.
Rhus vimin ale (= retinorhoea St. 1 627, 331, 742.
„ glutinosum H. 851.
„ pyroides (= villosum H.) 1339.
Ozoroa insignis Rich. (= Anaphrenium abyssinicum H. 706, 1342.

Crotalaria glauca (= ecutifolia 829.)
„ lachnophora H. 780.
„ Schimperi H. 494.
„ recta H. 1083. 1894.
„ macrostipula H. 708.
„ carinata 519, 772.
„ astragalina H. 808, 1495.
„ melilotoides H. 1213.
„ cephalotes H. 695.
„ spinosa 150, 1540.
„ lotoides 1190.
„ macropoda 1611.
Phyllocalyx quartinianus 860.
Leobordea abyssinica 1493.
Ononis Cherleri 1102, 1543. (parvula).
Argyrolobium abyssinicum (= Tephrosia modesta 809) = 1348.
„ remotum 1324.
„ Schimperianum (dasycarpum, Cytisus S. St.) 990, 1326.
Trifolium petitianum = Trigonella caespitosa 1389.
„ cryptopodium 556.
„ acaule 587.
„ subrotundum St. 303. (= 64 Trigonella marginata.)
„ Schimperi = Trigonella S. 86 Lotospermum S. 1988.
„ multinerve (Trigonella). 300.
Lotus brachycarpus St. 242.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0293-5

Indigofera deflexa 1467 (14 Ktsch. It. nub.)
,, stenophylla St. 1711.
,, parvula Del. 269.
,, oligosperma (melanotricha St. 761.)
,, viscosa 1475 = glutinosa 1205.
,, endecaphylla = Schimperiana 1085.
,, argentea 1854, 1017.
,, emarginella H. 735, 1723, 1893.
Tephrosia interrupta 844, 1546. = dichrocarpa 102.
,, bracteolata (= Kotschyana 1678).
,, fulvinervis 1939.
,, apollinea DC. (anthylloides 1614 = N. 87 Ktsch. It. nub.
,, decidua 1011.
Sesbania (Berebera) ferruginea 279 = Inga byrsinocarpa 536.
,, punctata (filiformis) 730, 775.
Astragalus abyssinicus H. 232 et 1736.
,, venosus 190, 1067, 1235 = tigrensis H. 241.
Biserrula leiocarpa St. 1762.
Cicer cuneatum 810, 1545.
Pisum abyssinicum 1866.
Ervum lens 1878.
Vicia sativa (angustifolia 291.)
Lathyrus sativus 958, 1950.
Scorpiurus echinata 385, 1871 = sulcata 308, = subvillosa 1050.
Helmintocarpon abyssinicum = Anthopetitia cancellata St. 1108).
Zornia glochidiata (= angustifolia 305.)
Aschynomene Schimperi 1673.
Smithia sensitiva (abyssinica 1838.)
Anarthrosyne abyssinica 1434. = Desmodium ospriostreblum St. 1039.
Desmodium Schimperi 857.
Acrotaphros bibracteata St. 1298.
Alysicarpus ferrugineus H. 306.
,, Hochstetteri (rugosus 1049.)
Antopetitia abyssinica 113 = Ornithopus coriandrinus.
Clitoria ternatea 1009, 1617, 1736.
Glycine moniliformis 703.
,, micrantha H. 8.
,, abyssinica H. 1057.
Erythrina Kuara (= tomentosa) . 531.
Phaseolus quadriflorus 1426.
Vigna membranacea 352.
,, opisotricha (Phaseolus 1718.)
Dolichos biflorus 508.
,, uniflorus 384.
,, debilis H. 1440, 1472.
,, formosus 52 et 226.
,, stenocarpus 1450.
Esiosema longipedunculatum 925.
,, tuberosum 1202.
,, cordifolium 1542.
Rhynchosia elegans (Glycine 88, 518.) Dalbergia (Philenoptera) 51, Schimperi 897, 1802.
Pterocarpus abyssinicus 1597, 1668, = Dalbergia praecox 890.)
Virgilia aurea 200, 278, 1898.
Entada abyssinica 520
Inga malacophylla (Acacia) 521, 1578 (= sericocephala = Acacia s. Ktsch. It. nub. 294.)
,, Isenbergiana Schimper 275.
,, nefaria 940.
Acacia arabica = abyssinica 1813, Habbas 382, Adansonii 530.
,, stenocarpa 1948, = giraffae 218.
,, spirocarpa 502, 612, 658.
,, pterygocarpa 1086.
,, Cahai 119. et 229.
,, albida (gyrocarpa 1333).
,, mellifera H. 1745.
,, campylacantha 639 et 893.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0294-1

Acacia hekatonphylla St. 628, 884.
,, erythrantha 1120
,, glaucophylla 725 et 1710.
,, triacantha H. 1746.
,, venosa H. 524.
,, sanguinea H. 1567.
,, amythethophylla 887.
Cassia Arere 1770. (= Fistula in sch. 896.)
,, goratensis 29, 1485.
,, occidentalis (H. Sophora 312 in sch.)
,, nigricans 1014.
,, mimosoides 1443 (= nictitans 66.)

Rubus exsuccus St. 867.
Alchemilla cryptantha H. 566.
,, pedata H. 1166.
Rosa abyssinica (= Schimperiana 189.)
Terminalia Brownei Fres. 722. (hemignosta H. 879.
,, confertifolia H. 817.
Combretum trichanthum Fres. 404, 1435, 1579.
,, Schimperianum (Terminalia hirta 582.)
,, collinum Fres. 693, 895.
,, adenogonum H. 1289.
,, ferrugineum Rich. 767.
,, Ruppellianum = reticulatum Fr. 622.
,, lepidotum = glutinosum 1358.

Anogeissus leiocarpa (= Schimperi 1247, = parvifolius 816.)
Poivrea aculeata H. 881.

Epilobium hirsutum 1025, = foliosum 124.
,, Schimperianum 972.
,, fissipetalum H. 1348.
,, stereophyllum H. 544.
Callitriche verna = stagnalis in sch. 136.
Ammania auriculata 1742.
,, attenuata H. 778.
Lythrum thymifolium 1787.
Lythrum rotundifolium 1169.
Grislea uniflora Rich. = micropetala H. 243. et 1906.

Tamarix senegalensis (indica 728.)

Cyrtonema convolvulacea (It. nub. 228 Sch. 1749.)
,, divergens 1677.
Lehneria scrobiculata H. 1625. part. (= Bryonia 164.)
,, longipedunculata 1625 part.
Bryonia micrantha H. 1671.
Momordica dasycarpa H. 1419.
,, pterocarpa H. 187.
,, adoensis H. 116.
Lagenaria vulgaris (idolatrica H.) 1571.
Cucurbita exanthematica H. 1418.

Modecca abyssinica 1572.
Botryosicyos pentaphyllus 1596.

Wormskioldia abyssinica Rich. = Streptopetalum serratum H. 1260.
Talinum cuneifolium 1013.

Paronychia bryoides 661.
Herniaria hirsuta 744. et 1413.
Polycarpea eriantha 823.
Polycarpon tetraphyllum 292.
Pollichia campestris 1106
Scleranthus annuus 111.
Corrigiola littoralis = capensis 1876. in sch.

Comberia abyssinica Rich. = Tillaea pharnaceoides 104.
Umbilicus simensis 1337.
Crassula abyssinica = Rochea dichotoma 931, vaginata 1609.
Kalanchoe Schimperiana 388 = Cotyledon.)
,, glandulosa 904.
Aeonium leucoblepharum = Sempervivum chrysanthum 838.
Sempervivum abyssinicum H 138.

Saxifraga hederaefolia 1305.

Hyrocotyle asiatica 13, 1110.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0295-7

Hydrocotyle natans 34, 1075, 1482 = adoensis.
,, minima 1306.
Haplosciadium abyssinicum H. 1138.
Sanicula europaea (capensis 1127.)
Alepidea pedunculariis H. 559.
Gymnosciadium pimpinelloides H. 1143.
Helosciadium nodiflorum 1529. (= Sium H. 396.)
Ammi majus = pauciradiatum H. 376.
Pimpinella hirtella 355 (Tragium H.)
Sium simense 1250.
,, verrucosum 39. (Conium H.)
Heteromorpha abyssinica 1816.
Ferula abyssinica H. 1605.
Malabaila abyssinica 104.
Steganotaenia araliacea 1816.
Anethum segetum 379 (graveolens 1879 in sch.)
Pastinaca atropurpurea St. 788.
Agrocharis (Daucus) melanantha 1145.
Daucus abyssinicus (Caucalis 338) 1914.
,, Carota 1936.
Anthriscus sylvestris 1362 = Chaerophyllum affine 1129 in sch.
Cachrys abyssinica H. 1157, 1533.
Panax pinnatum (Aralia H.) 1583.
Aralia abyssinica H. 283.
Cussonia arborea H. 1357.
Viscum nervosum H. 211.
Loranthus rufescens (regularis St. 747.)
,, macrosolen St. 529. et 1288.
,, platyphyllus H. 1584.
,, Schimperi H. 158.
,, gibbosulus H. 256.
,, oblongifolius St. 768.
Galium simense H. 548.
,, hamatum 675.
Anthospermum muriculatum H. 732.
Borreria hebecarpa 1712.
Mitracarpum senegalense 1005 = Hypodematium sphaerostigma Rich.
,, ampliatum 1721.
Canthium Schimperianum (Fullaia H. 328.)
Pavetta gardiniaefolia H. 1141. = longiflora 210.
Vangueria edulis 638 = venosa 653.
Gardenia lutea 523.
,, dumetorum 1002.
Pouchetia saxifraga 863 (Ptychostigma 1586.)
Feretia apodanthera H. 1569 et 1664. = Pavetta elliptica H. 906.
Kurria floribunda H. 277.
Vignaldia quartiniana Rich. = Musaenda luteola 1917.
,, Schimperiana H. 38, 838, 916.
Hedyotis monanthos H. 1370.
,, macrophylla 1750.
,, globosa 512.
,, pusilla 1522.
,, senegalensis 75.
Kohautia grandiflora (noctiflora) 827.
,, abyssinica 1902.
,, strumosa 1867.
Valerianella abyssinica 1390.
Dipsacus appendiculatus St. 865. p.
,, pinnatifidus St. 865. p.
Scabiosa columbaria 238.
Cephalaria acaulis 563.
Pterocephalus frutescens 235.
Ethulia conyzoides 519.
Vernonia cinerea 1019, 1775.
,, Hochstetteri 413.
,, unionis 1212, 1213.
,, inulaefolia (= Schimperi 221)
,, purpurea 1197.
,, adoensis 318.
,, quartiniana 5 (Linia vernonioides.)
Gymnanthemum amygdalinum = Cheliusia abyssinica 14 et 386.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0296-3

Cyanopsis Leopoldii 9 et 246.
Adenostemma Schimperi 112.
Felicia abyssinica 1763.
Agathea abyssinica (Aster a. 37.) = 1890.
Nidorella vernonioides 846.
Dichrocephala latifolia 176.
,, abyssinica 87. et 1847.
Conyza Schimperi 121.
,, leucophylla 1097, 1205.
,, macrorhiza 1104.
,, Hochstetteri 162, 1336.
,, Steudelii 561, 1128.
,, variegata 1385.
,, pyrhopappa 10, 1479.
,, gnaphalioides 342.
,, abyssinica 195.
,, bacchariodes 146.
Blumea bacchariodes 1018.
,, abyssinica 1006, 1032.
,, drageanoides 633, 1297.
,, phagnaloides 685.
,, aurita 1769 (= Pluchea Kotschy 901.)
,, crassifolia 154, 939.
,, tomentosa 236.
,, purpurascens Rich. 153.
Phagnalon abyssinicum 251 = bypoleucum 854.
Klenzea rosmarinifolia 265.
,, abyssinica 227.
Inula arbuscula (fruticosa 664.)
Inulaster macrophyllus 912, 938.
Francoeuria crispa 613.
Pulicaria Rüppellii 1641.
undulata 611.
Eclipta prostrata 1033.
Blainvillea Gayana 1670.
,, Prieureana 1016.
Sphaeranthus suaveolens = 219 (indicus).
,, angustifolius 525.
Limnogenneton abyssinicum 1059.
Xanthium strumarium 1343 = brevirostre H. 1958.
Guizotia oleifera = Polymnia abyssinica = 340, 957, 1519, 1931.
,, villosa 309, 1504.
Guizotia Schultzi 350, 1510.
Verbesina macrantha 1236.
,, abyssinica 332.
Sclerocarpum africanum 1035, 1648.
Wirtgenia abyssinica 819.
,, Schimperi 1441 (1684).
,, Kotschyi (= 103 lt. nub.) 1422, 1741.
Wurschmittia abyssinica 334 et 1533.
Bidens abyssinica 337 et 1427.
,, Schimperi 429.
Spilanthes abyssinica 134.
Chrysanthemum indicum 1183, 1630 (176 lt. nub. sub Hinterhubera Kotschyi.)
Chr. abyssinicum 766.
Ursinia abyssinica 1238.
Anthemis (abyss.) Cotula 539.
,, tigreensis 1848.
Cotula abyss. 137, 1381, 1875.
,, dichrocephala 1325.
,, cryptocephala 1171.
Artemisia abyssinica 1862.
Helichrysum Steudelii 231.
,, formosissimum 672.
,, horridum 975.
,, citrispinum 666, 1246.
,, abyss. 127.
,, chrysocoma (chrysocephalum = 1765.)
,, gerberaefolium 203.
,, globosum 988.
,, foetidum 927, 1508.
,, glumaceum 762.
Achyrocline Schimperi 393, 1503.
,, adoensis 41.
,, Hochstetteri 237, 1058.
Gnaphalium melanosphaerum 1360.
,, uliginosum 175, 1179. (= unionis.)
Filago abyss. 1913.
Senecio subscandens 1926.
,, tuberosus 1361, 1616.
,, Hochstetteri 268.
,, Schimperi 144, 1880.
,, macropappus 844.
,, aegyptius pinnatipartitus 1873.
,, abyss. 67.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0297-9

Senecio lyratipartitus 1843 = Cinenaria Schimperi 134.
„ unionis 1272.
„ Steudelii 750.
„ confertus 861.
„ myriacephalus 837, 1233.
„ clematoides 870.
„ farinaceus 751.
„ nanus 1265, 1307.
„ Schultzii 1278.
Tripteris Vaillantii (cheiranthifolia) 345.
Schmittspahnia Rüppellii 1119.
(Ubiea) „ Schimperi 1087, 1176.
Echinops chamaecephalus 914.
Kentrophyllum lanatum 207.
Carduus Schimperi 1301.
„ abyss. 910.
Cirsium abyss. 1321.
„ polyacanthum 1147.
Gerbera abyss. 193.
Dicoma tomentosa 724, = 100 It. nub.
Lactuca massaviensis (Heterachaena Fr.) 1045, 1462.
„ paradoxa 1320.
„ petitiana Rich. (Microrhynchus octophyllus H 1448.
Pyrrhopappus Hochstetteri 128.
„ humilis 1172 (Lactuca)
Barkhausia Schultzii 861.
„ tenerrima 677.
„ carbonaria 1156, 1383.
„ adenothrix 217.
„ Schimperi 295.
Picridium arabicum 833.
„ tingitanum 1286.
Sonchus melanolepis 1242.
„ lactucoides 1299.
Dianthoseris Schimperi 775.

Ligthfootia abyss. 232.
Cephalostigma Schimperi 69.
Wahlenbergia pusilla 585.
„ silenoides 998.
Campanula rigidipila 167.
„ sarmentosa 1380.
Lobelia Schimperi 960 et 981.
„ exilis 1182.
Lobelia laurentia (umbrosa H.) 779.
Cyphia glandulifera 1639.
Tupa rhynchopetalum 1208.
„ Schimperi 908.

Erica arborea (acrophya Fres.) 4, 668.
Blaeria spicata 749.
„ condensata 667.

Primula Boveana (= simensis 662.)
Anagallis arvensis 1321, = serpens 547.
Utricularia tribracteata 1943.

Myrsine africana 372, 557.
„ simensis 673.
Maesa lanceolata II. 286.
Mimusops Kummel 279.
„ Schimperi 697 et 873.

Diospyros mespiliformis 655, 1243.
Euclea Kellau 1078, 159.

Jasminum abyssinicum H. 169.
„ floribundum 924. 1515.

Olea chrysophylla 918, 945.
„ laurifolia 871 (undulata).

Nathusia alata 245 et 540.
Carissa edulis H. 156 et 209.
„ Schimperi (= mepte 1904, = Strychnos abyss. 254.)
Tacazzea venosa (Periploca H.) 636.
Periploca linearifolia (= linearis 365, 1332 et 1857.)
Kanahia Delilei (laniflora 120, = Asclepias l.)
Sarcostemma viminale = aphyllum 1186.
Gomphocarpus setosus H. 503

Marsdenia Schimperi 260. Cynanchum in sch.
Gymnema humile 807.
„ sylvestre 1722, 1752.
Leptadenia lancifolia (cordata 626.)
„ abyssinica (reticulata 632.)
„ Forskalli (pallida 1007.)

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0298-5

Hoya africana DC. = Pterygocarpus abyss. H. 94 et 1366.
Ceropegia abyss. (hirsuta H. 1416.)
Stychnos unguaca Rich. (simianum 1827.

Erythraea ramosissima 1100.
Swertia abyss. 22.
„ pumila 1240.
„ Schimperi 248.

Stereospermum dentatum = Big nonia discolor 398, 880.

Argyreia abyss. (= Convolvulus echioides H.) 351.
Pharbitis hispida (= githaginea H. 784, 1440.)
Ipomea comatophylla Rich. 783.
„ conosperma 17, 376 = rhaeteios 1245.
„ tuberosa DC. = centrocaulos 800.
„ dichroa DC. = 820, 1685.
„ obscura DC. = gonatoides 801.
„ tenuirostris 1664.
„ kentrocarpa 1420.
„ pterygocaulos 636.
„ blepharosepala 1780.
Aniseia fulvicaulis.
Evolvulus fugacissimus 16, 828.
Breweria oxycarpa 1015.
Nephrophyllum abyss. H. 572.
Cuscuta brevistyla 1486.
Cordia abyss. 285, 1935.
„ subopposita (oblongifolia) 789.
„ myxa = ovalis 1218, rubra 1582.
Ehretia abyss. 307, 1907.
„ obtusifolia 652.
Tournefortia subulata (Heliotropium
„ in sch. It. nub. 163) 1285.
„ supina 1782.
„ ovalifolia 777, 1580, 1699.
„ cinerascens 1161.
(„ bicolor It. nub. 208.)
Anchusa affinis 381.
„ Milleri 740, 1142.
Myosotis hispida 1146 et 1889.
„ sylvatica 1152.
Cynoglossum caeruleum 542.
„ lanceolatum 297.
„ amplifolium 564.
Trichodesma africanum 311.
Streblanthera trichodesmoides 1710.
„ (= calathiformis.)
Nicotiana Tabacum = macrophylla 1413 in sch.
Physalis indica 1764.
Solanum Schimperianum 202.
„ bifurcatum 201.
„ polyanthemum 1526.
„ hirtulum 977.
„ campylacanthum 123, 1089.
„ marginatum 1316.
„ (= coagulans 1113 in sch.
„ sanctum 1574.
„ (dubium Fresen. 263 It. nub.)
„ adoense 147, 1865.
Discopodium penninervium 917.
Verbascum Ternacha 621.
Celsia floccosa (tomentosa 853),
„ pedunculosa 222.
„ interrupta 514.

Linaria Elatine 46.
„ hastata (= capillipes 1042.),
Antirrhinum Orontium 1809.
Anarrhinum orientale (fruticosum H. 192.)
Halleria lucida 858.
Alectra (Glossostylis H.) cordata 1229.
„ asperrima 1494, 1849.
„ hararitica 1461.
„ abyss. 1531.
Anticharis arabica 1056.
Mimulus angustifolius 1639.
Lindenbergia abyss. 782, 1619.
Mitranthus triflorus 1788.
Torenia plantaginea (Craterostigma H. 310.)
„ pumila 986.
Sibthorpia africana 1310.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0299-3

Nuxia congesta (Lachnostylis tenuifolia) 1159.
„ dentata (oppositifolia 1714.)
Buddleja polystachya (= acuminata R. Br. app. Salt.) 266.
Veronica Beccabunga 1271.
„ glandulosa 568 et 1149.
„ violaefolia 984.
„ wogerensis 730.
Buchnera hispida = Schimperiana 23 et 1516.
Striga orobanchoides 1340. = orchidea It. nub. 387.
„ hermonthica 770, 1501.
„ humilis 1000.
„ hirsuta (pusilla 1209.)
Sapubia (Rhaphidophyllum H.) ramosa 507.
Ramphicarpha fistulosa (Macrosiphon H.) 826.
Bartsia Trixago 1346.
„ longiflora 418.
„ decurva 1329.

Thunbergia reticulata 758.
Nelsonia canescens (origanoides 900 et 1815.)
Dyschoriste radicans (Ruellia H. 177.)
Dipteracanthus dejectus = Ruellia multicaulis 43.
Barleria ventricosa 797, 42, 1903.
„ grandis 702 = grandiflora RBr.
„ diacantha 1008, 1922.
„ acanthoides (noctiflora 1856.)
„ triacantha 1004.
Asteracantha auriculata 114, 343, = Barleria longiflora 1511.
Lepidagathis terminalis 815, 1920.
„ calycina 1044.
„ glandulosa 41.
„ radicalis 1072.
Aetheilema imbricatum 505 et 733 = Barleria inaequalis 367.
Blepharis abyss. (= boerhaviaefolia 247, 1492 et 1895.)
Acanthodium hirtum 256.
Haplanthera speciosa 769.
Monothecium (Hypoestes, Rostellularia) glandulosum 346, 617.
Rostellularia abyss. 1524 = Barleria 21.
„ glandulosa 346.
Adhatoda (Gendarussa) variegata 516.
„ Schimperiana 27, 930, 1549.
„ Rostellaria (calcarata 106. = Tyloglossa Schimperi 1201.
„ major 1251.
„ minor 1043.
„ palustris 1211 (It. nub. 80.)
Monechma bracteatum 759.
„ violaceum (ciliatum) 1105.
Eranthemum decurrens 773 (It. nub. 276.)
Dicliptera micrantha 509 = Dianthera spinulosa It. nub. 277.
„ maculata (Peristrophe) 702.
„ bicalyculata 694.
„ Schimperiana 1095.
„ (Kotschyana = 1617 It. nub. bicalyculata in sch.)
Rhaphidospora cordata (Gendarussa) 1250.
„ abyss. (dichotoma) 903.
Hypoestes triflora (acuminata) 1985.
„ adoensis 1111, 1491.
„ Forskalei 405, 1861.
„ microphylla (liniflora) 400.
Priva dentata 1023 = Forskalii.
Verbena officinalis 145.
Bouchea pterygocarpa 1012 = Chascanum laetum It. nub. 230.
Lippia adoensis 1079.
„ grandifolia 734.
„ nodiflora 1016.
Lantana viburnoides = Lippia Schimperi 257.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0300-8

Clerodendron cordifolia (Volkamer 1132.)
Cyclonema myricoides (Clerodendron R. Br.) 330, 1839.

Hebenstreitia dentata 239.

Ocymum menthaefolium 294, 1599, 1860 (= lt. nub. 263.)
„ suave 109, 160 p.
„ filamentosum 1849.
„ affine 1621.
„ lamiifolium 107, 1864.
(„ dichotomum lt. nub. 73.)
Moschosma multiflorum (Plectranthus) 779 et 1688.
Orthosiphon Schimperi = Ocymum coloratum 313.
Plectranthus marrubioides H. 1925
„ defoliatus 847.
„ cylindraceus 1113.
Coleus spicatus (ramosus H. 1328).
„ barbatus 333.
„ latifolius 825 et 1228.
„ lanuginosus 420, 1915.
Aeolanthus abyss. 1355.
„ pinnatifidus 1604.
Mentha sylvestris 403.
Thymus serrulatus 858.
Calamintha simensis 999.
„ abyss. (Melissa) 326.
Meriandra bengalensis = 1781.
„ Schimperiana = Salvia abyss. R. Br.
Salvia Schimperi (hypoleuca 1916).
„ nubia 541 (abyssinica 160.)
„ nilotica (pungens) 565.
„ scabra 576.
Nepeta biloba 748.
„ azurea 835.
„ ballotaefolia 720.
Scutellaria africana (peregrina) 7167
Stachys hypoleuca 855.
Otostegia repanda 125, 1938.
Leucas glabrata (galeopsidea 724).
„ martinicensis = 15 Schimperi.
Leonotis pallida 1793.
Leonotis rugosa (nepetaefolia) 371.
Lasiocorys abyss. 1851 = Leucas quinquedentata.
„ stachydiformis (Ballota) 852.
Teucrium Scordium (= abyss. 1766.)
Ajuga remota (= crenata) 545, 321.

Plumbago zeylanica 1354, 1407.
Valloradia abyss. 253.

Plantago lanceolata 1887. = abyss. 143.
Boerhavia ascendens 1436.
„ grandiflora = dichotoma 1719.

Celosia trigyna = adoensis 49.
„ populifolia 1038 (Chamissoa.)
Amaranthus caudatus 356, 1512.
Euxolus viridis (Amaranthus Blitum 1067 in sch.)
Aerua javanica 1173.
„ lanata 902, 1030 = Amaranthus aeruoides 249.
Achyranthes aspera 1234 = A. argentea 1144.
Cyathula Schimperiana = Pupalia 3.
„ globulifera 392.
Pupalia lappacea (= Desmochaete flavescens 1221)
Alternanthera nodiflora 162, 1068.

Chenopodium murale 225.
„ foetidum 252.
„ procerum 882, 1506.
Phytolacca (Pircunia) abyss. 131,
Polygonum abyss. (salicifolium 182) macrochaeton Fr. 163.
„ nepalense 293.
„ aviculare (= herniarioides 142, 158 in sch.
Rumex abyss. 398.
„ Steudelii 388, 933.
„ alismaefolius 152, 1484.
Ceratogonum sinuatum H. 264.
Thesium Schimperianum 404.
„ radicans 168, 1330.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0301-4

Osyris abyss. 281 = Fusanus alternifolius R. Br.
(Aristolochia Kotschyi It. nub. 121.)
Euphorbia tetragona 1790.
,, repetita 1281.
,, dilatata 543.
,, depauperata 1386, 1532.
,, Schimperiana 274, 971.
,, monticola 1706.
,, hypericifolia 907.
Dalechampia cordofana 1615 (It. nub. 84.)
Tragia cordata 301 = mitis 1600, 517, 731.
Acalypha fimbriata H 1661.
,, crenata 1200.
,, elegantula 1708.
,, psilostachya 560.
,, ornata 1414, 1647.
,, villicaulis 737 = hirsuta 781.
,, betulina 1626, 1588.
Ricinus communis 1933.
Croton macrostachys 1134 et 1666 = Rottlera Schimperi 196.
Andrachne aspera 1119.
Phyllanthus venosus 814, 1231 It. nub. 184.
,, Niruri 644, 1662.
Securinega abyss. (= Phyllanthus polygamus 877 et 1698.
Celtis australis (vesiculosa) 1162.
Parietaria abyss. 1433.
,, alsinefolia 1667 = Freirea 753.
Pouzolzia parasitica (Urtica) 682.
Urtica hypselodendron 1136
,, Schimperiana 1726, 1739
,, tomatocarpa 1471.
,, bullosa 1409.
,, adoënsis 101.
,, condensata 1888.
Pilea quadrifolia 1680.
Böhmeria hypoleuca 862.
Ficus populifolia 880, 1576.
,, bengalensis (indica) 1934.
,, glumosa 696.
,, Schimperiana 1771 = xanthophylla 943.
Ficus Hochstetteri 373.
,, Schimperi 1096.
,, dekdekena = tsiela 226. = acrocarpa 627, = dissocarpa 629, = saligna 709.
,, Sycomorus 1280.
,, panifica 149.
,, gnaphalocarpa 874.
,, riparia 1585.
,, pseudocarica 157.
,, antithetophylla 886.
Dorstenia cuspidata 1727.
,, ovata 1665.
Peperomia abyss. 1319.
,, Freiriaefolia 1942.
Salix octandra 700.
Myrica salicifolia 1093, 1135, 1327.
Juniperus procera 537, 929.
Dendrobium brachycarpum 1314.
Eulophia (Epidendrum H.) Schimperian. 1592.
Saccolobium radicosum = Angraecum
,, globulosum 1565.
Platanthera tricuspis 1255.
Peristylus quartinianus 1257.
,, Lefeburianus 1254.
,, squamatus 1164 = Spiranthes abyss. 982.
Habenaria vaginata 1350
,, bracteosa 1189.
,, quartiniana 1349.
,, macrantha 1256.
,, decorata 1253.
,, Schimperiana 1210.
,, replicata 1645.
Satyrium coriophoroides = macrostachyum 1606.
,, Schimperi 1185.
,, bifolium 1554.
Disa pulchella 1192.
Pterygodium biflorum 570.
Vieusseuxia tridentata 1296 p.
,, Schimperi 1296 p.
Iris diversifolia 143.
Montbretia abyss. 329.
Geissorhiza abyss. 645.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0302-0

Ixia bulbocodium Rich. 550.
Ixia Hochstetteriana = uniflora H. 1239.
Crinum abyss. 1374.
Pancratium tenuifolium 1695.
Hypoxis villosa (abyss. 172. = simensis 1368.
„ Schnitzleinii 1693 = amia 1365.
Dioscorea triphylla 786, 1449.
„ Schimperiana 1642
„ abyss. 1726.
Asparagus abyss. H. 1479.
„ mitis Rich. 296.
„ petitianus Rich. 374.
Gloriosa abyss. (Clinostylis H. 1437.)
Kniphöfia isoetifolia (Rudolf-roemeria) 782.
Uropetalum tacazzeanum 1696.
„ minimum 1718.
Eratobotrys bifolia 1622.
Scilla simensis 1317.
Allium spathaceum 1266.
Anthericum humile 1369 p.
„ angustifolium 1623.
„ chamaemoly 1369. p.
„ ornithogaloides 1261 (= 271 It. nub.)
„ macrophyllum 1837.
Androcymbium striatum 1338.
Merendera abyss. = Schimperi 1126, = longispatha 1167.
Juncus Schimperi 56.
„ bufonius 1088.
Commelyna latifolia 1686.
„ striata 360.
Aneilema tacazeana 1666.
Cyanotis abyss. (Commelyna hirta) 14, 1556.
Aponogeton abyss. 1483.
Arisaema enneaphyllum 1125.
Leersia abyss. 1823.
Phalaris paradoxa (appendiculata 248.
Beckera polystachya 91.
„ mutica 1675.
Panicum spiciforme 1985.
Panicum ciliare 1616.
„ abyss. 82.
Panicum horizontale 1618.
„ minutiflorum 799.
„ maticum 95.
„ brizanthum 89.
„ pubipode 1855.
„ Avigtii 1868.
„ seminudatum 289, 1833.
„ aequitans 1628.
„ gossypium (holosericeum) = 1196, Eriochloa purpurascens 175.
„ obtusiflorum 1553.
„ quadriparum 206.
„ atrovioleaceum Rich. 206 p.
„ Hochstetterianum 61.
„ trichopodum (geminatum) 1656.
„ annulatum 1748 (Helopus It. nub. 382)
„ uniglume 97.
„ Schimperianum 1853.
„ nudiglume 1653.
„ lepranthum 1818.
„ aquaticum (paludosum) 1786.
jumentorum = maximum 1830 inech., cenfine 1808.
„ callosum 1713.
„ atrosanguineum 1709.
„ trichanthum (patens) 115.
„ cornutum 1196.
Ophiuros multisetus 1469.
Pennisetum glaucum 72. (Setaria).
„ aureum 409.
„ respiciens 1654.
„ sagittifolium 1655 (Panicum dioicum 126.)
„ Schimperi (Gymnothrix)
„ 11, 387, 94.
„ riparium 84.
„ glaucifolium 390.
„ humile 1372.
„ riparioides 98.
„ setuginosum 193 (It. nub. 394.)
„ amoenum 641.
„ macrostachyum 72.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0303-6

Panicum pentastachyum 315.
„ villosum 316.
„ longistylum 65.
Aristida adoensis 1806 = (caerulescena 319.)
„ hordeacea 196.
„ curvata 1796.
„ mauritiana 1047.
„ delicatula 1836.
Sporobolus alpicola 669.
„ angustifolius 2.
„ marginatus 1777.
„ festivus 1692.
„ blephariphyllus Rich. 80 (Triachyrum adoense)
„ panicoides 1181 (Triachyrum longifolium.)
Agrostis stolonifera 1345 = simensis 562, = Schimperi 766, 973.
„ vestita 1788.
Gastridium australe 119.
Pappophorum Schimperianum 323.
Microchloa abyss. 321.
Cynodon ternatus Rich. (Panicum 76.)
Dactyloctenium aegyptiacum (aristatum) 77.
Chloris abyss. 79, 1800.
„ leptostachya 1477.
„ macrostachya 1477.
„ triangulata 1048.
Leptochloa uniflora 1707.
„ arabica (Dinebia) 527.
Eleusine Tocusso 347, 994, 1960.
„ flaccifolia 90.
„ multiflora 110.
Deschampsia latifolia 555, 1336.
Arratherum pumilum 642.
Avena fatua (sterilis) 950.
„ abyss. 1877.
Trisetum lachnanthum 859.
„ longearistatum (Streblochaete nutans 683.)
Tristachya arundinacea 1214.
„ elegans (Londetia) 18.
Danthonia grandiflora 696.
„ elongata 402.
„ abyss. 114.
Danthonia Kostlini (Streblochaete) 412, 883.
„ leptophylla 324, 1732 = „ Leptochloa setosa, Tripogon abyss.
Poa leptoclada 1826.
„ simensis 993.
„ Schimperiana 1386.
„ ciliaris 1051.
„ lepida 2 et 1040.
„ viscosa 824.
„ longifolia 272.
„ tenuifolia 92.
„ megastachya 339.
„ pilosa (cortiola) 1757.
„ sporoboloides 401.
„ aspera 1476.
„ ovina 1861.
„ abyss. 798, 961, 962, 963, 1927, 1929, 1970, 1971.
Harpachne Schimperi 171.
Festuca abyss. 410.
„ simensis 1684.
„ Schimperiana 684.
„ bromoides 1384, 1353.
„ macrophylla 688.
„ minima 1652.
Bromus pectinatus 675 = adoensis 58.
Lolium temulentum 947 = speciosum 1881.
Triticum elymoides 1764.
„ flexum 674.
„ Schimperi 59.
Rottböllia arundinacea 1459.
Manisuris granularis 1198.
Tricholaena grandiflora 205.
„ longiseta 1802.
Psilopogon Schimperi 96.
Anthistiria punctata 155. 73.
„ abyss. 407.
„ multiplex 1687.
Chrysopogon quinqueglumis (Andropogon 726.
Andropogon contortus 1090, 1219 (Heteropogon).
„ humilis 850.
„ abyss. 223.
„ squamulatus 715.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0304-2

Andropogon polyantherus 290 = glabrescens 1115 = multinervis 805.
„ schirensis 1807.
„ cuspidatus 1438.
„ papillosus 526.
„ brachyantherus 1636.
„ insculptus 80.
„ hirtus 714, 922, 936 = pubescens 1053, = podotrichus 1056.
„ papillipes 1054, 1055, = arrhenobasis 1821.
„ comosus 1458.
„ confinis 1456.
„ anthistirioides 1822, 1833.
„ fulvicomis 928, 1114, 1118. = altissimus.
„ connatus 411, 1801.
„ proximus 1792.
„ finitimus 1797.
„ cymbarius 1098.
„ Schimperi 408, 1052.
„ umbrosus 584, 1116, 1800, 911, 937.
„ glabriusculus 1808.
„ purpureo-sericeus 1551.
Sorghum vulgare 621.
Elionurus Royleanus 795.
Ischaemum insculptum 739.
„ macrostachyum 1705.
Cyperus flavescens = abyss. 122.
„ Eragrostis 745, 760.
„ nigricans 1373.
„ atronitens 312, 374 = elegantulus.
„ neurotropis 765, 1424.
„ aristatus 822, 1208, 1735
„ pauper 1662.
„ flabelliformis 35, 1941.
„ dives 30, 391, 911, 913.
„ andirrhoa 273.
„ rotundus 170,
„ bulbosus 1391.
„ intermedius 1267.
„ longus 57.
„ adoensis 186.
„ retusus 1199.
„ xanthopus 1021, 1155.
„ assimilis 1074, 1252.
Cyperus rigidifolius 991.
„ fissus 992.
„ dereilema 659.
„ Fischerianus 348.
Mariscus polyphyllus 1124.
„ bulbocaulis 579 = 588, plateilemos.
„ atrosanguineus 575.
„ Schimperi 173, 578, 1363.
Kyllingia tricops 1641.
„ chlorotropis 572, 1377.
„ alba 581.
„ cristata (dentata) 1457, 1733.
„ pulchella 1269.
„ nervosa 1371.
„ bracheilema 1371.
Eleocharis limosa (striata 1331 = marginulata 915.
Scirpus brachyceras II. 288.
Isolepis nervosa 551.
„ setifolia = monandra lt. nub. 129.
„ costata 1153.
„ praelongata 1494.
„ Schimperiana 299.
„ ascolepis (Kyllingia eriocauloides 1195 et 1644.
„ kyllingioides (Kyll. microcephala 650.)
Fimbristylis squarrosa 691, 1577.
„ dichotoma 533.
„ lomentocarpa 532.
„ complanata 148.
„ obligostachya 1268.
„ coleotricha 1226.
„ pusilla 796.
„ setifolia 12.
Eriospora abyss. = Rhynchospora trigyna II. 233.
Hemichlaena bulbosa 580.
Scleria foliosa 1232.
„ clathrata 1603.
„ bulbifera 327, 1557.
„ hispidula 1277.
„ melanotricha 830.
Carex simensis 1180.
„ conferta 571.
„ monostachya 687.
„ echinochloe 26.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05975-0305-8

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: 43

Autor(en)/Author(s): Palacky Jan Kritel Kaspar

Artikel/Article: Die Schimper'schen Pflanzen ans Abyssinien, nach der Bestimmung von A. Richard im Tentamen Fl. Abyss. 289-303