FLORA.

№ 31.

Regensburg. 21. August. **1853.**

Inhalt: ORIGINAL-ABHANDLUNG. Müller, Breviarium plantarum Ducatus Slesvicensis austro-occidentalis (Finis). — REPERTORIUM FÜR DIE PERIODISCHE BOTANISCHE LITERATUR. No. 47, 48. — BEILAGE. Flora Graeca exsiccata curantibus Leithner et Heldreich.

Breviarium plantarum Ducatus Slesvicensis austro-occidentalis composuit Eerdinandus Jacobus Henricus Müller, Phil. Dr.

(Finis.)

II. Dicotyledoneae.

IV. Dicotyledoneae apetalae diclines.

Fam. *Coniferae* Jss.

204. *Pinus silvestris* L. In silvis majoribus, semper plantata. 205. *Juniperus communis* L. Immenstedt, Olderup.

Fam. *Myriceae* Rich.

206. *Myrica Gale* L. In ericetis paene ubique.

Fam. *Betulinae* Rich.

207. *Betula alba* L. hinc inde. 208. *B. pubescens* Ehrh. Engelsburg, Husum. 209. *Alnus glutinosa* Gärtn. frequens.

Fam. *Salicineae* Rich.

210. *Salix repens* L. frequens. β. *S. fusca* L. passim. γ. *S. argentea* Sm. in syrtibus Eiderstedti. δ. *leiocarpa* Koch. cum prioribus. 211. *S. aurita* L. antecedente vix rarior. β. *cladostemma* Brandenburg. 212. *S. cinerea* L. hinc inde. 213. *S. caprea* L. frequentissima. 214. *S. Smithiana* W. raro plantata. 215. *S. molissima* Ehrh. Tönning, Süderholz. 216. *S. viminalis* L. passim. 217. *S. rubra* Hds. ad flumen Treene prope Fresendelf. 218. *S. undulata* Ehrh. Graupenmühle, Rantrum, Tönning. 219. *S. amygdalina* L. non ubique. 220. *S. pentandra* L. Immenstedt. 223. *Populus alba* L. hinc inde. 224. *P. tremula* L. passim. 225 *P. nigra* L. haud rara. 226. *P. pyramidalis* Rozier et 227. *P. monilifera* Ait. copiose plantatae.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0500-0

Fam. *Cupuliferae* Rich.

228. *Carpinus Betulus* L. frequens. 229. *Corylus Avellana* L. In silvaticis ubique. 230. *Quercus sessiliflora* Sm. hinc inde. 231. *Q. pedunculata* W frequentissime. 232. *Fagus silvatica* L. ubique.

Fam. *Ceratophylleae* Gray.

233. *Ceratophyllum demersum* L. passim. 234. *C. submersum* L. Husum, Friedrichstadt.

Fam. *Callitrichineae* Lk.

235. *C. stagnalis* Sc. passim. 236. *C. verna* Kütz. frequens. 237. *C. platycarpa* Kütz. haud rara. 238. *C. hamulata* Kütz. Mühlenteich. Nil nisi praecedentis varietas videtur.

Fam. *Urticeae* Kunth.

239. *Urtica dioica* L. vulgaris. 240. *U. urens* L. in cultis ubique. 241. *Ulmus campestris* L. hinc inde. 242. *U. effusa* Borkh. ad arcem Husumensem. 243. *Humulus Lupulus* L. satis frequens.

Fam. *Euphorbiaceae* Jss.

244. *Mercurialis perennis* L. frequens. 245. *M. annua* L. Husum. 246. *Euphorbia Peplus* L. hinc inde. 247. *E. Helioscopia* L. in multis locis.

Fam. *Empetreae* Nutt.

248. *Empetrum nigrum* L. In ericetis.

Fam. *Cucurbitaceae.*

249. *Bryonia alba* L. Husum.

V. Dicotyledoneae apetalae epigynae.

Fam. *Aristolochieae* Jss.

250. *Aristolochia Clematitis* L. prope Husum subspontanea.

VI. Dicotyledoneae apetalae perigynae.

Fam. *Polygoneae* Jss.

251. *Polygonum Bistorta* L. Schlosswiesen, Süderholz. 252. *P. amphibium* L. α. *natans*, β. *repens*, γ. *erectum*, hinc inde. 253. *P. Persicaria* L. frequentissime. 255. *P. lapathifolium* Ait. vix rarius. 255. *P. minus* Hds. vulgare. 256. *P. Hydropiper* L. fere ubique. 257. *P. aviculare* L. α. *angustifolium*, β. *erectum*, frequentissime proveniens. 258. *P. Convolvulus* L. sequente frequentius. 259. *P. dumetorum* L. Süderhöft. 260. *P. Fagopyrum* L. quasi spontaneum. 261. *Rumex maritimus* L. Eiderstedt, Südermarsch, Schlossgraben. 262. *R. obtusifolius* L. frequens. β. *R. silvestris* Wallr. cum priore. 263. *R. nemorosus* Schrad. In silvis. 264. *R. Hydrolapathum* Hds. Nordhusum, Mühlenteich, Rantrum etc. 265. *R. he-*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0501-6

terophyllus Schultz. Treene bei Süderhöft. 266. *R. crispus* L. copiose. 267. *R. Acetosa* L. vulgaris. 268. *R. Acetosella* L. frequentissime.

Fam. *Chenopodeae* Moq.

269. *Obione portulacoides* Moq. Au, Schobüll, Padeluck Hallig. 270. *Obione pedunculata* Moq. prioris socius. 271. *Atriplex latifolium* Wahl. ad maris litora. β. *A. oppositifolia* DC. ibidem. γ. *A. Sackii* Rostc. Padeluck Hallig. 272. *A. patulum* L. et β. *A. angustifolium* Sm. In solo culto. 273. *A. litorale* L. et β. *A. marinum* L. ad mare ubique. 274. *Blitum rubrum* Reichenb. passim. 275. *B. Bonus Henricus* Reichenb. frequens. 276. *Chenopodium urbicum* L. Ostenfeld, Hude. 277. *C. hybridum* L. Husum. 278. *C. murale* L. passim. 279. *C. album* L. ubique. 280. *C. glaucum* L. hinc inde copiose. 281. *Echinopsilon hirsutus* Moq. Schobüll. 282. *Chenopodina maritima* Moq. in pratis maritimis ubique. 283. *Salicornia herbacea* L. iisdem locis. 284. *Salsola Kali* L. St. Peter, Haalebüll.

VII. Dicotyledoneae apetalae hypogynae.

Vacat.

VIII. Dicotyledoneae monopetalae hypogynae.

Fam. *Plantagineae* Juss.

285. *Plantago major* L. valde frequens. β. F. Mll. ad moles. 286. *P. lanceolata* L. copiose. 287. *P. maritima* L. α. *latifolia* F. Mll. foliis pollicem latis, β. *dentata* Roth. γ. *squamata* Fl. Dan. δ. *subulata* Roth. ε. *paniculata* Ferd. Müll. spicis ramosis, ramis paniculam formantibus. α. ad maris litora. γ. longe a mari in arenosis sterilibus, β. Schobüll, δ et ε inveni in syrtibus insulae Sylt. 288. *P. Coronopus* L. Rödemis, Osterhusum, Dreisprung, St. Peter etc. 289. *Litorella lacustris* L. Mühlenteich, St. Peter.

Fam. *Plumbagineae* Jss.

290. *Armeria maritima* W. in graminosis maritimis ubique. β. *recedens* Ferd. Müll. caule pedali glabro (longitudinem A. elongatae attingente). 291. *Statice Limonium* L. variat: foliis plus minusve nervosis, angustioribus, spicis paucifloris erectisque.

Fam. *Primulaceae* Vent.

292. *Primula acaulis* Jcq. Süderholz, Immenstedt, Schwabstedt, Süderhöft. 293. *Glaux maritima* L. ad litus copiose. 294. *Thyrsanthus palustris* Schrk. passim. 295. *Lysimachia vulgaris* L. non rara. 296. *L. Nummularia* L. vix rarior. 297. *L. nemorum* L. in

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0502-2

silvaticis plurimis. 298. *Trientalis europaea* L. In virgultis nemoribusque passim. 299. *Anagallis phoenicea* Lam. hinc inde. 300. *Centunculus minimus* L. St. Peter, Schobüller Berg, β. *C. simplex* Horn. St. Peter. γ. *prostrata* Ferd. Müller. caule elongato simplice prostrato; rarissima haec varietas in dunis arenosis insulae Sylt occurrit. 301. *Hottonia palustris* L. frequens.

Fam. *Lentibularinae* Rich.

302. *Utricularia vulgaris* L. Rosendahl, Süderholz. 303. *U. minor* L. Immenstedt. 304. *Pinguicula vulgaris* L. haud raro proveniens in uliginosis.

Fam. *Scrophularinae* Br.

305. *Pedicularis palustris* L. passim. 306. *P. silvatica* L. paulo frequentior. 307. *Melampyrum pratense* L frequens. 308. *Rhinanthus major* Ehrh. et 309. *R. minor* Ehrh. fere ubertim. 310. *Euphrasia officinalis* L. β. *nemorosa*, γ. *micrantha*; vulgaris. 311. *E. litoralis* Fries, species bene terminata; extra syrtis Eiderstedti prope St. Peter. 312. *E. Odontites* L. copiose. Var. flore albo. 313. *Veronica longifolia* L. Treeneufer. 314. *V. serpillifolia* L. frequens. 315. *V. scutellata* L. Mühlenteich, Camp, Rosendahl, Schauendahl. 316. *V. Anagallis* L. hinc inde. 317. *V. Beccabunga* L. passim. 318. *V. officinalis* L. frequens. β. *laxa* Ferd. Müll. caule laxo, racemis paucifloris, floribus remotis, foliis longius petiolatis tenuioribus. 319. *V. montana* L. Immenstedt, Ostenfeld, Schwabstedt, Süderhöft. 320. *V. Chamaedrys* L. vulgaris. 321 *V. hederaefolia* L. hinc inde. 322. *V. agrestis* L. passim. 323. *V. arvensis* L. frequentior. 324. *V. peregrina* L. Coldenbüttel. 325. *V. triphyllos* L. Husum. 326. *Limosella aquatica* L. Horrstedt. 327. *Linaria vulgaris* Desf. frequentissime. 320. *L. minor* Desf. Husum. 329. *Antirrhinum Orontium* L. Ahrenviöl. 330. *Scrophularia nodosa* L. Schlossgarten, Süderholz, Hochbarnhorst. 331. *Verbascum Thapsus* L. Tönning, Schauendahl. 332. *V. Lychnitis* L. Schlossgraben bei Husum. 333. *V. nigrum* L. Osterhusum, Mildstedt etc.

Fam. *Solanaceae* Stromeyer.

334. *Hyoscyamus niger* L. passim. 335. *Nicandra physaloides* Jcq. Tönning. 336. *Datura Stramonium* L. Husum, Tönning. 337. *Solanum Dulcamara* L. hinc inde. 338. *S. nigrum* L. frequens. β. *chlorocarpon* Meyer. Camp bei Husum.

Fam. *Jasmineae* Jss.

339. *Syringa vulgaris* L. saepe plantata et paene indigena. 340. *Ligustrum vulgare* L. passim. 341. *Fraxinus excelsior* L. frequens.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0503-8

Fam. *Aquifoliaceae* DC.

342. *Ilex Aquifolium* L. magna copia plantae hujus prope Immensfedt et Ostenfeld, in reliquis silvis rarius. β. *integrifolia* Nolte. Immenstedt.

Fam. *Labiatae* Jss.

343. *Mentha aquatica* L. non ubique. 344. *M. sativa* L. Tönning. 345. *M. arvensis* L. haud rara. 346. *Lycopus europaeus* L. passim. 347. *Thymus angustifolius* Pers. Eiderstedt, in syrtibus prope St. Peter. 348. *T. Chamaedrys* Fr. valde frequens. 349. *Melissa Clinopodium* Benth. passim. 350. *Scutellaria galericulata* L. vix frequentior. 351. *Prunella vulgaris* L. copiose. 352. *Nepeta Cataria* L. Rödemis. 353. *Glechoma hederacea* L. β. *major* Gaud. frequens. 354. *Lamium album* L. ubique; varietas memorabilis β. *integrifolium* Nolte (L. molle Ait.) ad Deetzbüll Ducatus Slesvici inventa in tractu depressiore nostrarum regionum investiganda est. 355. *L. purpureum* L. vulgaris, var. fl. albo. 356. *L. incisum* W. Osterhusum. 357. *L. amplexicaule* L. frequens. β. *clandestinum* Rchb. 358. *L. Galeobdolon* Benth. in silvaticis. 359. *Leonurus Cardiaca* L. non ubertim. 360. *Galeopsis Ladanum* L. Husum. 361. *G. Tetrahit* L. frequens. β. *G. bifida* Bönningh. multo rarior. 362. *Stachys silvatica* L. passim. 364. *S. palustris* L. multis locis. β. *agrestis* Ferd. Müll. foliis crassis obtusis basin versus attenuatis, indumento sericeo. Süderholz. 365. *Ajuga reptans* L. haud frequens.

Fam. *Borragineae.*

366. *Symphytum officinale* L. passim. 367. *Lithospermum arvense* L. Nordhusum. 368. *Pulmonaria officinalis* L. Süderhöft. 369. *Anchusa arvensis* Bieb. frequentissime. 370. *Borrago officinalis* L. Tönning, Horkensbüll. 371. *Myosotis palustris* With. vulgaris, β. *M. repens* Don. et γ. *M. strigulosa* Rchb. passim. 372. *M. caespitosa* Schultz. Marsch. 373. *M. intermedia* Lk. haud rara. 374. *M. hispida* Schltd. Süderholz, Hemme. 375. *M. versicolor* Pers. hinc inde. 376. *M. arenaria* Schrad. ubique. 377. *Cynoglossum officinale* L. Husum, Rödemis, Dreisprung, Ostenfeld etc.

Fam. *Convolvulaceae* Jss.

378. *Convolvulus arvensis* L. haud rarus. 379. *C. sepium* L. minus frequens. 380. *Cuscuta vulgaris* Pers. passim. 381. *C. Epithymum* L. Süderholz, Schauendahl, Hattstedt, St. Peter. 382. *C. Epilinum* Weihe. passim.

Fam. *Gentianeae* Jss.

383. *Gentiana Pneumonanthe* L. hinc inde, γ. *depressa* Boissier, humilis, caule procumbente adscendente vix pollicari, foliis angustis

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0504-4

semipollicaribus. 384. *Cicendia filiformis* Rchb. Süderholz. 385. *Erythraea Centaurium* Rich. Osterhusum, Ostenfeld. 386. *E. linarifolia* Pers. Westeiderstedt, Schobüll. 387. *E. ramosissima* Pers. Westeiderstedt, Eiderufer. 388. *Menyanthes trifoliata* L. hinc inde frequens.

Fam. *Ericineae* Br.

389. *Calluna vulgaris* Salisb. vulgatissime. 390. *Tetralix septentrionalis* Meyer. frequens. β. *alba* St. Peter, γ. *uniflora*, cum priori praesertim in ericetis maritimis. 391. *Andromeda poliifolia* L. hinc inde. 392. *Arctostaphylos officinalis* W. et G. Oldernp. 393. *Pyrola rotundifolia* L. Olderup. 394. *P. minor* L. β. *rosea* Sm. Immenstedt, Bonnesburg, St. Peter, Süderhöft.

IX. Dicotyledoneae monopetalae perigynae.

Fam. *Vaccinieae* DC.

395. *Vaccinium Myrtillus* L. passim copiose. 396. *V. Vitis idaea* L. Schwabstedt. 397. *Oxycoccos palustris* Pers. non rarus.

Fam. *Campanulaceae* Jss.

398. *Campanula rotundifolia* L. paene ubique. β. *tenuifolia* Hoffm. γ. *albiflora*; rariores varietates. 399. *C. Rapunculus* L. in pratis circa arcem Husumensem. 400. *C. patula* L. Husum. 401. *C. rapunculoides* L. Tönning, Husum, Süderholz, Schauendahl etc. 402. *C. Trachelium* L. Süderholz. 403. *Jasione montana* L. in multis locis, β. *litoralis* Fr. Eiderstedt, in syrtibus.

X. Dicotyledoneae monopetalae epigynae.

Fam. *Compositae* Adans.

404. *Hieracium Pilosella* L. ubertim. 405. *H. vulgatum* Koch. passim. 406. *H. boreale* Fr. Schwabstedt. 407. *H. umbellatum* L. hinc inde. 408. *H. aurantiacum* L. inter Bergenhusen et Schwabstedt. 409. *Sonchus oleraceus* L. abunde. 410. *S. asper* Hall. praesertim ad moles. 411. *S. arvensis* L. frequens. 412. *Crepis paludosa* Mönch. Immenstedt. 413. *C. tectorum* L. hinc inde. 414. *C. virens* Vill. α. *integralis*, β. *sinuata*, γ. *pinnatifida*, passim. 415. *Taraxacum officinale* Weber in Wigg. prim. fl. Holsat. p. 56. frequentissime, β. *corniculatum* (Kit.) ad mare. 416. *Lactuca virosa* L. Schwabstedt. 417. *L. muralis* Fres. Immenstedt, Ostenfeld, 418. *Scorzonera humilis* L. Königsmark, Engelsburg, Ostenfeld. β. *angustifolia*, cum forma legali. 419. *S. hispanica* L. hortorum aufuga ut sequens. 420. *Tragopogon porrifolius* L. 421. *Oporina autumnalis* Don. valde frequens. β. *pratensis* Lk. Tönning, γ. *ora-*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0505-0

ria Ferd. Müll., minor, caule monocephalo. 422. *Leontodon hispidus* L. Engelsburg. 423. *Hypochoeris glabra* L. passim tunc autem gregarie. 424. *H. radicata* L. frequens. 425. *H. maculata* L. Königsmark, Engelsburg. 426 *Cichorium Intybus* L. haud indigenum tamen in vicinia agrorum suorum copiose spontaneum. 427. *Arnoseris pusilla* Gärtn. in agris arenosis. 428. *Lampsana communis* L. satis frequens. 429. *Lappa major* Gärtn. praecipue in plaga orientali. 430. *L. minor* Cand. frequens. 431. *L. tomentosa* Lam. praecedente vix rarior. 432. *Cirsium oleraceum* All. Süderholz. 433. *C. palustre* Sc. hinc inde. 434. *C. arvense* Lam. α. *horridum* Koch. frequentissime, β. *neglectum* Fisch. haud frequens. 435. *C. lanceolatum* Sc. gregarie. 436. *Carduus crispus* L. passim. 437. *C. tenuiflorus* Curt. Husum, Rödemis, Eiderstedt, Süderstapel. 438. *Silybum Marianum* Gärtn. Husum. 439. *Centaurea Cyanus* L. inter segetes ubique. 440. *C. phrygia* L. Hochbarnhorst. 441. *C. Jacea* L. frequens. 442. *Senecio vulgaris* L. frequentissime. 443. *S. silvaticus* L. multo rarior. 444. *S. Jacobaea* L. copiose. 445. *S. erucifolius* L. Dreisprung, Friedrichstadt, Süderstapel. 446. *S. aquaticus* Hds. hinc inde. 447. *S. palustris* Cand. Olderup, Immenstedt. 448. *Arnica montana* L. in ericetis elatioribus, virgultis, rarissime in viretis silvarum. 449. *Filago germanica* L. Brosum. 450. *F. minima* Fr. frequens. 451. *Gnaphalium rectum* Sm. passim. 452. *G. uliginosum* L. non frequentius. 453. *Antennaria dioica* Br. hinc inde. 454. *Tanacetum vulgare* L. fere ubertim. 455. *Artemisia vulgaris* L. valde frequenter. 456. *A. maritima* L. in litoris solo limoso. β *A. salina* W. Padeluck-Hallig, Schobüll. γ *A. gallica* W. Padeluck-Hallig 457. *Chrysanthemum segetum* L. diversis locis. 458. *Pyrethrum Parthenium* Sm. Husum, Ostenfeld. 459. *Tripleurospermum inodorum* Schultz. multis locis. 460. *T. maritimum* Koch. in litore passim. 461. *Matricaria Chamomilla* L. non rara, plerumque ubi provenit copiose. 642. *Leucanthemum vulgare* Lam. frequens. 463. *Achillea Millefolium* L. frequentissime. 464. *Ptarmica vulgaris* Cand. frequens. 465. *Maruta foetida* Cass. passim. 466. *Anthemis arvensis* L. vulgaris. 467. *Bidens tripartita* L. hinc inde. 468. *B. cernua* W. α. *discoidea*, β. *radiata*, γ. *mixta*, hae formae ubique frequentes, rarior autem δ. *B. minima* L. Mühlenteich. 469. *Pulicaria vulgaris* Gärtn. Ostenfeld. 470. *P. dysenterica* Gärtn. Tönning. 471. *Erigeron acris* L. Rosenthal. 472. *Solidago Virga aurea* L. non rara. 473. *Bellis perennis* L. vulgatissime. 474. *Tripolium vulgare* Nees. ad maris litora. 475. *Tussilago Farfara* L. frequens. 476. *Eupatorium cannabinum* L. passim.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0506-6

Fam. *Dipsaceae* Cand.

477. *Succisa pratensis* Mönch haud rara. 478. *Knautia arvensis* Coult. satis frequens. 479. *Dipsacus silvestris* Mill. Friedrichstadt, Süderstapel.

Fam. *Valerianeae* Cand.

480. *Valeriana dioica* L. in pratis paludosis copiose. 481. *V. officinalis* L. Camp, Süderholz, Immenstedt etc. 482. *V. sambucifolia* Mik. Hockensbüll. 483. *Valerianella olitoria* Mönch. Husum. 484. *V. Morisonii* Cand. Schauendahl.

Fam. *Stellatae* L.

485. *Sherardia arvensis* L. rarius. 486. *Asperula odorata* L. in silvis umbrosis. 487. *Galium saxatile* L. non ubique. 488. *G. Mollugo* L. vulgare. 489. *G. palustre* L. hinc inde. 490. *G. uliginosum* L. passim. 491. *G. Aparine* L. frequentius.

Fam. *Caprifoliaceae* Cand.

492. *Lonicera Periclymenum* L. in nemorosis, virgultis. 493. *Viburnum Opulus* L. non frequens. 494. *Sambucus nigra* L. copiose. β. *variegata*. Husum, Ostenfeld. 495. *S. racemosa* L. Armenkolonie, ubi vix indigena.

Fam. *Loranthaceae* Rich.

496. *Viscum album* L. Husum, in Pyro communi parasiticum.

XI. Dicotyledoneae polypetalae epigynae.

Fam. *Corneae* Cand.

497. *Cornus sanguinea* L. Fresendelf. 498. *C. suecica* L. Immenstedt.

Fam. *Hederaceae* Mart.

499. *Hedera Helix* L. satis frequens.

Fam. *Araliaceae* Jss.

500. *Adoxa moschatellina* L. in locis silvarum apertis.

Fam. *Umbellatae* L.

501. *Hydrocotyle vulgaris* L. hinc inde. 502. *Sanicula europaea* L. in graminosis silvaticis. 503. *Cicuta virosa* L. Rantrum. 504. *Apium graveolens* L. Ad ripas salsuginosas fluminis Aue. 505. *Helosciadium inundatum* L. Ording, Mühlenteich bei Husum, Königsmark. 506. *Aegopodium Podagraria* L. ubique. 507. *Carum carvi* L. frequentissime. 508. *Pimpinella Saxifraga* L. α. *major*. Graupenmühle, Königsmark, Ostenfeld etc. β. *P. hircina* Leers. non rara. 509. *P. nigra* W. Immenstedt. 510. *Sium latifolium* L. hinc inde. 511. *Berula angustifolia* Koch. frequentior. *Bupleurum tenuissimum* L., a cl. Nolte ad litora insulae Nordstrand repertum, certe in ditione florae nostrae inveniendum est. 512. *Oe-*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0507-1

nanthe fistulosa L. haud rara. 513. *O. Phellandrium* Lam. fere ubique. 514. *O. Lachenalii* Gm. ad ripas Aue fluminis. 515. *Angelica silvestris* L. multis locis proveniens. 516. *Pastinaca sativa* L. Eiderstedt, Simonsberg. 517. *Heracleum Sphondylium* L. passim. 518. *Daucus Carota* L. Schobüll, Simonsberg, Eiderdeiche. 519. *Anethum graveolens* L. ad margines hortorum subspontaneum. 520. *Thysselinum palustre* Hffm. Süderholz, Ostenfeld, Immenstedt. 521. *Torilis Anthriscus* L. frequens. 522. *T. nodosa* Gärtn. Eiderstedt et Husum ad moles. 523. *Caucalis daucoides* L. rarius. 524. *Anthriscus vulgaris* Pers. Husum, Camp, Hockensbüll, Rödemis, Mildstedt etc. 525. *A. silvestris* Hffm. ubertim saepe gregarie. 526. *Chaerophyllum temulum* L. non frequens. 527. *Conium maculatum* L. haud ubique.

XII. Dicotyledoneae polypetalae hypogynae.

Fam. *Ranunculaceae* Jss.

528. *Anemone nemorosa* L. in silvaticis ubique frequens. 529. *Thalictrum flavum* L. Husum, Hattstedt. 530. *Myosurus minimus* L. hic illic. 531. *Ranunculus hederaceus* L. Nordhusum, Hockensbüll. 532. *R. aquatilis* L. α. *heterophyllus*. β. *capillaceus*, copiose. 533. *R. Petiveri* Koch α. *major*, in maxima parte paeninsulae Eiderstedt. β. *minor*, Ording. Varietas antecedentis videtur, nam specimina inveni foliis natantibus iisdem Ranunculi aquatilis plane similibus. γ. *capillaceus* Ferd. Müll. foliis natantibus destitutus. 534. *R. paucistamineus* Tausch, cum priore, differt: floribus minoribus, carpidiis minus copiose conglomeratis autem paulo majoribus, praesertim latioribus, stigmate crassiore, foliis natantibus semper deficientibus. 535. *R. circinnatus* Sibth. hinc inde frequens. 536. *R. Flammula* L. vulgaris. β. *radicans*. Mühlenteich etc. 537. *R. Lingua* L. passim. 538. *R. Ficaria* L. frequentissime. 539. *R. auricomus* L. tantum in silvaticis. 540. *R. polyanthemos* L. Königsmark. 541. *R. acris* L. ubique. 542. *R. Philonotis* Ehrh. in Eiderstedt passim. 543. *R. repens* L. valde frequenter. 544. *R. lanuginosus* L. Süderhöft. 545. *R. bulbosus* L. non ubique. 546. *R. sceleratus* L. satis frequens. γ. *minimus* DC. caule sesquipollicari, floribus fructibusque minimis, in solo exsiccato argilloso prope Tönning. 547. *R. arvensis* L. Chaussée bei Tönning. 748. *Caltha palustris* L. vulgatissima.

Fam. *Balsamineae* Rich.

549. *Impatiens Noli tangere* L. Ostenfeld, Schwabstedt, Süderhöft.

Fam. *Oxalideae* Cand.

550. *Oxalis Acetosella* L. in nemorosis. 551. *O. corniculata* L. Schlosswiesen. 552. *O. stricta* L. Husum, in hortis.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0508-7

Fam. *Lineae* Cand.

553. *Radiola linoides* Gm. St. Peter, Hattstedt, Schobüll, Königsmark, Süderholz. 554. *Linum catharticum* L. Mühlenteich, Süderholz. 555. *L. usitatissimum* L. agrorum aufuga.

Fam. *Geraniaceae* Cand.

556. *Geranium molle* L. frequens. 557. *G. pusillum* L. paulo rarius. 558. *G. Robertianum* L. praesertim in silvis umbrosis. 559. *G. sanguineum* L. Olderup, Königsmark. 560. *G. pratense* L. Tönning, Husum, Schauendahl. 561. *G. dissectum* L passim. 562. *Erodium cicutarium* L'Her. copiose.

Fam. *Malvaceae* Kunth.

563. *Malva moschata* L. Porrenkoog, vix indigena. 564. *M. silvestris* L. hinc inde gregarie. 565. *M. vulgaris* Fr. frequens. 566. *M. borealis* Wallm. Hemme, Dreisprung.

Fam. *Tiliaceae* Kunth.

567. *Tilia parvifolia* Ehrh. ubique. β. *T. vulgaris* Hayne frequenter plantata. 568. *T. grandifolia* Ehrh. Husum.

Fam. *Hypericinae* Juss.

569. *H. perforatum* L. frequens. 570. *Hypericum tetrapterum* Fr. Hockensbüll, Immenstedt, Süderholz etc. 571. *H. quadrangulum* Fr. Süderholz, Königsmark, Ostenfeld. 572. *H. humifusum* L. Lehmsiek. 573. *H. montanum* L. Süderhöft. 574. *H. pulchrum* L. Olderup, Engelsburg, Feddersburg, Ostenfeld.

Fam. *Acerinae* Cand.

575. *Acer Pseudo-Platanus* L. Immenstedt, etiam hinc inde plantatum.

Fam. *Hippocastaneae* Cand.

576. *Aesculus Hippocastanum* L. frequens.

Fam. *Polygaleae* Jss.

577. *Polygala vulgaris* L. non ubique.

Fam. *Fumariaceae* Cand.

578. *Bulbocapnos digitatus* Bernh. Husum, Tönning. 579. *B. fabaceus* Bernh. Schwabstedt. 580. *Fumaria officinalis* L. satis frequens.

Fam. *Papaveraceae* Rich.

581. *Chelidonium majus* L. passim. 582. *Papaver Argemone* L. sequente paullo rarius. 583. *P. dubium* L. 584. *P. somniferum* L. ad Husum quasi spontaneum.

Fam. *Cruciferae* Jss.

585. *Nasturtium officinale* Br. hinc inde. 586. *N. amphibium* Br. non ubique. 587. *N. silvestre* Br. Rödemis, Süderholz, Süder-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0509-5

höft. 588. *N. palustre* Cand. in tractu depressiore frequentissime. 589. *Cardamine silvatica* Lk. Süderholz, Immenstedt, Ostenfeld. 590. *C. hirsuta* Lk. inter Rödemis et Rantrum et ad Olversum Porrenkoog. 591. *C. amara* L. Ostenfeld, Immenstedt, Olderup. 592. *C. pratensis* L. fere ubique. β. *uniflora* Mühlenteich bei Husum. γ. *pleniflora*; in fossis exsiccatis prope Immenstedt. 593. *Barbarea vulgaris* Br. Treene. 594. *B. stricta* Andrz. Almdorf. 595. *Turritis glabra* L. passim. 596. *Draba verna* L. ubique in arenosis copiose. 597. *Cochlearia officinalis* L. Padeluck-Hallig, Schobüll. β. *minor* cum praecedente alibique. 598. *C. danica* L. Aue. 599. *C. anglica* L. Padeluck-Hallig. 600. *C. Armoracia* L. Tönning. 601. *Teesdalia nudicaulis* Br. non rara. 602. *Thlaspi arvense* L. hinc inde. 603. *Cakile maritima* Sc. β. *aegyptiaca* W. Haalebüll, St. Peter, Ording. 604. *Lepidium sativum* L. inter segetes Lini usitatissimi prope Rantrum et Ostenfeld. 605. *L. ruderale* L. in pratis litoralibus, ad moles. 606. *Capsella Bursa pastoris* Mönch α. *integrifolia* Schlechtd. β. *sinuata* Koch. γ. *pinnatifida* Koch. δ. *coronopifolia* Cand. vulgatissime. 607. *Erysimum Thalianum* Kitt. fere ubique. 608. *E. cheiranthoides* L. Ulvesbüll, Witzworth, Tönning. 609. *Camelina sativa* Crantz α. *subglabra*. β. *pubescens* passim. 610. *C. dentata* Pers. rarius. 611. *Sisymbrium Sophia* L. frequens. 612. *S. officinale* Sc. ubique. 613. *Alliaria officinalis* Br. non frequens. 614. *Brassica campestris* L. Husum. 615. *B. Rapa* L. et 616. *B. Napus* L. quasi spontaneae. 617. *Melanosinapis communis* Sch. et Sp. Husum, Schauendahl, Dreisprung etc. 618. *Sinapis alba* L. Simonsberg. 619. *S. arvensis* L. haud rara. β. *S. orientalis* L. Husum. 620. *Raphanistrum segetum* Baumg. vulgare. 621. *S. nebiera Coronopus* Poir. In graminosis depressis ad maris litora (Marsch) copiose.

Fam. *Parnassieae* Meyer.

622. *Parnassia palustris* L. Rosendahl, Mildstedt, Süderholz etc.

Fam. *Droseraceae* Cand.

623. *Drosera rotundifolia* L. haud rara. 624. *D. intermedia* Hayne, socia prioris.

Fam. *Violarinae* Cand.

625. *Viola palustris* L. hinc inde. 626. *V. odorata* L. Tönning, Husum. 627. *V. silvestris* Lam. in silvis omnibus saepe copiose. 628. *V. ericetorum* Schrad. frequens. 629. *V. tricolor* L. vulgaris. β. *interstans* Ferd. Müll. floribus maguitudine Violae tricoloris, colore Violae arvensis; in virgultis umbrosis rarissime. γ. *V. arvensis* Murray. hinc inde. δ. *syrtica* Flörke. St. Peter.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0510-6

Fam. *Sileneae* Cand.

630. *Silene inflata* Sm. passim. 631. *Lychnis Flos cuculi* L. in pratis paludosis vulgatissime.. 632. *L. diurna* Sibthorp. Süderholz, Immenstedt, Ostenfeld, Schwabstedt. 633. *L. vespertina* Sbth. fere ubique. 634. *Agrostemma Githago* L. haud rara. 635. *Viscaria purpurea* Wmm. et Gr. Ostenfeld, Viöl. 636. *Dianthus deltoides* L. Süderholzkrug, Viöl. 637. *Saponaria officinalis* L. passim.

Fam. *Alsineae* Cand.

638. *Cerastium triviale* Lk. vulgare. 639. *C. glomeratum* Thuill. frequentissime. 640. *C. semidecandrum* L. frequens. 641. *Malachium aquaticum* Fr. Husum, Rantrum, Schwabstedt alibique. 642. *Stellaria nemorum* L. Süderholz, Immenstedt, Ostenfeld, Süderhöft. 643. *S. media* Vill. ubique vulgaris, β. *decastemon* fl. Dan. in viretis silvarum umbrosis. 644. *S. Holostea* L. valde frequens. 645. *S. glauca* With. et 646. *S. graminea* L. non ubique. 647. *S. uliginosa* Murr. hinc inde. 648. *Moehringia trinervia* Clairville. Husum, Olderup, Osterfeld. 649. *Arenaria serpillifolia* L. multis locis. 650. *Honkenya peploides* Ehrh. Westeiderstedt, Schobüll. 651. *Sagina procumbens* L. satis frequens. 652. *S. maritima* Don. St. Peter, Eiderdeiche, Schobüll. 653. *Spergella nodosa* Rchb. hinc inde. 654. *S. subulata* Rchb. Immenstedt. 655. *Spergula arvensis L.* frequentissime. 656. *S. maxima* Weihe. Schauendahl. 687. *Spergularia rubra* Prsl. singulatim in tota regione. 658. *S. salina* Prsl. ad mare. 659. *S. marginata* Kitt. iisdem locis, tamen praecedente frequentior.

XIII. Dicotyledoneae perigynae polypetalae.

Fam. *Paronychieae* St. Hil.

660. *Scleranthus perennis* L. frequens. 661. *S. annuus* L. abunde. 662. *Illecebrum verticillatum* L. Horrstedt, Schauendahl, Ahrenviöl, Fuchsberg. 663. *Herniaria glabra* L. Husum, Rosendahl. 664. *Corrigiola litoralis* L. rarius.

Fam. *Portulaceae* Jss.

665. *Montia minor* Gmel. Osterhusum, Rosendahl.

Fam. *Saxifrageae* Jss.

666. *Saxifraga granulata* L. Osterhusum, Rosendahl. 667. *Chrysosplenium alternifolium* L. in silvis praesertim solo fontano frequenter. 668. *C. oppositifolium* L. Süderholz, Immenstedt.

Fam. *Crassulaceae* Cand.

669. *Sempervivum tectorum* L. Tönning, Husum, Mildstedt. 670. *Sedum maximum* Suter. hinc hinde. 671. *S. acre* L. vulgatissime.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0511-2

Fam. *Hygrobieae* Lk.

672. *Myriophyllum spicatum* L. frequens. 673. *M. alterniflorum* Cand. Mühlenteich, Camp. 674. *M. verticillatum* L. passim.

Fam. *Hippurideae* Lk.

675. *Hippuris vulgaris* L. Eiderstedt, Südermarsch, Mühlenteich.

Fam. *Onagreae* Jss.

686. *Oenothera biennis* L. passim. 677. *Epilobium angustifolium* L. Süderholz, Ostenfeld. 678. *E. grandiflorum* Schreb. Tönning, Schwabstedt, Süderhöft. 679. *E. parviflorum* Schreb. Schauendahl, Ostenfeld, Süderhöft alibique. 680. *E. montanum* L. antecedentibus frequentius. 681. *E. tetragonum* L. Husum, Oldensworth. 682. *E. roseum* Schreb. passim. 683. *E. palustre* L. frequens. 684. *Circaea lutetiana* L. haud rara. 685. *C. intermedia* Ehrh. Immenstedt, Süderhöft.

Fam. *Salicarieae* Jss.

686. *Lythrum Salicaria* L. creberrime. 687. *Peplis Portula* L. Hattstedt, Mühlenteich, Königsmark, Süderholz. β *humillima* Ferd. Müll. In syrtibus madidis prope St. Peter.

Fam. *Grossularinae* Cand.

688. *Ribes rubrum* L. Schwabstedt. 689. *R. nigrum* L. Süderholz. 690. *R. Uva spina* Bauh. frequenter colitur.

Fam. *Rosaceae* Rich.

691. *Prunus Padus* L. Süderholz, Immenstedt, Ostenfeld alibique. 692. *P. spinosa* L. fere ubique. 695. *Pyrus Malus* L. Immenstedt, Ostenfeld etc. 694. *P. aucuparia* Gärtner. hinc inde. 695. *Crataegus Oxyacantha* L. vulgaris. 696. *C. monogyna* Jcq. minus frequens. 697. *Spiraea Ulmaria* L. α *discolor*, passim; β *concolor*, rarius. 698. *Geum urbanum* L. haud ubertim. 699. *G. rivale* L. hinc inde. 700. *Potentilla anserina* L. cum var. β *sericea* copiose. 701. *P. argentea* L. singulatim in tota regione. 702. *P. procumbens* Sibth. Rosendahl, Ostenfeld. 703. *P. Tormentilla* Sibth. crebra. 704. *P. pilosa W.* Süderholz. 705. *Comarum palustre* L. satis frequenter. 706. *Fragaria vulgaris* Ehrh. hinc inde. 707. *F. elatior* Ehrh. passim. 708. *Rubus saxatilis* L. Süderhöft. 709. *R. Idaeus* L. in silvis majoribus. 710. *R. caesius* L. passim. 711. *R. corylifolius* Sm. passim. 712. *R. nemorosus* Hayn. Süderholz, Immenstedt etc. 713. *R. suberectus* And. rarius. 714. *R. fruticosus* L. passim. 715. *Agrimonia Eupatoria* L. Eiderstedt. 716. *Alchemilla vulgaris* L. haud ubique. β *A. montana* W. Tönning. 717. *A. arvensis* Sc. Mühlenteich, Immenstedt. 718. *Sanguisorba officinalis* L. Rantrum, Süderhöft. 719. *Rosa canina* L. frequens. 720. *R. ru-*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0512-8

biginosa L. Husum, Königsmark, Feddersburg. 721. *R. cinnamomea* L. ad sepes passim.

Fam. *Myrtaceae* Jss.

722. *Philadelphus coronarius* L. frequenter plantatur.

Fam. *Papilionaceae* L.

723. *Ononis spinosa* L. in pratis elatioribus, ad moles. 724. *O. repens* L. Camp. β *geminiflora* Ferd. Müll. ibidem. 725. *Sarothamnus vulgaris* Wimm. in ericetis siccis. 726. *Genista tinctoria* L. frequens. 727. *G. pilosa* L. Mühlenteich. 728. *G. anglica* L. passim copiose. 729. *Ulex europaeus* L. Mildstedt. 730. *Medicago lupulina* L. vulgaris. 731. *Trifolium minus* Sm. non ubique. β *minimum* Gaud. Husum. 732. *T. procumbens* L. Schobüll, Camp bei Husum, Tönning. 733. *T. agrarium* L. Rosendahl. 734. *T. fragiferum* L. in tractu litorali. 735. *T. repens* L. vulgatissime. 736. *T. medium* L. haud frequenter. 737. *T. pratense* L. copiose. 138. *T. arvense* L. frequens. 739. *Agthyllis Vulneraria* L. Olderup. β. *A. maritima* Schweigg. Eiderstedt in syrtibus. 740. *Lotus corniculatus* L. vulgaris. β *crassifolius* Fr. St. Peter. 741. *L. uliginosus* Schk. non rarus. 742. *Ornithopus perpusillus* L. passim frequens. β. *O. intermedius* Roth. Hattstedt. 743. *Ervum hirsutum* L. hinc inde. 744. *Vicia lathyroides* L. Hockensbüll, Immenstedt. 745. *V. Cracca* L. cumulate. 746. *V. sepium* L. frequentissime. 747. *V. sativa* L. hinc inde. 748. *V. angustifolia* Roth. non rara. 749. *Lathyrus pratensis* L. haud ubique. 750. *L. montanus* Bernh. in virgultis ericetorum. 751. *L. vernus* Bernh. Süderhöft.

Fam. *Rhamneae* Br.

752. *Rhamnus Frangula* L. satis frequens.

Fam. *Celastrineae* Br.

753. *Evonymus vulgaris* Sc. passim.

Conspectus distributionis stirpium enumeratarum familiaris.

Compositae 73. Gramineae 68. Cyperaceae 48. Cruciferae 37. Rosaceae 31. Papilionaceae 29. Scrophularinae 29. Umbelliatae 17. Labiatae 23. Alsineae 22. Ranunculaceae 21. Junceae 19. Salicinae 18. Polygoneae 18. Potamogetoneae 16. Chenopodeae 16. Liliaceae 11. Borragineae 12. Onagreae 10. Orchideae 10. Primulaceae 10. Sileneae 8. Geraniaceae 7. Rubiaceae 7. Hypericinae 6. Campanulaceae 6. Ericineae 6. Gentianeae 6. Typhinae 5. Asparageae 5. Cupuliferae 5. Urticeae 5. Plantagineae 5. Solanaceae 5. Convolvulaceae 5. Valerianeae 5. Violarieae 5. Paronychieae 5. Lem-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0513-4

naceae 4. Callitrichineae 4. Euphorbiaceae 4. Caprifoliaceae 4. Malvaceae 4. Papaveraceae 4. Alismaceae 3. Betulinae 3. Lentibularieae 3. Jasmineae 3. Vaccinieae 3. Dipsaceae 3. Oxalideae 3. Lineae 3. Fumariaceae 3. Droseraceae 3. Saxifrageae 3. Crassulaceae 3. Hygrobieae 3. Grossulariaceae 3. Najadeae 2. Juncagineae 2. Narcisseae 2. Irideae 2. Hydrocharideae 2. Nymphaeaceae 2. Coniferae 2. Ceratophylleae 2. Plumbagineae 2. Corneae 2. Tiliaceae 2. Salicarieae 2. Aroideae 1. Butomeae 1. Myricarieae 1. Empetreae 1. Cucurbitaceae 1. Aristolochieae 1. Aquifoliaceae 1. Loranthaceae 1. Hederaceae 1 Araliaceae 1. Balsamineae 1. Acerinae 1. Hippocastaneae 1. Polygaleae 1. Portulaceae 1. Hippurideae 1. Myrtaceae 1. Rhamneae 1. Celastrineae 1.

Summa: Monocotyl. 203 sp. Dicotyled. 550 sp. = 753. Proportio: 203 M. : 550 D. = 1 M. : 2,71 D.

Repertorium
für die periodische botanische Literatur der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts.

(Fortsetzung.)

*47.) **Bulletin de la société impériale des naturalistes de Moscou** publié sous la redaction du Docteur Renard. Moscou, en commission chez le libraire M. Arlt. 8.

Année 1851.

I.

N. Turczaninow, Synanthereae quaedam hucusque indescriptae (avec 3 planches). S. 166—214.

N. Annenkow, Observations sur les plantes indigènes des environs de Moscou faites pendant les années 1844, 1845, 1846, 1847 etc. S. 229—268.

G. Gros, de l'embryogénie ascendante des espèces ou génération primitive, équivoque et spontanée. S. 283—340. 429—502. (avec 3 planches).

II.

A. Giedwillo, über den Einfluss der in dem Ackerboden enthaltenen Eisenoxyde und Thonarten auf die Absorption des Ammoniaks durch denselben. S. 503—532.

Ch. Steven, Observationes in Asperifolias taurico-caucasicas. S. 558—609.

III.

N. Turczaninow, Synanthereae quaedam hucusque indescriptae (avec 2 planches). S. 59—95.

N. Geleznoff, Observations sur le développement des bourgeons pendant l'hiver (avec 2 planches). S. 134—187.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0514-0

naceae 4. Callitrichineae 4. Euphorbiaceae 4. Caprifoliaceae 4. Malvaceae 4. Papaveraceae 4. Alismaceae 3. Betulinae 3. Lentibularieae 3. Jasmineae 3. Vaccinieae 3. Dipsaceae 3. Oxalideae 3. Lineae 3. Fumariaceae 3. Droseraceae 3. Saxifrageae 3. Crassulaceae 3. Hygrobieae 3. Grossulariaceae 3. Najadeae 2. Juncagineae 2. Narcisseae 2. Irideae 2. Hydrocharideae 2. Nymphaeaceae 2. Coniferae 2. Ceratophylleae 2. Plumbagineae 2. Corneae 2. Tiliaceae 2. Salicarieae 2. Aroideae 1. Butomeae 1. Myricarieae 1. Empetreae 1. Cucurbitaceae 1. Aristolochieae 1. Aquifoliaceae 1. Loranthaceae 1. Hederaceae 1 Araliaceae 1. Balsamineae 1. Acerinae 1. Hippocastaneae 1. Polygaleae 1. Portulaceae 1. Hippurideae 1. Myrtaceae 1. Rhamneae 1. Celastrineae 1.

Summa: Monocotyl. 203 sp. Dicotyled. 550 sp. = 753. Proportio: 203 M. : 550 D. = 1 M. : 2,71 D.

Repertorium
für die periodische botanische Literatur der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts.

(Fortsetzung.)

*47.) **Bulletin de la société impériale des naturalistes de Moscou** publié sous la redaction du Docteur Renard. Moscou, en commission chez le libraire M. Arlt. 8.

Année 1851.

I.

N. Turczaninow, Synanthereae quaedam hucusque indescriptae (avec 3 planches). S. 166—214.

N. Annenkow, Observations sur les plantes indigènes des environs de Moscou faites pendant les années 1844, 1845, 1846, 1847 etc. S. 229—268.

G. Gros, de l'embryogénie ascendante des espèces ou génération primitive, équivoque et spontanée. S. 283—340. 429—502. (avec 3 planches).

II.

A. Giedwillo, über den Einfluss der in dem Ackerboden enthaltenen Eisenoxyde und Thonarten auf die Absorption des Ammoniaks durch denselben. S. 503—532.

Ch. Steven, Observationes in Asperifolias taurico-caucasicas. S. 558—609.

III.

N. Turczaninow, Synanthereae quaedam hucusque indescriptae (avec 2 planches). S. 59—95.

N. Geleznoff, Observations sur le développement des bourgeons pendant l'hiver (avec 2 planches). S. 134—187.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0514-0

Année 1852.

I.

F. E. L. Fischer, Notice sur les Anoplanthus de l'ancien monde. S. 105—108. (avec 1 planche).

II.

Dr. v. Eichwald, dritter Nachtrag zur Infusorienkunde Russlands. S. 388—536. (mit 1 Karte und 1 Tafel.)

Ch. Steven, Xiphocoma et Gampsoceras, duo genera e familia Ranunculacearum. S. 537—544 (cum tab.)

48.) The botanical gazette a Journal of the progress of British Botany and the contemporary Literature of the science. Edited by Arthur Henfrey, F. L. S., Lecturer on botany at St. George's Hospital, etc. Vol. III. 1851. London, published by Richard and John E. Taylor. 8.

(Nach Berl. Bot. Zeit. 1852. No. 14 et 15.)

Ch. C. Babington, über Cerastium pumilum Curt. No. 25.

J. Buckmann, über eine merkwürdige Form der Corolla von Lamium album No. 25.

Fenton, J. A. Hort, über Euphorbia stricta und platyphylla. No. 26.

John M'Laren, Bemerkungen über einige britische Carices. No. 26.

J. Woods, über die verschiedenen Formen von Salicornia. No. 27.

Hewett C. Watson, ist Brassica Cheiranthus in Fifeshire gefunden? No. 27.

Ch. C. Babington, über Pyrus Aria in England. No. 27.

J. Backhouse jun., dreiwöchentliche Excursion in den Clova und Braemer Bergen im Sommer 1850. No. 28.

F. Townshend, über eine Missbildung von Daucus Carota. No. 28.

Dr. N. J. Andersson's Noten zu J. E. Leafe's Salicetum Britannicum. No. 29.

P. Neill, biographische Notiz über den verstorbenen Mr. George Don von Forfar. No. 31.

W. H. Purchas, über Luzula Borrreri. No. 32.

J. Ball, botanische Notizen über eine Excursion durch Portugal und Spanien. No. 33 u. 34.

M'Cosh, einige Bemerkungen über die Pflanze, morphologisch betrachtet. No. 33.

J. Backhouse jun., Noten über einige Hieracium-Arten. Nr. 34.

R. D. Douglas, Vorkommen von Bacillaria paradoxa bei Stefford. No. 34.

Ch. C. Babington, Note betreffend Anacharis Alsinastrum. No. 31.

F. J. A. Hort, Note über Athyrium filix foemina var. latifolium. No. 36.

J. Syme, über Sparganium natans L. No. 36.

(Fortsetzung folgt.)

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr in Regensburg

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05968-0515-5

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: 36

Autor(en)/Author(s): Müller Ferdinand v.

Artikel/Article: Breviarium plantarum Ducatus Slesvicensis austro-occidentalis 489-504