FLORA.

№ 3.

Regensburg. 21. Januar. **1846.**

Inhalt: Zuccarini, Bestimmungen einiger japanischen Pflanzen der Göring'schen Sammlung. — Verhandlungen des brittischen Vereins zur Beförderung der Wissenschaften.

Kleinere Mittheilungen. Preisaufgaben der k. dänischen Gesellschaft zu Kopenhagen und der k. Akademie gemeinnütziger Wissensch. zu Erfurt. Buchinger, über Potentilla splendens. — Personal-Notizen.

Bestimmungen einiger japanischen Pflanzen der Göring'schen Sammlung; von Prof. Dr. Zuccarini in München.

Durch die Güte des Hrn. Kreisphysikus Dr. Steudel erhielt ich kürzlich aus der käuflichen Göring'schen Sammlung japanischer Pflanzen ungefähr 150 Arten zur Ansicht. Ich fand darunter keine Art, welche das Leydener Museum in dem v. Siebold'schen und Bürger'schen Herbario nicht ebenfalls besässe. Da ich indessen noch nicht alle Familien dieser reichhaltigen Sammlungen bearbeiten konnte,*) so mussten dennoch unter den Göring'schen Pflanzen mehrere vorkommen, welchen ich jetzt noch keine sichern Bestimmungen beizufügen vermag. Namentlich ist dieses mit den Gräsern der Fall, welche ohnediess, was die Göring'sche Sammlung betrifft, Hr. Dr. Steudel zu bearbeiten bereits begonnen hat. Doch wird es den Besitzern dieser Sammlung angenehm seyn, wenigstens zu einem Theil der darin enthaltenen Arten die Bestimmungen zu erhalten, unter welchen sie in den bisher erschienenen Heften der Flora von Japan bereits erschienen sind, oder in Bälde erscheinen werden, und welche ich hier mitzutheilen mir erlaube. Ich lasse die Arten nach den Nummern folgen, welche den von Hrn. Dr. Steudel mitgetheilten Exemplaren beilagen:

*) Ich muss mich bei dieser Gelegenheit vorläufig gegen jeden Vorwurf verwahren, welcher mir wegen der langsamen Publication der Flora von Japan gemacht werden könnte. Vielleicht gibt sich in Bälde die Veranlassung, über die in dieser Beziehung obwaltenden Verhältnisse Näheres mitzutheilen.

.41

6. Phyllostachys macrantha S. et Z.
18. Fimbristylis japonica S et Z.
23. Eriocaulon
34. Asparagus falcatus Thbg.
37. Dioscorea quinqueloba Thbg.
38. Disporum pullum Salisb.
40. Litsaea lancifolia S. et Z.
41. Clethra barbinervis S. et Z.
42. Candiandra alternifolia S. et Z.
43. Platycrater arguta S. et Z.
46. Tripetaleia paniculata S. et Z.
47. Gardenia Marabu Sieb. (Blume Bijdr. p. 1015.)
49. Myrsine neriifolia S. et Z.
50. Osmanthus fragrans Lour.
51. Cleyera japonica Thbg. Fl. p. 12.
52. Gilibertia? japonica S. et Z.
53. Symplocos lucida S. et Z.
54. Hydrangea paniculata S. et Z.
55. „ virens S. et Z.
57. Rhamnus crenatus S. et Z.
58. Humulus japonicus S. et Z.
59. Quercus cuspidata Thbg.
00. Isopyrum japonicum S. et Z. (J. adoxoides DC.?)
61. Aegle sepiaria L.
62. Corylopsis spicata S. et Z.
63. Pittosporum Tobira Ait.
70. Cacalia delphiniifolia S. et Z.
75. Ophiorhiza japonica Blume.
79. Ilex crenata Thbg.
80. Camphora lancifolia S. et Z. Die Blätter. Das Blüthen-Exemplar gehört zu Cinnamomum pedunculatum Nees.
83. Distylium racemosum S. et Z.
84. Symplocos myrtacea S. et Z.
86. Daphne odora Thbg.
87. Passerina Ganpi Sieb.
88. Celastrus punctatus Thbg.
93. Rhamnus globosus Bunge.
94. Stephanandra flexuosa S. et Z.
95. Pittosporum Tobira Act.
97. Bothryospermum asperugoides et Z.
100. Andromeda japonica Thbg.

.46

103. Eriobotrya japonica Lindl.
106. Cocculus Thunbergii DC.
107. Sassafras sericea S. et Z.
109. Lysimachia clethroides DC.
110. Helwingia ruscifolia Willd.
111. Veronica Anagallis L.
113. Mastacanthus sinensis Endl. (Nepeta japon. Willd.)
117. Vandellia japonica Benth.
118. Aucuba japonica Thbg. ♂.
119. Bothryospermum asperugoides S. et Z.
131. Geum japonicum Thbg.
134. Bönninghausenia albiflora Rchbch.
135. Citrus japonica Thbg.
136. Zanthoxylon schirifolium S. et Z.
137. Croton Siraki Sieb.
139. Acer polymorphum S. et Z.
139. Rosa Banksiae R. Br.
140. A. polymorphum var. (A. septemlobum Thbg.)
145. Dianthus japonicus Thbg.
158. Spiraea chamaedryfolia L.
159. Pyrus spectabilis Ait.
161. Vicia Faba L.
164. Pisum maritimum L.
168. Acacia Nemu Willd. et simul A. Julibrissim.
169. Pisum maritimum L.
174. Urtica nivea L.
175. Urtica petiolaris S. et Z. ♂.
178. Myrica rubra S. et Z.
181. Podocarpus macrophylla var. angustifolia.
183. Cryptomeria japonica Don.
184. Quercus acuta Thbg.
188. Anagallis arvensis L.
189. Lysimachia labinioides S. et Z.
191. Urtica petiolaris S. et Z.
193. Stillingia sebifera Mich.
196. Pterostyrax arguta S. et Z.
197. Clerodendron trichotomum Thbg.
199. Ajuga remota Benth.
S. 204. Siphonostegia sinensis Benth.
205. Viburnum plicatum Thbg.
207. Ligustrum Ibota S. et Z.

№
208. Aralia canescens S. et Z.
209. Callicarpa japonica Thbg.
210. Sassafras triloba S. et Z.
211. Hamamelis japonica S. et Z.
212. Illicium religiosum S. et Z.
215. Hydrangea Belzonii S. et Z.
216. Platycrater arguta S. et Z.
219. Mastacanthus sinensis Endl.
221. Stachyurus praecox S. et Z.
222. Evonymus subtriflorus Bunge.
223. Rhaphiolepis japonica S. et Z.
226. Erigeron japonicum Thbg.
231. Camphora lancifolia S. et Z. fructif.
237. Wisteria japonica S. et Z.
241. Euscaphis staphyleoides S. et Z.
242. Caesalpinia japonica S. et Z.
243. Wisteria brachybotrys S. et Z.

№
244. Rubus palmatus Thbg.
245. Agrimonia viscidula Bge?
251. Die einzelne Blüthe gehört zu Tricyrtis flexuosa S. et Z., das Laub-Exemplar zu einer neuen Gattung der Smilaceen.
252. Aristolochia Kämpferi Willd.
253. Buxus microphylla S. et Z.
255. Acer rufinerve S. et Z.
256. Acer polymorphum var.
257. Acer trifidum Thbg.
259. Dianthus Caryophyllus L.
261. Evonymus japonicus Thbg.
284. Diervilla hortensis S. et Z.
285. Pachyrhizus Thunbergianus S. et Z.
285. Ternstroemia japonica S. et Z.
392. Gymnothrix japonica Kunth.

Mit Vergnügen werde ich dieses Verzeichniss vervollständigen, wenn mir durch weitere Mittheilung Göring'scher Pflanzen hiezu die Gelegenheit geboten wird.

Verhandlungen des brittischen Vereins zur Beförderung der Wissenschaften.

(Mitgetheilt in der Thüringer Gartenzeitung 1845. Nr. 38—42.)

Am 18. Juni v. J. und in den folgenden Tagen fand zu Cambridge die 15. Versammlung des brittischen Vereins für Beförderung der Wissenschaften statt; wir theilen aus ihren Protokollen dasjenige mit, was die Botaniker einigermassen interessiren kann.

Am Freitage (20. Juni) trug Hr. L. Jenyns eine Abhandlung *über den Torf auf den Mooren in Cambridgeshire* vor. Dieser Torf verdankt seine Entstehung nicht Arten von *Sphagnum* und andern Moosen, sondern allmähligen Ablagerungen, welche verschiedene Wasserpflanzen gebildet haben und zwar in einer spätern Periode, als die Wälder verschüttet wurden, denn die Bäume liegen vergraben auf dem Boden unter dem Torf. Nach diesem Lager von Bäumen unterscheidet man zwei Arten von Torf, obern und untern, wovon der erstere dichter, schwerer und dunkler gefärbt ist; der letztere besteht allein aus der Rinde, dem Holze und den Zweigen der untergegangenen Bäume, ist lichter von Farbe und loser von Gefüge, und diese Eigenschaften nehmen in der Tiefe immer mehr zu; doch gehen diese beiden Arten Torf in einander über. Die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: 29

Autor(en)/Author(s): Zuccarini Josef Gerhard

Artikel/Article: Bestimmungen einiger japanischen Pflanzen der Göring'schen Sammlung; 33-35