FLORA.

№ 5.

Regensburg. 7. Februar. **1844.**

Inhalt: Krauss, Pflanzen des Cap- und Natal-Landes. Fortsetzung. (Labiatae — Santalaceae). — Berichtigungen.

Pflanzen des Cap- und Natal-Landes, gesammelt und zusammengestellt von Dr. Ferdinand Krauss.

(Fortsetzung.)

Labiatae.

1114. *Mentha capensis Thunb.* — M. lavandulacea Willd. var. latifolia. — Ad rivulos m. Winterhoek, Majo.

1115. *M. aquatica L.* — In paludosis in Zitzikamma, Uitenhage, Mart.

s. n. *Salvia aurita Thunb.* — In solo argillaceo-arenoso in Zitzikamma, Mart.

1119. *S. crispula Benth.* — Ad rad. m. Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

n. sp. 1120. *S. granitica Hochst.* Suffruticosa, caulibus simplicibus hirtellis pedalibus, foliis oblongo-lanceolatis subintegerrimis vel superne serrato-dentatis, subtus prominenter reticulato-venosis, lucidis (glutinosis?), hispidulis, spicis simplicibus vel subramosis, verticillis paucifloris (geminifloris), pedicellis brevibus pubescentibus, bracteis parvulis, calycibus bilabiatis, dentibus cuspidatis. (Hochst.) — In solo granitaceo ad rad. mont. Babiloonse Toorn prope Caledon Decembri 1838 lecta est.

s. n. *S. aurea L.* — Ad latus occident. mont. Tigerberg, Julio — Aug., Alt. 200—500′.

1122. *S. nivea Thunb.* — In arenosis prope Constantiam et ad latus occident. mont. Tigerberg, Julio — Sept.

s. n. *S. paniculata L.* — Ad latera mont. Tigerberg, Cap, Majo.

n. sp. 1139. *Stachys natalensis Hochst.* (St. serrulata B. in schedulis scriptis). Caule adscendente dodrantali vel altiore hirsuto, foliis breviter petiolatis, late ovatis, subcordatis, semipollicaribus, crenato-serratis, obtusis, hirsuto-pubescentibus, verticillis bifloris, foliis floralibus (bracteis) ovatis calyce hirsuto brevioribus, corollae pu-

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0067-1

berulae labiis calycem excedentibus, tubo laciniis calycinis subspinosis breviori. (Hochst.) — In summis montibus Tafelberge, Natal, Octobri.

1124. *St. aethiopica L.* — Ad lat. mont. Leuwenberg, Cap, Majo, Alt. 800′.

1124 b. *St. serrulata Burch.* ? — Ad lat. mont. Winterhoek, Uitenhage, April., Alt. 2000′.

n. sp. 1125. *St. hispidula Hochst.* Suffruticosa, ramosa, humilis, ramis tenuibus foliisque cordatis, obtuse crenatis, breviter petiolatis hispidis, verticillis paucis, subquadrifloris, calycibus elongato-dentatis, dentibus lineari-lanceolatis tubum aequantibus, hispidulis. (Hochst.) — In solo argill. prope fl. Kromme, Uitenhage, Mart. 1839.

n. sp. s. n. *St. Kraussii Hochst.* Caulibus basi procumbentibus glabriusculis vel parce retrorsum hirtellis, petiolatis semipollicaribus vel paulo longioribus, ovato- vel deltoideo-lanceolatis, basi profunde cordatis, obtuse crenatis, glabriusculis, verticillis terminalibus paucis, bi trifloris, calycibus acutis glabris, corollis duplo longioribus, labio superiore puberulo. (Hochst.) — Affinis videtur Stachydi humifusae Burch.

s. n. *Leonotis Leonurus R. Br.* — In planitie capensi, ad radic. mont. Tafelberg et Tigerberg, Cap, et ad rivulos in Zitzikamma, Uitenhage, Mart. — Majo.

s. n. *L. ovata Spr.* — Ad ripas fl. Zwartkop, Koega etc. in district. Uitenhage, April.

1126. *Lasiocorys capensis Benth.* — Inter frutices et arbuscula circa Uitenhage, April.

1133. *Teucrium capense Thunb.* — In solo argillaceo prope fl. Camtoos, Uitenhage, Mart.

n. sp. 153. *T. riparium Hochst.* Caule ultra pedali simplici, erecto, dense pubescente, foliis lanceolatis, remotissime pauciserratis, superioribus lineari-lanceolatis integerrimis, cymis in superiore caulis parte axillaribus pedunculatis, folium subaequantibus, paucifloris. (Hochst.) — Inter arundines ad fluvium Umlaas R. terrae Natalensis Decembri 1839 lectum.

n. sp. 390 a et b. *Ocimum striatum Hochst.* (O. obovatum *E. Mey.*? quod nondum descriptum.) Fruticulosum, humile, hirsuto-pubescens, foliis obovatis, subintegerrimis vel superne serratis, subsessilibus, subtus minute punctatis, verticillis paucifloris, in spicam brevem condensatis, calycis dente supremo ovato, decurrente, reticulate-venoso, lateralibus truncatis, nervoso-striatis breviter ciliatis (calyce toto pubescente), infimis duabus aristato-subulatis, staminibus longe exsertis. — Calyx omnino *Ocimi filamentosi Forsk.*, sed planta verticillis approximatis et habitu diversissima. Habitat in graminosis per totam terram Natalensem, ubi Aug. 1839 lectum est. (Hochst.) — In planta 390 b. nonnisi folia majora, superne grosse serrata.

n. sp. 448. *O. teucriifolium Hochst.* Fruticulosum, tomento-

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0068-7

sum, humile, foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, margine revolutis, subtus albido-tomentosis, nervosis, verticillis sexfloris, calycis tomentosi dente supremo ovato, vix decurrente, colorato, lateralibus acutis, infimis subulatis. (Hochst.) — In radicibus montium Tafelberge terrae Natalensis Sept. 1838 lectum est.

n. sp. 1121. *O. helianthemifolium Hochst.* Fruticulosum, ramosum, aromaticum, foliis lineari-lanceolatis, incanis, obtusis, in petiolum brevem attenuatis, integerrimis, utrinque glanduloso-punctatis, verticillis remotis, subsexfloris, calycis resinoso-punctati dente supremo ovato decurrente, lateralibus truncatis ciliatis, infimis aristato-subulatis, filamentis longissimis. — Ad O. filamentosum *Forsk.* accedit, sed omnibus partibus minoribus et foliis integerrimis incano-tomentosis optime distinctum est. Ab O. serpyllifolio *Forsk.*, cui similis, differt foliis obtusis et subtus incano-tomentosis. (Hochst.) — In solo argillaceo prope Uitenhage, Aprili, 1839 lectum.

n. sp. 8. *O. rariflorum Hochst.* (Plectranthus rariflorus Hochst. in schedulis). Totum pubescentia patula tectum, foliis petiolatis, ovatis, serratis, versus basin cuneatis integerrimis, verticillis remotis, parifloris, calycis pedicellum subaequantis dente supremo ovato paululum decurrente, ceteris angustis, infimis longioribus, staminibus corolla brevioribus. (Hochst.) — Inter arundines ad fluvium Umlaas River terrae Natalensis Decembri 1839 floruit.

n. sp. 331. *Moschosma riparium Hochst.* (Plectranthus riparius Hochst. in schedulis). Foliis cordatis vel dilatato-ovatis, duplicato-crenatis, petiolatis, pubescentibus, floribus paniculato-racemosis, racemorum verticillis subsexfloris, floribus parvulis, corolla calycem minutum subaequalem longe superante. (Hochst.) — Habitat ad ripas rivulorum nec non fluviorum terrae Natalensis, ubi Julio 1839 lectum est.

1113. *Plectranthus fruticosus L'Herit.* — In sylvis primitivis Outeniqua, George, Jan.

75. *P. tomentosus E. Mey.* — Ad sylvarum margines circa Natalbai, Octobri.

n. sp. 1112. *P. (Coleus) subspicatus Hochst.* (Plectranthus spicatus E. M.?) Caule elongato simplici, foliis petiolatis, rhomboideo-ovatis, obtuse crenatis, subtus punctatis, utrinque hirto-pubescentibus vel subtomentosis, racemo longissimo spicaeformi, verticillastris paulo remotis, subcompositis, calycis parvuli resinoso-punctati hirtelli dente supremo subovato, reliquis angustioribus acutis, corollae calyce multoties longioris fauce inflata, labiis glandulosopunctatis. (Hochst.) — Lectus in solo argillaceo prope Uitenhage, Aprili 1839.

330. *Hyptis pectinata Poit.* — Ad sylvarum margines circa Natalbai, Julio.

96. *Syncolostemon densiflorum E. Mey.* — Ad sylvarum margines prope fl. Umlaas, Natalbai, Dec.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0069-5

145. *S. ramulosum E. Mey.* — In planitie inter fl. Umlaas et Natalbai, Nov.

329. *Echinostachys reticulata E. Mey.* — Ad sylv. margines circa Natalbai, Nov.

Verbenaceae Juss.

1. Verbeneae.

n. gen.! 333. *Cyclonema sylvaticum Hochst.* Flor. Ratisb., 1842., I. p. 225. — In sylvis prope fl. Umlaas, Natal, Octobri.

n. sp. 335. *C. serratum Hochst.* ibid. — In sylvis prope fl. Umlaas, Natal, Octobri.

n. sp. 106 c. *C.? hirsutum Hochst.* ibid. — In graminosis planitiei inter fl. Umlaas et Natalbai, Octobri.

151. *Verbena officinalis L. var. natalensis Hochst.* — Ad fluv. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 247. *Lippia scabra Hochst.* Foliis subsessilibus oblongis crenatis, versus basin attenuatis integerrimis, supra scabris, subtus resinoso-punctatis subtomentosis, capitulis axillaribus cylindricis hirtellis, pedunculo scabro folium subaequante, drupa calyce bivalvi tecta, bipartibili. Planta aromatica (fruticosa?), Lantanae salviaefoliae *Jacq.* similis, ad sylvarum margines circa Natalbai, Junio 1839 lecta.

182. *Zapania nodiflora Lam.* — In arenosis ad orificium fl. Umlaas, Natal, Dec.

420. *Priva dentata Pers.* — Circa Natalbai, copiose, Octobr.

1129. *Chascanum cuneifolium E. Mey.* — Ad latus m. Winterhoek, Uitenhage, Aprili, Alt. 1000′.

1086. *Ch. cernuum E. Mey.* — In arenosis prope Winterhoek, Cap, Sept.

s. n. *Spielmannia africana Willd.* — Ad latus m. Duyvelsberg et Muysenburg, Julio, Alt. 1—2000′.

1134. *Lantana salviaefolia Jacq.* — Ad rivulos in radic. m. Winterhoek. Uitenhage, Aprili.

241. *Avicennia tomentosa L.* (Witte Mengerhout Incolarum). — In limosis salsis circa Natalbai, Junio.

2. Selagineae.

1628. *Agathelpis angustifolia Chois.* — Ad latus m. Duyvelsberg et prope Constantiam, Julio — Sept.

1623. *Ag. angustif. Chois. var.* — Ad latus montium prope Genadenthal, Dec.

1627. *Ag. nitida E. Mey.* — Ad lat. mont. Duyvelsberg, Julio, Alt. 1000′.

1137. *Selago diffusa Thunb.* — Prope fl. Zeekoe, Uitenhage, Mart.

1089. *S. stricta Berg.* — Ad latus mont. Tigerberg, Cap, Novembri.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0070-6

n. sp. 1102. *S. incisa Hochst.* Fruticosa, foliis pinnatifido-incisis, glabriusculis, versus basin attenuatis integerrimis, summis minutis inciso-dentatis, floribus spicatis, paucis corymbosis. (Hochst.) — Lecta Decembri 1838 ad latera mont. prope Genadenthal, Zwellendam, Alt. 1—2000′.

1108. *S. adpressa Chois.* — Ad latus mont. Tigerberg, Cap, Novembri.

n. sp. 1094. *S. lobeliacea Hochst.* Herbacea, pubescens, foliis obovato-lanceolatis sessilibus, inferne cuneatis integerrimis, superne dentatis, spicis subsolitariis terminalibus. — Affinis S. herbaceae *Choisy*, quae differt foliis petiolatis. (Hochst.) — Junio 1838 ad latus occident. montis Tafelberg florens lecta est, Alt. 2000′.

1104, 1105. *S. herbacea Choisy.* — In dunis Zitzikamma, Martio.

n. sp. 225. *S. racemosa Bernhardi.* Suffruticosa, erecta, ramis adscendentibus, foliis sparsis, lineari-lanceolatis trinerviis subsessilibus integerrimis, racemis terminalibus bracteatis, bracteis florem pedicellatum subaequantibus lanceolato-linearibus, calycis laciniis subulatis. — In locis graminosis prope Natalbai, Junio. Affinis S. trinerviae E. Mey. at flores non corymbosi, sed racemosi. Nervi foliorum laterales margini paralleli.

1102. *S. fasciculata L.* — Ad rivulos mont. Bavianskloof, Decembri.

1107. *S. verbenacea L. fil.* — In sol. lapidoso-arenoso prope Hangklip, Nov., Alt. 1000′.

1098. *S. spuria L.* — Ad latus mont. Hottentotts-Holland (Stellenbosh), Novembri.

1097. *S. rapunculoides L.* — In collibus inter m. Hottentotts-Holland et Howhoek, Novembri.

1096. *S. coccinea L.* — In arenosis planit. capens., Nov.

379. *S. hyssopifolia β. lanceolata E. Mey.* — In graminosis radic. mont. Tafelberg, Natal, Sept.

1100. *S. corymbosa L.* — In planit. capens., Majo.

1101. *S. polystachya L.* — In solo argillaceo per tot. distr. Zwellendam, Jan.

1090. *S. cinerea L.* — Inter frutices prope fl. Koega, Uitenhage, Aprili.

1099. *S. glabrata Choisy.* — In radic. mont. Aasvogelberg, Zwellendam, Jan.

n. sp. 1098 b. *S. densifolia Hochst.* Caule erecto lignoso ramoso, foliis confertissimis, angustissime linearibus, paucidentatis, ½—1-pollicaribus, glabris, spicis elongatis corymbosis, bracteis lineari-lanceolatis calyce duplo longioribus, floribus minutis. — Ad S. rapunculoidem L. proxime accedit, sed differt foliis densius confertis et floribus plus duplo minoribus. (Hochst.) — In lapidosis prope Tulbagh, Majo 1838.

1136. *S. leptostachya E. Mey.*? — In solo argillaceo prope fluv. Camtoos, Uitenhage, Mart.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0071-2

1091. *S. coerulea Burch.* — Inter lapides ad radicem mont. Winterhoek, Aprili.

1092. *S. scabrida Thunb.* — Ad lat. mont. Tigerberg, Majo. Alt. 600′.

1109. *S. fruticosa L.* — In collibus in Zitzikamma, Mart.

1135. *S. ciliata Thunb.* — Ad sylv. margines prope George, Januario.

S. cinerascens E. Mey. — Ad latus m. Duyvelsberg, Cap.

n. sp. 1106. *Walafridia trimera Hochst.* Fruticosa, ramis tetragonis ad angulos puberulis, foliis ovatis vel ovato-lanceolatis integerrimis subtrinerviis coriaceis glaberrimis, spicis solitariis terminalibus, calyce trimero (profunde trifido.) — Varietas Walafridiae nitidae *E. M.*?, a qua vix differt nisi calyce trifido. (Hochst.) — In solo lapidoso ad latera collium Uitenhage, Aprili 1839 lecta.

1005. *Polycenia hebenstreitioides Choisy.* — Ad rivulos in radic. m. Tigerberg, (Cap), Julio.

1093. *Hebenstreitia dentata L.* — Ad latus mont. Duyvelsberg, Julio.

n. sp. 327. *H. comosa Hochst.* Foliis lanceolatis, grosse serratis, versus basin attenuatis integerrimis, glabris, spica terminali longissima, bracteis longe acuminatis, in summitate spicae flores nondum evolutos duplo superantibus. (Hochst.) — In graminosis circa Natalbai, Julio 1839 lecta.

1640. *Dischisma capitatum Choisy.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1629. *D. arenarium E. Mey.* — In solo argillaceo prope Greenpoint, Sept.

3. Stilbineae Kunth.

Stilbe cernua Thunb. — Ad lat. m. Duyvelsberg, Julio.

1060. *S. pinastra L.* — Ad latus australe m. Tafelberg, Sept. Alt. 2000′.

n. gen.! 1110. *Eurylobium serrulatum Hochst.* Flor. Ratisb., 1842, I. pag. 228. — Inter rupes in summis montibus prope Genadenthal, Dec. Alt. 3000′, bunt. Sandstein.

Acanthaceae Juss.

1127. *Hypoestes aristata Sol.* — Ad sylvarum margines in Zitzikamma, Mart.

1127 b. *H. verticillata Roem. et Schult.* — Ad sylvarum margines prope fl. Goukamma, George, Mart.

231. *Aetheilema reniforme R. Br.* — In sylvis circa Natalbai, Junio.

21. *Blepharis integrifolia E. Mey.* — In graminosis ad radic. montium Tafelberge, Natal, Dec.

1117. *B. capensis Pers.* — In solo argillaceo prope fluv. Olifants, (George), Jan.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0072-8

1118. *B. procumbens Pers.* — In arenosis ad ripas fl. Koega et Zwartkop, (Uitenhage), April.

n. sp. 304. *Gendarussa prunellaefolia Hochst.* Fruticulosa, caule subramoso ramisque tetragonis puberulis, foliis semipollicaribus, floralibus duplo vel triplo brevioribus, breviter petiolatis, ovatis vel ovato-lanceolatis obtusissimis, supra scabriusculis vel parce hirtellis, subtus praesertim ad nervos sparsim hirtellis vel glabriusculis, margine ciliolato-scabris, floribus axillaribus sessilibus, folia superantibus, bracteis foliiformibus, saepe glanduloso-pubescentibus, calycis laciniis angustis ciliatis. (Hochst.) — Ad sylvarum margines circa Natalbai, Julio 1839.

n. sp. 61. *G. mollis Hochst.* (non Justicia mollis E. M.) Caulibus tetragonis simplicibus dense hirsuto-pubescentibus dodrantalibus, foliis semipollicaribus late ovatis obtusis, utrinque dense hirtellis, breviter petiolatis, floribus axillaribus solitariis, sessilibus, folio brevioribus, floribus pubescentibus calycem brevem hirtellum longe superantibus (Hochst.) — In graminosis planitiei inter fl. Umlaas et Natalbai lecta Novembri 1839.

n. sp. 453. *G. densiflora Hochst.* Fruticulosa, ramis tetragonis dense pubescentibus, foliis subpollicaribus ovato-oblongis vel lanceolatis, obtusiusculis subsessilibus hirto-pubescentibus, nodis floriferis in capitulum apice foliis floralibus decrescendo diminutis calycibusque paulo prominentibus comosum approximato-condensatis; floribus axillaribus folia floralia superantibus, corollis puberulis, calcare loculi inferioris longiore, styli indivisi stigmate obtuso. (Hochst.) — In collibus prope Pieter Mauritzburg terrae Natalensis, Septembri 1839, Alt. 1—2000′.

n. sp. 302. *Rhytiglossa glandulosa Hochst.* Caule obtuse tetragono (subhexagono), inferne glabriusculo, foliis longe petiolatis, 2—3-pollicaribus, ovatis, acutis, integerrimis, utrinque pubescentibus, penninerviis, inflorescentia verticillato-spicata, ramosa, dense glanduloso-pubescente, verticillis parum remotis vel subapproximatis paucifloris, bracteis rotundato-acuminatis ciliatis, laciniis calycinis subulatis glanduloso-pubescentibus, capsulis anguste unguiculatis, acutis, glabris, seminibus papillosis. (Hochst.) — In umbrosis sylvarum circa Natalbai, Julio 1839, copiosissime.

n. sp. 1128. *Rh. rubicunda Hochst.* Fruticulosa, ramosa, ramis viridibus, pube deflexa vestitis, teretiusculis, foliis ovatis petiolatis, utrinque pubescentibus, lamina vix pollicari, plerumque semipollicari vel breviore, spicis brevibus terminalibus axillaribusque, bracteis obverse lanceolatis vel anguste spathulatis villosis, laciniis calycinas lineares hispidulas et subglandulosas superantibus, corollis ut videtur rubicundis, capsulis glabris, seminibus rugosis. (Hochst.) — In sylvis primitivis districtus Zitzikamma, Mart. 1839.

n. sp. s. n. *Tyloglossa pubescens Hochst.* Caule hexagono pubescente, foliis breviter petiolatis subpollicaribus minoribusve ovatis, supra scabridis, subtus sparsim pubescentibus, margine ciliatis, floribus axillaribus subbinis inter bracteas duas oblongas vel

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0073-3

subovatas stipitatas foliiformes, corollis capsulisque puberulis. Bracteae flore longiores et folio similes hanc speciem ab affini T. Schimperi mea praeter alias notas distinguunt. (Hochst.) — In sylvis circa Natalbai, Julio lecta est.

380, 306. *Chaetacanthus Persoonii N. ab Es.* — In limosis humidis circa Natalbai, Julio.

1639. *Ch. Pers. N. ab Es.* — Inter fl. Gauritz et Brakke, (George), Jan.

n. sp. 262. *Dyschoriste biloba Hochst.* (Ruellia biloba in schedulis scriptis). Herbacea, caulibus spithamaeis vel pedalibus tetragonis, parce ramosis pubescentibus; foliis pollicaribus minoribusque subcordato-ovatis acutis, brevissime petiolatis, utrinque sparsim puberulis, spicis terminalibus paucifloris, floribus remotiusculis solitariis breviter pedicellatis, ad basin pedicelli bibracteolatis, corolla calyce quadruplo longiore, stigmate evidenter bilobo. (Hochst.) — In umbrosis sylvaticis circa Natal, Junio 1839.

1116. *Barleria obtusa var. cymulosa N. ab E.* — Inter arbuscula prope Uitenhage, Aprili.

1651. *Thunbergia capensis Retz.* — In solo argillaceo prope fl. Kromme, Uitenhage, Mart.

405. *Th. atriplicifolia E. Mey.* — In graminosis per tot. terram natalensem, Aug., Sept.

Primulaceae Juss.

1537. *Anagallis latifolia L.* — In arenosis planitiei capensis, Septembri.

s. n. *A. arvensis L.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

1251 *Samolus Valerandi L.* — In uliginosis planitiei capensis, Novembri.

1526. *S. campanuloides R. Br.* — In uliginosis planitiei Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

Lentibularieae Rich.

1552. *Utricularia capensis Thunb.* — In uliginosis planitiei capensis, Novembri.

Plumbagineae Juss.

1. Plumbageae.

Plumbago capensis Thunb. — In sylvis et ad sylv. margines in distr. George et Uitenhage, Febr., Mart.

2. Staticeae.

s. n. *Statice scabra Willd.* — Inter saxa prope litus, Vanlampsbai, (Cap), Majo.

1553. *St. cinerea Poir.* — In solo argillaceo-calcareo prope Zoutpan in Zoetendalsvalley, Dec. (Meereskalk.)

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0074-9

1564. *St. linifolia Thunb.*? (ex loc. nat.) var. — *St. Kraussiana Buchinger* olim in schedul. — In solo argillaceo - calcareo prope Zoutpan in Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

Plantagineae Juss.

1344. *Plantago remota Lam.* — In solo argillaceo ad fl. Zeekoe, Uitenhage, Mart.

1541. *Pl. hirsuta Thunb.* — In arenosis ad rivulos m. Tigerberg, (Cap), Jul., Aug., Alt. 500′.

1540. *Pl. carnosa Lam.* — In solo argillaceo - arenoso per tot. Langekloof, (George), Febr., Mart.

1539. *Pl. major L.* — In locis humidis prope Melkhoutkraal, (Knysna), Jan.

1538. *Pl. graminea Lam.* — In limosis salsis prope litus, Knysna, Jan.

Subclass. 4. Monochlamydeae.

Amaranthaceae Juss.

221. *Alternanthera sessilis R. Br.*, E. Mey.! comm. l. c. Meisn. in Hook. Lond. Journ. of Bot., 2, p. 446. — In salsis humosis circa Natalbai, Junio.

n. sp. 294. *Sericoma* (*Euchroa*) *chrysurus Meisn.* l. c. p. 447.* S. trichinoides Fenzl in Linnaea 1843, p. 324? — In graminosis ad sylvarum margines circa Natalbai, Julio.

780 (ex parte). *Achyranthes aspera L.*, E. Mey. l. c., Meisn. l. c. p. 447. — Ad radicem montis Tafelberg, Cap, Julio.

785. *A. leptostachya E. Mey.*! l. c., Meisn. l. c. p. 448.* — In solo arenaceo ad ripas fl. Koega, Uitenhage, Aprili.

298. *Aërva lanata Juss.*, Roem. et Schult. Syst. 5. p. 564, Meisn. l. c. — Terram succumbens in graminosis circa Natalbai, Julio.

780 (ex parte). *Desmochaeta atropurpurea DC.*, E. Mey.! l. c., Meisn. l. c. — In sylvis primitivis prope fl. Goukamma, George, Februario.

782. *Amaranthus albus L.*, Thunb., Meisn. l. c. — In solo argillaceo in Zitzikamma, Uitenhage, Mart.

781. *A. polygonoides L.*? Meisn. l. c. — Prope villam Uitenhage, Aprili.

238. *Celosia triloba E. Mey.*! l. c., Meisn. l. c.* — In graminosis prope fl. Umgani, Natal, Junio.

n. sp. 37. *Lestiboudesia? caffra Meisn.* l. c. p. 449.* — Affin. L. virgatae Roem. et Schult. — In graminosis ad sylvarum margines prope fl. Umlaas, Natal, Dec.

Chenopodeae DC.

783. *Salicornia indica Vahl*, E. Mey. in Hb. Drège, Meisn. l. c. p. 450. — Ad ostium fl. Knysna, George, Jan.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0075-5

789. *Atriplex Halimus L.*, Meisn. l. c. — *A. portulacoides E. Mey.* l. c. — Ad rivulos mont. Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

788. *Chenopodium ambrosioides L.*, Thunb., Meisn. l. c. — In solo argillaceo prope fl. Knysna, George, Jan.

791. *Ch. mucronatum Thunb.?*, Meisn. l. c. — Ad rivulos mont. Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

790. *Ch. murale L.*, E. Mey.! l. c., Meisn. l. c. — Circa domicilia incolarum in Zitzikamma, Mart.

792 *Ch. Botrys L.*, Meisn. l. c. — Ad ripas fl. Koega, prope Elandshorn, Uitenhage, Aprili.

786. *Kochia sericea Schrad.*, Meisn. l. c. — *Salsola diffusa Thunb.* — Ad ostium fl. Knysna, George, Febr.

Polygoneae Juss.

802. *Polygonum tomentosum Willd. β. denudatum Meisn.* (Linnaea 14. p. 483) l. c. p. 450. — Ad rivulos montium Winterhoek, Uitenhage, Majo.

300. *P. tom. γ. strigillosum* Meisn. l. c. — In locis humidis prope fl. Knysna, George, Jan.

801. *P. strictum All. α.* Meisn. l. c. — Ad rivulos planitiei capensis, Sept.

283. *Oxygonum Dregeanum Meisn.* (Linnaea 14, p. 487.) l. c. p. 451. — In graminosis circa Natalbai, Julio.

1265 b. *Atraphaxis undulata L.*, Meisn. l. c. — In solo lapidoso-arenoso in Langekloof, George, Febr.. Mart.

784. *Emex Centropodium Meisn.* l. c. — *E. australis Steinheil.* — Ad rivulos montium Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

789. *Rumex Nepalensis Spreng.* — Ad rivulos montis Koeberg, Cap, Aug.

795. *R. Meyeri Meisn.* l. c. *α. forma elatior.* — In uliginosis planitiei capensis, Sept.

797. *R. Mey. Meisn.* l. c. *β. forma humilis.* — In uliginosis planitiei Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

793. *R. Acetosella L.*, Meisn. l. c. — In vineis Constantiae, Cap, Sept.

794. *R. lativalvis Meisn.* l. c. *α. acetosoides.* — In solo argillaceo prope Constantiam, Sept.

796. *R. sagittatus Thunb. β. latilobus Meisn.* l. c. — Ad sylvarum margines prope fl. Goukamma, George, Febr.

799. *R. cordatus Desf.*, Meisn. l. c. — Ad latera montium Tafelberg et Duyvelsberg, Cap, Julio, Alt. 1—2000′.

Proteaceae Juss.

1928. *Aulax pinifolia R. Br.* — Ad lat. mont. Duyvelskop, (George), Febr., Alt. 1—2000′.

1029. *A. umbellata R. Br.* — Ad lat. mont. Hangklip et Groote Howhoek, Nov., Alt. 800—1500′.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0076-1

1043, 1045. *Leucadendron uliginosum R. Br.* — In uliginosis planit. capensis, Sept.

1044. *L. salignum R. Br.* — Ad lat. austr. montis prope Constantiam, et in planit. capensi, Sept.

1047. *L. ascendens R. Br.* — In radic. mont. Tafelberg et Duyvelsberg, Majo, Junio, Alt. 600—1000′.

1048. *L. virgatum R. Br.* — Ad lat. mont. Duyvelsberg, Tafelberg etc., Junio.

1049. *L. glabrum R. Br.* — Ad lat. montium Steenberge, Sept., Alt. 800—1200′.

1050, 1062. *L. Levisanus R. Br.* — In arenosis planit. capensis, Nov. et in dunis prope Cap, Magulhas, (Zwellendam), Dec.

1052. *L. floridum R. Br.* — Inter frutices circa Paarl, (Stellenbosh), Julio.

1051. *L. heterophyllum E. Mey.* (in plantis Dregeanis). — Inter frutices circa Paarl, (Stellenbosh), Julio.

s. n. *L. argenteum R. Br.* — Ad latera montium prope urbem usque ad mont. Muysenburg, Sept.

1035. *Protea mellifera Thunb. c. flor. alb. et rubr.* — Prope urbem ubique et ad lat. mont. Kouga, (George), Julio.

1034. *P. Scolymus Thunb.* — In arenosis planitiei capensis, Septembri.

1072. *P. grandiflora Thunb. β. angustifolia Klotzsch.* — In summ. montibus Tafelberg, Duyvelsberg, Muysenburg, Jul. — Sept.

176. *P. grandifl. Thunb. β. angustif. Klotzsch.* — In graminosis planit. inter fl. Umlaas et Natalbai, Dec.

1073. *P. compacta R. Br.* — In montibus prope fl. Klein, Zwellendam, Dec.

1076. *P. cynaroides L. fil.* — In summis montibus Peninsulae, Mart., Alt. 2—3000′.

n. sp. *P. cyn. L. fil. var. elliptica Klotzsch.* Foliis minoribus, ellipticis, utrinque acutis, glabris, longissime petiolatis; bracteis evanescente tomentosis. — In solo argillaceo-arenoso in Zitzikamma, Mart. (bunter Sandstein).

1032. *P. longifolia Andr.* — Ad latera montium prope Hangklip, Novembri.

1032. *P. lepidocarpa R. Br.* — In Kloof inter mont. Tafelberg et Leuwenberg, Majo, Junio, Alt. 800—1500′.

1033. *P. neriifolia R. Br.* — Ad latus australe mont. Duyvelskop, (George), Alt. 1000′. Febr.

1030. *P. incorrupta R. Br.* — In Kloof inter m. Tafelberg et Leuwenberg, Junio, (Granit).

1042. *P. speciosa L. fil.* — Ad lat. montium prope fl. Klein, (Zwellendam), Dec.

s. n. *P. speciosa L. fil.* var. — Inter rupes ad lat. oriental. m. Tafelberg, Aug., Sept., Alt. 2000′.

1071. *P. acaulis Thunb.* — In summis montibus Peninsulae (Cap) et Winterhoek, (Uitenhage), Aprili — Julio.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0077-6

n. sp. 202. *P. hirta Klotzsch.* Foliis oblongis, acutis, basi subattenuatis, coriaceis, tenuibus, ramisque hirtis; capitulo terminali; involucro hemisphaerico; bracteis hirsutis, ex albido-ferrugineis; calycis unguibus laminisque villosis; stylis glabris. — Ad radicem montium Tafelberge prope fluv. Umlaas, Natal, Novembri, Alt. 800—1500′, (bunt. Sandstein). — Folia plana, oblonga, tres uncias longa, novem lineas lata. Involucrum erectum, sessile, magnitudine pomi minoris. Bracteae hirsutae, margine barbatae, exteriores acutae, interiores spathulatae calycibus breviores. Calyces albido-villosi, sesquiunciales.

s. n. *P. longiflora L.* — Inter saxa in summis m. Winterhoek (Uitenhage), Majo, Alt. 3000′.

1075. *P. long. L. α. latifolia Klotzsch.* — Ad sylv. margines prope Georgetown, Januario, (bunt. Sandstein).

1074. *P. long. L. β. Mundii Link*, Klotzsch (Icones plant. t. 22). — In sylv. primitiv. Outeniqua, Januario.

1039. *Leucospermum nutans var. α. R. Br.* — Ad lat. mont. Groote Howhoek et prope Elim, (Zwellendam), Nov., Dec.

1063. *L. buxifolium R. Br.* — Ad lat. mont. Hangklip et Groote Howhoek, Nov., Alt. 1—2000′.

1064. *L. patulum R. Br.* — In planitie Zoetendalsvalley, (Zwellendam), Dec., (Meereskalk).

1065, 1066. *L. attenuatum R. Br.* — In solo calcareo planitiei Zoetendalsvalley, Dec., (Meereskalk).

1067. *L. hypophyllum R. Br., var. α. angustifolium Klotzsch.* — In arenosis planitiei capensis, Julio.

1068. *L. hypoph. R. Br. var. β. latifolium Klotzsch.* — In arenosis planitiei capensis, Sept.

n. sp. 1069. *L. pedunculatum Klotzsch.* Ramis tenuibus, elongato-flexuosis, pubescentibus; foliis linearibus, calloso-acutis, basi cuneatis, patentibus, evanescente puberulis; capitulis axillaribus, pedunculo pubescente, duplo brevioribus; bracteis lanceolato-linearibus, villosis, calyce brevioribus; stylo glabro, longissimo; calyce piloso, unguibus cohaerentibus glabris, stigmate clavato. — In arenosis planitiei Zoetendalsvalley, (Zwellendam), Decembri, (Meereskalk). — Folia laete viridia, 14 lin. longa, lineam lata. Capitula magnitudine juglandis minoris. Species affinis L. diffuso.

1036. *L. molle R. Br.* — Ad latera montium prope Hangklip et ad ripas fl. Palmiet, (Zwellendam), Nov.

1040. *L. ellipticum R. Br.* — Inter frutices prope Paarl, (Stellenbosh), Aug.

1041. *L. conocarpum R. Br.* — In arenosis planitiei capensis et ad montium latera Peninsulae, Sept., Alt. 2000′.

1055. *Serruria elongata R. Br.* — In collibus prope Elim, (Zwellendam) Dec.

1056. *S. Burmanni α. R. Br.* — Ad lat. m. Duyvelsberg prope Waterfall, Aug.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0078-2

1057. *S. ciliata R. Rr.* — In arenosis planitiei capensis et ad montium lat. prope Constantiam, Mart.

1059. *S. scariosa R. Br.* — In montibus prope fl. Klein, Zwellendam, Dec.

1053. *Mimetes purpurea R. Br.* — In arenosis planitiei capensis, Julio.

n. sp. *M. parviflora Klotzsch.* Caule procumbente, ramis tenuibus, adscendentibus, puberulis; foliis ovalibus, obtusis, enerviis, glabris, margine pubescentibus; capitulis minoribus; bracteis linearibus, obtusis, ciliatis; calycibus pubescentibus; stylis infra medium pilosis. — In arenosis prope Uitershoek, (Cap), Septembri, Alt. 800—1000′. — Species affinis M. thymelaeoidi.

1037. *M. Hartogii R. Br.* — In collibus prope fl. Palmiet, Zwellendam, Nov., (Grauwacke).

1038. *M. hirta R. Br.* — In uliginosis prope Uitershoek, (Cap), Sept., Alt. 800′.

1058. *Sorocephalus salsoloides R. Br.* — In summitate mont. Baviaanskloof, Zwellendam, Dec., Alt. 3000′.

1061. *S. tenuifolius R. Br.* — In solo lapidoso-arenoso prope Elim, Zwellendam, Dec.

1648. *Spathalla laxa R. Br.* — In montibus prope fl. Klein, (Zwellendam), Novembri.

Penaeaceae R. Br.

s. n. *Penaea squamosa L.*, Meisn. apud Hook. l. c. pag. 456. — Inter rupes in summitate montis Tafelberg, Majo, Alt. 3500′.

s. n. *P. Sarcocolla L.* — Ad latera montium Duyvelsberg et Muysenburg, Cap, Junio, Alt. 2000′.

s. n. *P. mucronata L.* — Ad latus occidentale montis Duyvelsberg, Junio.

1214. *P. Cneorum Lam.*, Meisn. l. c. — Ad ripas fl. Notsinakamma, George, Jan.

1213. *P. myrtilloides Thunb. β. multiflora Meisn.* l. c. — P. myrtoides Linn. fil. (Drège n. 8156?) — Inter lapides ad rivulos montium Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

s. n. *P. fruticulosa Thunb.* — In arenosis planitiei capensis prope Rietvalley, Aug.

Thymeleae.

772. *Passerina anthylloides L. fil. α. vulgaris Meisn.* (in Linnaea 14, p. 393) in Hook. Lond. Journ. of Bot. 1843, 451. — In collibus prope fl. Knysna, George, Jan.

779. *P. anthylloides L. fil. β. macrophylla Meisn.* l. c. p. 452. — In graminosis mont. Tafelberge, Natal, Sept., Alt. 2500—3000′.

292. *P. anth. forma inter β. et γ. media Meisn.* l. c. — In graminosis circa Natalbai, Julio.

751. *P. laxa Wikstr.*, Meisn. l. c. — In solo granitaceo in Kloof inter m. Tafelberg et Leuwenkop, Julio.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0079-1

754. *P. spicata L. fil.* — In planit. Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

s. n. *P. conglomerata Thunb.* — Lachnaea conglomerata *L.* — In arenosis prope litus Houtbai, Cap, Sept,

756. *Cryptadenia grandiflora Meisn.* l. c. — In arenosis planitiei capensis prope Rietvalley, Junio.

1835. *C. uniflora Meisn.* — In arenosis planitiei capensis, Novembri.

s. n. *Lachnaea eriocephala Lam.* — Ad latera montium Hottentotts-Holland, Stellenbosh. Nov.

1744. *L. phylicoides Lam.* — In arenosis planitiei capensis, Novembri.

761, 762. *L. capitata Meisn.* l. c. α. et β. — ibid. Majo.

773. *L, diosmoides α. elatior Meisn.* l. c. — In sylvis Outeniqua prope George, Jan., Alt. 1000′.

1265 a. *L. axillaris Meisn.* l. c. — In solo arenoso planitiei Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

n. sp. 455. *Gnidia (Pentamerae) Kraussiana Meisn.* in Hook. Lond. Journ. 2. p. 452.* *α. pubescens.* — Ad latera mont. Tafelberge, Natal, Sept., frequens.

n. sp. 455 b. *G. (Pent.) Kraussiana β. glabrata Meisn.* l. c. p. 453. — Ad latera mont. Tafelberge, Natal, Sept.

n. sp. 237. *G. (Pent.) macropetala Meisn.* l. c.* — Ad sylvarum margines inter fl. Umlaas et Umslutie, Natal, Jun., frequens.

771. *G. sericea L.* — In solo argillaceo planitiei capensis prope Groot Constantiam, Sept.

n. sp. 776. *G. (Tetramerae) tenella Meisn.* l. c. p. 454.* — Ad latera mont. Steenberge et prope Constantiam, Sept.

757. *G. oppositifolia L.*, Meisn. l. c. — In graminosis ad latera mont. prope Genadenthal, Dec.

770. *G. pubescens Berg.*, Meisn. l. c. p. 454. — In summis montibus prope Constantiam, Sept., Alt. 2000′.

775. *G. carinata Thunb.*, Meisn. l. c. p. 455. — In sylvis primitivis Outeniqua, Dec.

752. *G. pinifolia L.*, Meisn. l. c. — Ad latus occidentale montis Tafelberg, Cap, Majo.

759. *G. cuneata a. spathulata Meisn.* — In collibus prope villam Uitenhage, Aprili.

808. *G. subulata Lam.!* Meisn. l. c. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

774. *G. juniperifolia Lam.! β. uncinata Meisn.* l. c. (forma foliis obsolete uncinatis). — In montibus prope fl. Kleine R., Zwellendam, Dec.

755. *G. juniperif. γ. pubigera Meisn.* l. c. — In solo calcareo planitiei Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

777. *G. decurrens Meisn.* in Linnaea 14, p. 451; apud Hook. l. c. p. 455. — In arenosis planitiei capensis, Sept.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0080-2

757. *G. coriacea Meisn.* l. c. p. 454; apud Hook. l. c. p. 455. — Ad latera montium Winterhoek, Uitenhage, Aprili.

766. *Struthiola virgata L. β. pubescens Meisn.* l. c. p. 464; apud Hook. l. c. p. 455. — Ad latera montis Duyvelsberg, Julio.

767. *St. virg. var. glabriflora Meisn.* l. c. p. 469. apud Hook. l. c. p. 455. — In montibus prope fl. Kleine R., Zwellendam, Decembri.

760, 760. *St. erecta L. a. angustifolia Meisn.* l. c. p. 469; apud Hook. l. c. p. 455. — In arenosis prope Constantiam, Sept.

769 (nec 760). *St. parviflora Bartl.*, Meisn. l. c. p. 467; apud Hook. l. c. p. 455. — In solo argillaceo-arenoso in Zitzikamma, Martio.

763. *St. dodecapetala Bartl.*, Meisn. l. c. p. 475; apud Hook. l. c. p. 455. — An a *St. chrysantha Lichtenst.* satis distincta? — Ad latera montis Duyvelskop, George, Febr., Alt. 2000′.

764. *St. hirsuta Wikstr.*, Meisn. l. c.; apud Hook. l. c. p. 456. — In collibus prope fl. Knysna, George, Jan.

765. *St. striata Lam.*, Meisn. l. c.; apud Hook. l. c. p. 456. — In arenosis planitiei capensis, Nov.

768. *St. lucens Poir.!*, Meisn. l. c. p. 478; apud Hook., p. 456. — In summitate montis Tafelberg, Majo, Alt. 3500′.

768 b. *St. longiflora Lam.!* Meisn. l. c. p. 479; apud Hook. p. 456. — In Kloof inter montes Tafelberg et Leuwenkop, Sept., Alt. 1000′.

n. gen. 427. *Peddiea africana Harvey* (in Hook. Journ. of Bot. 1840, p. 266, T. X.) = *Cyathodiscus umbellatus Hochst.* in Flor. Ratisb. 1842, p. 240. = *Cestrum umbellatum E. Mey.* in pl. Dregeanis (eheu!) — In sylvis primitivis natalensibus, Octobr.

Grubbiaceae Endl.

1755. *Ophira stricta Lam.*, Herb. Drège! — Ad lat. montium Outeniqua, (George), Jan., Alt. 1000—1500′.

s. n. *Grubbia rosmarinifolia Berg.*, Herb. Drège! — In summitate montis Tafelberg, Cap, Majo, Alt. 3500′.

Santalaceae R. Br.

1693. *Thesium fragile Thunb.* — In dunis planitiei capensis, Novembri.

s. n. *Th. frag. Thunb.* plant. tenuior. — In distr. Zwellendam, Decembri.

1802. *Th.* (*Thesiosyris*) *hispidulum Lam.* (Th. corniculatum E. Mey.) — In dunis Zitzikamma, Mart.

n sp. *Th.* (*Thes.*) *racemosum Bernh.* Suffruticosum, glabrum, caulibus angulatis, simpliciter ramosis, foliis alternis sessilibus lanceolato-linearibus carinatis, margine pellucidis, acutis; floribus solitariis, breve pedunculatis, involucello triphyllo circundatis, racemum terminalem formantibus, calycis limbo quinquepartito, laciniis

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0081-7

carinatis, apice incurvatis, intus nudis. — In graminosis ad latera montium Tafelberge, Natal, Augusto.

1808, 1811. *Th. capitatum Thunb.* — In argillaceo-arenosis prope Constantiam, Sept.

1806. *Th. capit. Thunb. var. interrupta?* — Ad rivulos m. Winterhoek, Aprili.

1812. *Th. scabrum Th.* — Ad lat. montium Steenberge et prope Constantiam, Sept., Alt. 5—800′.

s. n. *Th. euphorbioides L.* — In radic. montium Winterhoek, Uitenhage, Martio.

1809. *Th.funale Thunb.* — In dunis planit. capensis, Junio, et in Kloof prope Tulbagh, Majo.

1810. *Th. strictum Thunb.* — Inter frutices prope Constantiam, Sept.

n. sp. s. n. *Th.* (*Thesiopsis*) *robustum Bernh.* Suffruticosum glabrum, caule angulato sulcato-striato ramoso, foliis alternis sessilibus, linea decurrentibus, subtriquetris linearibus acutis, inferioribus elongatis, floribus terminalibus subcymosis, subsessilibus, involucello triphyllo, calycis limbo quinquepartito intus nudo, nuce subglobosa 10-striata rugulosa. *Th. strictum Spreng.*, apud Zeyh. fl. cap. n. 488. Thesium n. 59. Eckl. in coll. Essling. — Ad lat. occident. m. Duyvelsberg, Julio, Alt. 1000′.

s. n. *Th. Frisea Thunb.* — Prope villam Uitenhage, Mart.

n. sp. 1804. *Th.* (*Frisea*) *junceum Bernh.* Suffruticosum, glabrum, caulibus teretiusculis striatis, subsimpliciter ramosis, ramis elongatis virgatis, foliis alternis remotiusculis squamaeformibus triangulari-subulatis acutis, margine scariosis; floribus axillaribus subsessilibus solitariis spicam terminalem formantibus, calycis limbo quinquepartito intus dense barbato, nuce 10-striata rugulosa. An *Th. spicatum Thunb*? — In Zitzikamma, Febr.

n. sp. 1807. *Th.* (*Frisea*) *tenue Bernh.* Suffruticosum, glabrum, caulibus teretibus substriatis ramosissimis, ramis ramulisque divergentibus, foliis alternis remotis, inferioribus linearibus reflexis, superioribus subulatis, subtriquetris acutis, ramulis axillaribus florentibus racemum terminalem formantibus; floribus solitariis, bracteis foliiformibus basi dilatatis, calycis limbo quinquepartito intus dense barbato, nuce . . . . . — In planit. capensi, Sept.

s. n. *Fusanus compressus Thunb.* — Inter rupes prope litus Van Campsbai, Majo.

1780. *F. camp. var.* fol. angustioribus. — Ad rivulos in rad. mont. Winterhoek, Aprili.

(Continuabitur.)

Berichtigungen zur Flora 1844.

Nro. 23. Seite 386. Zeile 16. v. o. statt letztere Gattung lies: die Fontinaleen.
„ 36. „ 632. „ 20. v. o. „ Wonach l. wonach.
„ „ „ „ „ 25. v. o. „ Continui l. doch im Ganzen sehr ähnlichen Verhaltens.
„ 40 „ 684. „ 5 u. 1. v. u. st. Cordarieen l. Chordarieen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0082-3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1845

Band/Volume: 28

Autor(en)/Author(s): Krauss Christian Ferdinand Friedrich

Artikel/Article: Pflanzen des Cap - und Natal-Landes 65-80