FLORA.

№ 25.

Regensburg. 7. Juli. **1844.**

Inhalt: Krauss, Pflanzen des Cap- und Natal-Landes. Fortsetzung. (Rosaceae — Loranthaceae). — The Calcutta Journal of Natural-History. Vol. IV. n. 13. (Griffith, on some ramarkable plants in the H. C. Botanic Gardens, Calcutta).

Pflanzen des Cap- und Natal-Landes, gesammelt und zusammengestellt von Dr. Ferdinand Krauss.

(Fortsetzung.)

(Hiezu Steintafel I.)

Rosaceae Juss.

1200. *Rubus rosaefolius Sm.*, DC., Meisn. l. c. p. 527. — Ad lat. occident. mont. Tafelberg, Julio, Alt. 1000′.

1201. *R. pinnatus Willd.*, DC., Meisn. l. c. — Ad rivulos in planit. capens., Sept.

s. n. *Agrimonia Eupatorium L.*, Meisn. l. c. p. 528. — Ad sylvarum margines in Outeniqua, George, Febr.

s. n. *Alchemilla capensis Thunb.* — Ad radicem mont. Tafelberg, Sept., Alt. 6—800′.

1202. *Cliffortia odorata L. fil.*, DC., Meisn. l. c. Stirps mascula. — Ad rivulos per totam terram Outeniqua, Febr.

1204. *C. filifolia L. fil.*, DC., Meisn. l. c. — Ad lat. mont. Duyvelskop, George, Febr., Alt. 1800′.

1203. *C. laricina E. Mey.* mss. in Hb. Drèg., *var. longifolia Meisn.* l. c. p. 528.* — In montibus prope fl. Kleine R., Zwellendam, Dec.

1209. *C. ericaefolia L. fil.*, DC., Meisn l. c. — *C. teretifolia Thunb.*? var. tenuior E. Mey.!, Meisn. l. c. — In arenosis prope Constantiam, Sept.

1211. *C. eriocephalina Cham.* in Linnaea 6, p. 349, Meisn. l. c. — In planit. capens., Julio.

1212. *C. falcata L. fil.*, DC., E. Mey.!, Meisn. l. c. — In arenosis planit. capensis, Julio.

1210. *C. ternata L. fil.*, DC., Meisn. l. c., — *C. polygonifolia E. Mey.* l. c. — In arenosis planit. capensis, Sept.

s. n. *C. ruscifolia L.* — Ad latera montium Duyvelsberg et Tafelberg, Julio, Alt. 1—2000′.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0003-9

s. n. *C. strobulifera L.* — In Kloof inter montes Tafelberg et Leuwenberg, Mai, Alt. 1000′.

s. n. *C. trifoliata L.* — Inter frutices prope Paarl, Stellenbosh, Julio.

s. n. *C. obcordata L.* — In arenosis prope Constantiam, Sept.

Lythrariceae Juss.

1085. *Lythrum Thymifolia L.* — Ad latera montis Duyvelskop, George, Febr., Alt. 1000′.

Rhizophoraceae R. Br.

267. *Rhizophora mucronata Lam.* — In limosis salsis circa Natalbai, Aug.

309. *Bruguiera gymnorhiza Lam.* — In limosis salsis circa Natalbai, Julio. Sub nomine „Mengerhout."

Combretaceae R. Br.

n. sp. 253. *Combretum Kraussii Hochst.* Frutex vel arbor 15—20pedalis, ramis cinereis. Folia opposita 2—3pollicaria obovato-lanceolata, obtusa apice mucronulato, basi in petiolum brevem decurrentia, integerrima, utrinque glaberrima, subtus pallide olivacea et lucidula, venis obscurioribus reticulate-venosa; spicae axillares pedunculatae foliis plerumque breviores; flores calyce cyathiformi, limbo intus villoso, petalis brevibus, stylo staminibus longiori erecto. (Hochst.) — In sylvis primitivis circa Umlaas River, Octobri 1839 florens lectum.

n. sp. 350. *Poivrea bracteosa Hochst.* Differf a P. aculeata *Dec.* foliis majoribus et bracteis pedicellatis ovalibus calyces aequantibus vel superantibus, nec non calycis limbo paulo profundius inciso. Frutex 8—10pedalis; forsan P. aculeatae varietas? (Hochst.) — In sylvis prope fl. Umlaas Natal, Octobri lecta.

Melastomaceae Don.

n. sp. 201. *Osbeckia phacotricha Hochst.* Radix perennis; caules plerumque plures pedales quadrangulares atro-purpurei, pilis flavidis rigidis patulis hispidi; folia opposita, inferiora breviter petiolata, superiora sessilia, ovato-lanceolata vel lanceolata, 3—5nervia, acuta, leviter serrulata, supra e punctis elevatis saepe nigricantibus hispida, flavo-viridia, inferne densius hispida (praesertim ad nervos) et viridi-flava; flores terminales capitato-conglomerati, bracteis foliaceis deflexis capitulo suppositis fulciti (quandoque etiam capitulum alterum inferius e ramulo axillari ortum adest); calyces pilis longis atro- vel fusco-purpureis rigidulis hispidissimi, petala purpurea. (Hochst.) — In graminosis planit. prope Natalbai, Decembri florens lecta.

n. sp. 120. *O. Umlaasiana Hochst.* est O. incana E. M. secundum exemplar Dregeanum, quod inspicere et comparare licuit, no-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0004-4

tis sequentibus describenda: Caulis quadrangularis purpurascens, tomento brevissimo subincanus; folia opposita, brevissime petiolata, oblongo-lanceolata, integerrima, basi subcordata, supra punctis stellatis scabra, subtus nervis quinque prominulis et venis transversis notata et incana; flores racemoso-paniculati, panicula seu racemus compositus terminalis, 2—4pollicaris, calyces pilis stellatis minutis incani, tubo globoso, segmentis ovato-lanceolatis tubum aequantibus, petala calycis limbo plus duplo majora, purpurea, glabra. (Hochst.) — Inter arundines ad fl. Umlaas, Natal, Jan.

Myrtaceae Juss.

n. sp. 136. *Syzygium cordatum Hochst.* Arbor 30—40pedalis. Ramuli floriferi subquadranguli; folia opposita subsessilia, subrotundo- vel elliptico-cordata, integerrima, glaberrima, penninervia, nervis copiosis transversalibus venisque reticulatis in pagina inferiori prominulis; cyma terminalis ramis ramulisque quadrangulis, calycibusque brevissime 4dentatis glabris, stylus stamina numerosa superans. Fructus acidulo-adstringens. — Num Jambosa cymnifera E. M.?, sed petala apice in calyptrae formam cohaerentia aperto flore decidunt — hinc potius Syzygii quam Jambosae species. (Hochst.) — In sylvis dunarum per totam terram natalensem, Octobri, Nov.

Onagrarieae Juss.

1805. *Montinia acris L. fil.* — In planit. capensi et in Langekloof (George), Mart., Jul.

n. sp. 36. *Jussieua fluitans Hochst.* Caulis inferne fluitans glabriusculus, superne erectus parce hispidus; folia lineari-lanceolata in petiolum longiusculum attenuata, cum petiolo 2—3pollicaria, glabriuscula vel subciliata, uninervia, venosa; flores axillares solitarii, pedunculati, calyces hispido-pilosi segmentis angustis acuminatis, petala flava calycis limbo majora. (Hochst.) — In fluvio Umlaas Decembri florens lecta.

n. sp. 73. *J. linearis Hochst.* Caulis ramosus quadrangulus (saltim rami quadranguli), pubescens; folia alterna vel rarius opposita, linearia 3—4pollicaria in caule primario, $1\frac{1}{2}$—2pollicaria in ramis, 1—2 lineas lata, subtrinervia, margine scabriuscula vel subciliata, facie hispidula; flores axillares solitarii breviter pedunculati, calycis laciniae lineari-lanceolatae trinerves acutae tubo longiusculo breviores, hispidulae; petala calycis limbum vix superantia. (Hochst.) — In arenosis ad ripas fl. Umslutie et Umgani, Natal, Junio.

1598. *Epilobium villosum Thunb.* — Ad rivulos et in paludosis Zitzikamma, Mart.

154. *E. montanum L.* — Inter arundines ad fl. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 1599. *E. capense Buchinger in litt.* Caulis teretiusculus purpurascens inferne glabriusculus, superne ramosus puberulus; folia opposita et subterna nec non alterna, breviter petiolata lanceo-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0005-0

lata vel lineari-lanceolata, denticulis vel serraturis calloso-glandulosis ad marginem instructa, inferiora subglabra, superiora puberula (praesertim ad nervum dorsale et marginem); flores in axillis supremis solitarii longe pedunculati, corolla mediocris, stigmata (ut videtur) in clavam coalita vel apice subpatentia; capsula linearis angustissima, pubescentia brevissima incana, pedunculo paulo longior. (Hochst.) — Species inter *Epilobium roseum Schreb.* et *virgatum Fries* quasi intermedia, sed utrumque florum magnitudine superans, qui minores tamen quam in E. hirsuto. — In locis humidis prope fl. Knysna, George, Jan.

* * *

540. *Ceratophyllum oxyacanthum Cham.* — In fluvio Umlaas, Natal, Octobr.

Podostemoneae.

n. gen. *Sphaerothylax Bisch.* *Spatha subglobosa*, vertice irregulariter rupta. Flos inclusus, pedicellatus. Perigonium nullum. Stamina 3, collateralia, basi connata, 2 lateralia sterilia, intermedium bifidum, antheras 2, loculis inaeqnalibus, gerens. Stigmata 2 sessilia, tuberculiformia. Capsula exserta nutans, costata, biloculares, bivalvis, polysperma, dissepimento crasso placentiformi libero, valva inferiore sub dehiscentiam decidua.

n. sp. *S. algiformis Bisch.* (Hydrobryum nutans Bisch. n. sp. mss.) Frons linearis, pinnatifida v. bipinnatifida, 2—3 uncias et ultra longa, saxis adpressa et quasi adglutinata, absque radiculis. Flores marginales in axillis et crenaturis laciniarum solitarii. Involucrum brevissimum, e bracteis binis distichis semivaginantibus formatum, spatham subglobosam vix $\frac{1}{2}$ lineam longam basi cingens. Capsula ellipsoidea v. subglobosa, lineam circiter longa, octocostata, fusca; dissepimentum totum seminibus confertis tectum, cum capsulae valva deorsum spectante solubilis et mox decidua. — In rivulis montanis regionis Buschmanns Rand prope Pieter-Mauritzburg, Natal, Sept.

Explicatio tabulae I.

Fig. 1 et 2. Plantulae lapidi schistoso irrepentes - magn. nat.

„ 3. Frondis ramulus florifer et fructiger: *a.* spatha apice jam rupta, sed florem adhuc totum recludens; *b.* spatha magis rupta cum fructu immaturo erumpente; *c.* fructus maturus e spatha emersus; *d.* pedunculus post valvas capsulae dejectas remanens.

„ 4 et 5. Spathae in axillis frondis sessiles, bracteis binis distichis fultae.

„ 6. Flos nutans spatha excerptus, staminibus instructus.

„ 7. Fructus semimaturus, staminibus evanidis.

„ 8. Idem cultri ope apertus, semina immatura continens.

„ 9. Semina immatura magnitudine magis aucta.

„ 10. Capsula matura subglobosa, cum spatha et involucro diphyllo pedunculum vaginantibus.

„ 11. Capsula altera, subellipsoidea, antice visa, cum stigmatibus tuberculiformibus.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0006-6

Fig. 12. Capsulae valva superior pedunculo continua et diutius remanens, ab imo visa, cum dissepimento crasso placentiformi.

„ 13. Semen maturum siccum, ellipsoideum, leviter compressum.

„ 14. Idem humectatum, ob epidermidem e cellulis vesiculosis mucilagine distentis conflatam intumescens.

„ 15. Idem longitudinaliter dissectum, testam sub epidermide tenuem et embryum dicotyledoneum monstrans.

Cucurbitaceae Juss.

s. n. *Bryonia africana Thunb.* — In sylvis primitivis Knysna, George, Febr.

68. *B.* ? — Inter arundines ad fl. Umlaas, Natal, Jan.

1818. *Pilogyne scabra Eckl. et Zeyh.* — Ad lat. orient. montis Duyvelsberg, Julio, et in sylvis Outeniqua.

s. n. *Citrullus caffer Schrad.* ? — In sylvis prope Natalbai, Novembr.

s. n. *Cucumis prophetarum L.* — Inter arundines prope fl. Umlaas, Natal, Octobr.

90. *Momordica Balsamina L.* — In sylvis prope Natalbai, Octobr.

1819. *M. quinqueloba E. Mey.* — Ad sylvarum margines in Zitzikamma, Uitenhage, Mart.

47. ? — Arundines scandens, ad fluv. Umlaas, Natal, Nov.

Samydeae Gaertn.

n. gen. 133. *Candelabria micrantha Hochst.* in Flor. Ratisb. 1843, I. p. 79. — In sylvis prope Natalbai, Nov.

Paronychiaceae St. Hil.

2, 1083. *Pollichia campestris Ait.* — Ad lat. montium Winterhoek, Uitenhage, et in terra natalensi, Majo.

1843. *Steudelia galioides Presl.* — In arenosis prope litus Houtbai, Cap, Sept.

1844. *St. diffusa Eckl. et Zeyh.* — In Kloof inter montes Tafelberg et Leuwenberg, Sept., Alt. 1000′.

1842. *Spergula marina Bartl.* — Ad rivulos montium Winterhoek, Uitenhage, April.

1848. *Sp. media Bartl.* — Ad ripas fl. Knysna prope lit., Jan.

1850. *Pharnaceum reflexum Eckl. et Z.* — In solo argillaceo circa urbem, Sept.

1849. *Ph. gracile Fenzl*? — In arenosis planit. capens., Sept.

1851. *Ph. incanum L.* — Ad lat. montis Duyvelsberg, Cap, Julio.

1852. *Ph. lineare L.* — In arenosis planitiei capensis prope Rietvalley, Junio.

1853. *Ph. croceum E. Mey.* — Ad rivulos montium Winterhoek, Uitenhage, April.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0007-2

4. *Psammotropha androsacea Fenzl*, Meisn. in Hook. Journ. 2, p. 529. — Ginginsia glaucescens E. Mey. ? — Inter rupes in summis montibus Tafelberge, Natal, Jan., Alt. 2000—3000′.

1845. *Corrigiola telephiifolia Pourr.* — Ad litus Van Campsbai, Cap, Junio.

135. *Limeum glomeratum Eckl. et Z.* — In graminosis circa Natalbai, Nov.

1857. *L. africanum L.* — In solo argillaceo prope Uitenhage, April, Majo.

Crassulaceae DC.

1603. *Helophytum natans Eckl. et Zeyh.* — In stagnantibus planit. capensis, Julio.

1701. *Sarcolipes pubescens Eckl. et Zeyh.* — In hiatibus rupium umbrosis prope Constantiam, Sept.

1685. *Crassula rubricaulis Eckl. et Z.* — In collibus prope Plettenbergsbai, George, Febr.

1684. *C. ramosa Thunb.* — In planit. Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

1689. *C. centauroides L.* — In uliginosis planit. capens. prope Constantiam, Sept.

1132. *C. glomerata L.* — In planit. capensi, Nov.

1683. *C. ciliata L.* — In planitie Zoetendalsvalley, Zwellendam, Dec.

1682. *C. filicaulis Haw.* — In solo argillaceo prope fl. Notsinakamma, George, Jan.

1846. *Crassulae pellucidae L. affinis.* — In arenosis planitiei capensis, Nov.

s. n. *Crassula flava L.* — In solo argillaceo prope villam Zwellendam, Dec.

s. n. *C.* ? (Hb. Drèg. n. 6902.) ibid.

1694, 1695. *Tetraphyle furcata Eckl. et Zeyh.* — In solo argillaceo prope villam Uitenhage, April.

1679 *T. muscosa Eckl. et Z.* — Inter rupes sylvarum prope George, Jan.

1680, 1681. *T. lycopodioides Eckl. et Zeyh.* — Prope fl. Zout R. in planit. capensi et in collibus prope George, Jan.

1678. *Thisantha glabra Eckl. et Zeyh.* — Ad latera montis Duyvelsberg, Cap, Sept.

1686. *Rochea coccinea DC. var. minus ciliata.* — In summo monte Tafelberg, Mart., Alt. 3500′.

1687. *R. odoratissima DC.* — Ad latera montium Peninsulae, Septembr.

1688. *R. jasminea DC.* — In summis montibus prope Genadenthal, Zwellendam, Dec., Alt. 3000′.

1690, 1692. *Septas capensis L.* — Inter rupes prope Van Campsbai et in Tulbaghskloof, Majo.

1691. *S. cap. var. parviflora.* — Inter rupes in Tulbaghskloof, Worcester, Majo.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0008-7

Ficoideae Juss.

1704. *Mesembryanthemum deflexum Haw.* — In arenosis planitiei capensis, Majo.

1703. *M. mutabile Haw.* — In arenosis prope urbem, April.

1702. *M. crinifolium Thunb.* — In solo argillaceo-arenoso prope Van Campsbai, Julio.

1700. *M. cuneifolium Jacq.* (M. sabulosum Eckl. et Zeyh.) — Prope Van Campsbai, Julio.

1698. *M. testaceum Haw.* — In solo argillaceo prope fl. Koega, Uitenhage, April.

1696. *Tetragonia decumbens Mill.* — In dunis prope Zwartevalley, George, Febr.

s. n. *T. herbacea L.* — In arenosis planitiei capensis, Julio, August.

1699. *Aizoon sarmentosum L. fil.* — In arenosis planitiei capensis, Aug.

1697. *A. hirsutum Eckl. et Z.* — In arenosis ad fl. Koega, Uitenhage, April.

1653. *Galenia africana L.* — In solo argillaceo prope fl. Brakke R., Zwellendam, Jan.

Saxifrageae Juss.

s. n. *Cunonia capensis L.* Meisn. in Hook. Journ. 2, p. 529. — Ad lat. montium Tafelberg et Winterhoek, Uitenhage, April, Alt. 800—1500′.

1026. *Weinmannia trifoliata Thunb.* β. *grandiflora Klotzsch.* — Ad rivulos in distr. Zwellendam, Dec.

Bruniaceae DC.

1855. *Brunia nodiflora L.* — In Kloof inter mont. Tafelberg et Leuwenberg, Cap, Majo.

778. *B. microphylla Thunb.*, DC., Meisn. l. c. p. 59.* — Raspailia teres E. Mey. in pl. Drèg.? — Certe Bruniae nec Raspailiae sp. — In summitate montium Bavianskloof, Zwellendam, Decembr.

s. n. *Berzelia lanuginosa Brongn.* — In arenosis planitiei capensis, Julio.

1854. *B. superba Eckl. et Zeyh.* — In montibus prope fl. Kleine R., Zwellendam, Dec.

1856, 1857. *B. rubra Schlecht.* — In arenosis planitiei capensis, Nov.

s. n. *Staavia glutinosa L.* — Ad lat. mont. Tafelberg, Majo, Alt. 200′.

s. n. *St. radiata Th.* β. *ericetorum* Hb. Un. itin. n. 768. — In planit. capensi, Majo.

s. n. *Audouinia capitata Brongn.* — Ad lat. mont. Muysenburg, Cap, Julio.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0009-6

n. sp. 127. *Hydrocotyle caffra Meisn.* l. c. p. 529.* — Affin. H. Bonariensi Lam. et petiolari DC. — In solo argillaceo-arenoso circa Natalbai, Nov.

1175. *H. interrupta Mühlenb.*, DC., Meisn. l. c. p. 530. — H. verticillata Thunb. — In locis humidis prope fl. Knysna, Jan.

1176. *H. ficarioides Lam.*, DC., Meisn. l. c. — In locis humidis planitiei capensis, Junio.

1177. *H. eriantha Rich.*, DC., Meisn. l. c. — In sylvis primitivis Outeniqua, George, Jan.

1178. *H. calliodus Cham et Schlecht.!* DC, Meisn. l. c. — Prope fl. Zonder-Ende R., Zwellendam, Dec.

s. n. *H. Solandra L.* — Ad radicem montis Leuwenkop, Cap, Julio.

1174. *H. tridentata L. fil.*, DC., Meisn. l. c. — Ad radicem montium prope Genadenthal, Zwellendam, Dec., et in terra Natalland, Octobr.

1170, 1171, 1172. *H. virgata L. fil.*, α. *glaberrima DC.*, Meisn. l. c. — Ad radicem montium Bavianskloof, Outeniqua et Winterhoek, Dec.—Febr.

1173. *H. virgata L. fil.* δ. *nana DC.*, Meisn. l. c. — Ad lat. montis Duyvelsberg, Cap, Julio, Alt. 2000′.

1193. *Sanicula europaea L.* β. *capensis Cham. et Schl.*, DC., Meisn. l. c. — In sylvis primitivis Knysna, Jan.

605. *Alepidea ciliaris Laroche.* — In collibus prope villam George, Jan.

1198, 1199. *Apium graveolens L.*, DC., Meisn. l. c. — *Helosciadium Ruta DC.*? *Smyrnium laterale Thunb.* — Ad rivulos in Zitzikamma, Febr.

187. *A. graveolens L.* — Ad fl. Umlaas, Natal, Dec.

n. sp. 418. *Petroselinum humile Meisn.* (Apium? humile Meisn. in schedul.) l. c. p. 531.* — Ad fluv. Umlaas, Natal, Octobr.

1197. *Sium* (*Berula*) *Thunbergii DC.*, E. Mey.!, mss. in Hb. Drèg., Meisn. l. c. — Sium angustifolium Thunb. Un. itin. n. 60.! — Ad rivulos in Zitzikamma, George, Febr.

s. n. *Bupleurum difforme L.*, C D., Meisn. l. c. — Inter rupes in Langekloof, George, Febr.

1189. *Heteromorpha collina E. et Z.* enum. p. 342., Meisn. l. c. — Ad fl. Notsinakamma, George, Jan.

196. *Lichtensteinia pyrethrifolia Cham. et Schl.*, DC. (excl. syn.), Meisn. l. c. p. 531. — In graminosis prope fl. Umlaas, Dec.

1180. *L. inebrians E. Mey.!* mss. in Hb. Drèg, Meisn. l. c. p. 532. — *Oenanthe inebrians Thunb.* — *Lepisma paniculatum E. Mey.* l. c.? — Ad rivulos prope Genadenthal, Zwellendam, Decembr.

s. n. *Oenanthe filiformis Lam.*, DC., E. Mey.! l. c., Meisn. l. c. — In summis montibus prope Genadenthal, Dec.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0010-7

n. sp. 140. *Foeniculum ? Kraussianum Meisn.* l. c. p. 532.* (Pimpinella Kraussiana Meisn. olim in sched.) — In planit. prope fl. Umlaas, Natal, Nov.

n. sp. 403. *Seseli* (*Hippomarathroides*) *caffrum Meisn.* l. c. p. 533.* — In graminosis per totam terram natalensem, August., Septembr.

1196. *Heteroptilis* (*nov. gen.*) *arenaria E. Mey.*! mss. in Hb. Drèg., Meisn. l. c. p. 534* cum diagn. generis et sp. — Genus Selino proximum. — In dunis prope Zwartevalley, George, Febr. Martio.

433. *Seseli ? n. sp.?* (Seseli filifolium Thunb.? olim in sched.) — In summis montibus Tafelberge, Natal, Aug., Alt. 2—3000′.

1188. *Peucedanum capillaceum Thunb.*, DC., Meisn. l. c. p. 535. —Ad rivulos montium Baviaanskloof, Dec., Alt. 1000.

1181. *P. elongatum E. Mey.*! l. c., Meisn. l. c.* — Ad lat. montis Tigerberg, Cap, Nov., Alt. 1000′.

1179. *P. abbreviatum E. Mey.* l. c., Meisn. l. c. — In summis montibus Peninsulae, Mart., Alt. 2—3000′.

1185. *P. virgatum Cham. et Schl.*, DC., Meisn. l. c. — *Dregea virgata Eckl. et Zeyh.* p. 351. — In locis humidis ad sylvarum margines Knysna, Jan.

1184. *P. lanceolatum E. Mey.*! l. c., Meisn. l. c. p. 536. — *Dregea collina E. et Z.* — Praecedentis var.? — Prope fl. Notsinakamma, George, Jan.

1186, 1186 b., 1178. *Bubon Galbanum L.*, DC., Meisn. l. c.* — Ad radicem montis Tafelberg et Baviaanskloof, Dec.

1183. *B. hypoleucum Meisn.* l. c. p. 536.* (Seseli hypoleucum Meisn. olim in sched.) — Ad rivulos montium Baviaanskloof, Jan.

s. n. *Arctopus echinatus L.* — In locis aridis argillaceis planitiei capensis, Junio.

1194. *Hermas villosa Thunb.*, DC., Meisn. l. c. p. 537. — In summo monte Tafelberg, Mart., Alt. 3500′.

1195. *H. capitata L. fil.*, DC., Meisn. l. c. — In summo monte Tafelberg, Mart., Alt. 3500′.

Araliaceae Juss.

1082. *Cussonia thyrsiflora Thunb.* — In sylvis primitivis Zitzikamma, Mart.

n. sp. 1081. *C. Kraussii Hochst.*, folia novena glaberrima supra lucida, foliola in petiolos attenuata, duo infima simplicia lanceolata, media utrinque duo ternata, suprema tria pinnata, pinnis decurrentibus, integerrimis (etiam impari) mucronato-acuminatis; spicae 5—8 umbellatae, pedunculus spica longior. Similis Cussoniae spicatae Thunb., a qua differt foliolis integerrimis, spicarum numero et pedunculi longitudine. Forsan varietas insignis. — In solo argillaceo prope fl. Geelbecks R., George, Jan.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0011-3

1216. *Curtisia faginea Ait.*, DC., Meisn. l. c. p. 539. — In hiatibus ad lat. montis Duyvelsberg et Tafelberg, Cap, Septembr., Alt. 1—2000′.

Loranthaceae Rich.

1217. *Loranthus Schlechtendalianus Schult.*, Meisn. l. c. p. 539. — L. elegans Cham. et Schl. (non Walt. DC.) — In Acaciis et aliis arboribus parasiticus, prope fl. Zwartkop R., Uitenhage, April.

n. sp. 208. *L. Natalitius Meisn.* l. c. p. 539.* — Affin. L. Belvisii DC. — In Acaciis parasiticus, ad radicem montium Tafelberge, Natal, Dec.

n. sp. 125. *L. Kraussianus Meisn.* l. c. p. 539.* — In umbrosis sylvarum circa Natalbai, Nov.

s. n. *L. oblongifolius E. Mey.* — In Paritio tiliaceo St. Hil. parasiticus, circa Natalbai, Jan.

s. n. *L. oblongifolius E. Mey. var. pedunculatis Hochst.*, differt a priori florum capitulis longius pedunculatis, pedunculo subpollicari et corollis minus villosis. — In dunis circa Natalbai, Febr.

n. sp. s. n. *L. quinquenervis Hochst.* Cortex olivaceo-fuscus laevis nitidulus; folia alterna coriacea, ovata, obtusa, quinquenervia; flores umbellati, umbellae sessiles laterales, pedicelli breves; bractea cupulaeformis valde obliqua ad basin calycis, calyx cylindrico-cupularis, subaeqaliter truncatus; corolla pollicaris vel ultra glaberrima, basi ventricosa, ad medium usque vel paulo profundius quinquefida, tubo laciniisque rectis angustis; stylus corollam aequans stigmate globoso. — In arboribus parasiticus prope Natalbai, Dec.

(Fortsetzung folgt.)

The Calcutta Journal of Natural-History. Vol. IV. nr. 13. Apr. 1843.

Dieses Journal scheint in Deutschland wenig bekannt zu seyn, da wir bis jetzt keine Auszüge aus demselben gefunden haben. Das genannte Heft enthält zwei botanische Abhandlungen; nämlich eine Zusammenstellung der von William Jack in verschiedenen Schriften mitgetheilten Descriptions of Malayan plants, welche weit den grössten Theil dieses Heftes einnimmt, und nur durch eine Abhandlung von W. Griffith: „On some remarkable plants in the H. C. Botanic Gardens, Calcutta“ unterbrochen ist. Wir betrachten hier die letztere Abhandlung, welche ohne weitere Einleitung Folgendes enthält:

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0012-8

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Krauss Christian Ferdinand Friedrich

Artikel/Article: Pflanzen des Cap - und Natal-Landes 423-432