Blumen purpurroth. Die Strahlen der Fruchtkrone aller Blüthen an der Spitze haardünn.

Von *C. nutans Linn.* unterscheidet sich gegenwärtige Art durch die haarfeine Spitze aller Strahlen der Fruchtkrone; denn bei *C. nutans L.* sind die längsten Strahlen der Fruchtkrone an der Spitze keulig-verbreitert, was schon mit blossem Auge wahrzunehmen ist. Ferner hat *C. macrolepis* keine zurückgeknickten äusseren Hüllblätter, wie es bei *C. nutans* der Fall ist. Von *C. platylepis Saut.* unterscheidet sich die von mir hier aufgestellte Art durch einzelnstehende, nicht gestielte Köpfe; bei *C. platylepis Saut.* stehen die Köpfe zu 2, der eine davon steht aufrecht, während der andere horizontal ansitzt. Wie die Fruchtkrone von *C. platylepis Saut.* beschaffen ist, weiss ich nicht.

Ich fand diese Art an Wegen unweit Steuderitz bei Leipzig; sie blüht im Juli, August und ist zweijährig.

Kleinere Mittheilungen.

Th. Fr. Lud. Nees ab Esenbeck: *Genera plantarum florae germanicae* iconibus et descriptionibus illustrata. Opus post auctoris mortem a Fr. Conr. Leop. Spenner et post hujus obitum ab Al. Putterlick et St. Endlicher continuatum. Fasciculus XXIII. Bonnae sumpt. Henry &. Cohen. 8.

Das vorliegende Heft zeugt von der ziemlich raschen Förderung, welche das ganze Werk zu erlangen scheint. Durch einen Theil der gegebenen Gattungstafeln wird zugleich eine Abtheilung, nämlich die der ganzblumigen Dikotyledonen, welche somit den 2. Theil des 6. Bandes bilden, und wofür das Titelblatt beigelegt ist, abgeschlossen. Die beschriebenen und dargestellten Gattungen sind aus der Gruppe der Asperifoliae und Personatae: *Vitex L. Stenhammera Reichenb. Mattia Schult. Eritrichium Schrd. Orobanche L. Phelipaea Desf. Lathraea L. Acanthus Tournef. Tozzia Mich. Pedicularis Tournef. Lindernia All. Limosella L.* und wiederum Fortsetzung der Compositae mit den Gattungen: *Buphthalmum Neck. Teleckia Baumg. Pallenis Cass. Bidens L. Micropus L. Evax Gärtn. Ambrosia Tournef.* Was wir über die gediegene Ausführung und den fast zu grossen Reichthum der bildlichen Darstellungen bei Anzeige des vorigen Heftes gesagt haben, dürften wir auch hier wiederholen. Man ersieht die bedeutende Ausdehnung, die den Gattungen als deutschen gegeben wird, und ein grosser Theil des Publicums wird dieselbe gewiss dankbar anerkennen. Die Analysen lassen eine grosse Sorgfalt erkennen und ihre Zahl reicht gewiss hin, denselben Gegenstand, von verschiedenen Seiten dargestellt, aus dem Bilde zur richtigen Erkenntniss zu bringen. Die künstlerische Ausführung verdient, auch gegen die früheren Tafeln, sehr gut genannt zu werden. S — n.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0073-8

Novarum et minus cognitarum stirpium pugillus octavus quem indici scholarum etc. praemisit J. G. Ch. Lehmann, Med. et Phil. Dr., in Gymnas. Hamburg. academ. histor. natur. Prof. publ. etc. Hamburgi 1844. 56. pag. in 4.

Der für specielle Botanik unermüdet thätige Hr. Verfasser beginnt diese neuen Beiträge zu derselben mit der genauen Beschreibung mehrerer neuen Gattungen und Arten der Lebermoose, namentlich: *Gymnanthe Taylor Ms.* n. gen. Receptaculum commune, terminale, obconicum, descendens. Cal. 0. Caps. 4valv., seta suffulta. Elateres spirales seminibus interjecti. Antherae in foliorum axillis liberae pedicellatae. *G. tenella Tayl.* von Van-Diemens Land; *Plagiochila Gottscheana Ldby.* vom Cap d. gut. Hoffn., *P. chiloscyphoidea Ldbg.* v. Magellan, *P. strombifolia Tayl.* von van Diemens Land, *Scapania nimbosa Tayl.* aus Irland; *Jungermannia monodon Tayl.* von v. Diem. Land; *J. leucocephala Tayl.* von Cayambe, *J. Ariadne Tayl.* von Pulo-Penang; *Madotheca ligulifera Tayl.* von Nepal, *M. Leiboldi* aus Mexiko; *Frullania cylindrica* ebendaher; *F. Eboracensis* von New-York; *F. Deppii* aus Mexiko; *F. Lindenbergii* vom Cap d. gut. Hoffn., *F. laciniosa* von Java; *F. virginica* aus Virginien, *F. falciloba* von van Diem. Land; *F. brachyclada* ebendaher und in Neuholland, *Ptychantus squarrosus Mont.* von Amboina; *Thyrsanthus Lindbg. Ms.* n. gen. Perianthium laterale vel e dichotomia, sessile, triquetrum, angulis devexis dentato-laciniatis. Styl. longus. Caps. ad medium 4-fida. Elateres unispiri, valvis apicem versus affixi, persistentes. *Th. comosus Ldbg.* von Paulo-Penang und Guiana; *Lejeunia Haskarliana* von Java; *L. Chitonia Tayl.* von Guiana; *L. filaria Tayl.* von Esmeralda. Die 2te „Novitiae Florae Novae Hollandiae" überschriebene Abtheilung bringt ausser den Beschreibungen der S. 81. und 82. der Flora l. J. schon namentlich aufgezählten neuen Droseraceen und Utricularieen der Preiss'schen Sammlung noch folgende, von demselben Reisenden gesammelte Novitäten: *Petalophyllum n. gen.* (Hepaticar.) Frons obovata, superne radiatim lamellata; perianthium sessile campanulatum, gamophyllum. Caps. evalvis, irregulariter dehiscens. Elateres trispiri. Semina magna, reticulata. *P. Preissii; Macrozamia Preissii; Tricostularia N. ab E. Ms.* n. gen. (Cyperacear.): Spicula disticha, squamis inferioribus paucis (3—5) minoribus sterilibus, 4 vel 6 mascula, 5—7 hermaphrodita, vel 8 sterili. Perigynii setae 3, breves, cum staminibus alternae discoque utriusque communi calloso insertae. Styl. 3fidus, basi aequalis, deciduus. Nux subtrigona, tricostata, mutica (scabra). *T. compressa N. ab E.* et *T. Neesii; Chaetospora microstachya N. ab E.; Ch. nana N. ab E.; Macherina resinosa N. ab E., Elynanthus grandiflorus N. ab E., E. revolutus N. ab E.* und *E. obtusifolius N. ab E.*

F.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0074-4

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Kleinere Mittheilungen 493-494