FLORA.

№ 31.

Regensburg. 21. August. **1844.**

Inhalt: Heuffel, Caricineae in regnis Hungariae, Croatiae etc. sponte nascentes. — Bracht, Bericht über die Arbeiten der botanischen Section bei der Versamml. der italienisch. Naturforscher und Aerzte zu Padua. (Fortsetzung.)

Klein. Mittheilungen. Murray, Darstellung der ausserordentlichen Wirkungen des chemischen Düngers.

Caricineae in regnis Hungariae, Croatiae, Slavoniae, magnoque Transylvaniae principatu sponte nascentes, enumeratae ac digestae a Joanne Heuffel, M. Dr.

Caricineae.

Flores unisexuales. Spicae dioicae, monoicae vel androgynae; bi — multiflorae. Glumae univalves, undique imbricatae, uniflorae. Setae squamulaeque calycinae nullae. Stam. 3. Ovarium unicum, involucro proprio lagenaeformi, utriculum (perigynium Nees ab Esenb.) referente inclusum. Stylus bi- vel trifidus; stigmata elongata, exserta. Nux lenticularis, plana, plano-convexa vel triangularis.

I. Mauksch ia. *)

Spica solitaria dioica aut rarius androgyna; perigynia elongata, plano-convexa aut trigona, demum patula. Arista ad nucis basim nulla. Stigm. 2.

1. *M. laevis.* * — *Carex laevis Hopp.* exs. pl. Cent. 3. *Carex dioica Linn.* Spec. II. p. 1379. *C. Linnaei Degland.* in Loisl.

*) Rev. D. Mauksch Pastor quondam Schlagendorfensium, relictis curis pastoralibus, Kesmarkini scientiis solum vixit, collegit herbarium Scepusiense, quod cel. Wahlenberg ditissimum et omnibus annotationibus locupletissimum dixit, quodque fons Florae Carpatorum principalium uberrimus fuit.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0107-7

gall. II. p. 627. *C. Linnaeana Host.* Gram. III. p. 51. T. 77. *Vignea dioica Reichenb.* Germ. n. 376.

2. *M. scabra.* * — *Carex scabra Hopp.* pl. exs. Cent. 3. *C. Davalliana Smith.* Brit. III. p. 964. *C. dioica Host.* Gram. I. p. 32. T. 41. *Vignea Davalliana Reichenb.* Germ. n. 377.

II. Psyllophora. *

Spica solitaria, androgyna, basi feminea; perigynia oblonga subteretia aut obsolete trigona, demum reflexa. Rudimentum rhacheolae aut arista ad nucis basim minuta. Stigm. 2.

1. *Ps. vulgaris.* * — *Carex pulicaris Linn.* Spec. II. p. 1380. *Vignea pulicaris Reichenb.* Germ. n. 378.

III. Leucoglochin. *

Spica solitaria pauciflora, androgyna, basi feminea; perigynia teretia, elongata, subulata, demum reflexa. Arista ad nucis basim nulla. Stigm. 3.

1. *L. pauciflorus.* * — *Carex pauciflora Lightf.* Scot. p. 543. *C. Leucoglochin Ehrh.* Beitr. I. p. 186.

IV. Callistachys. *

Spica solitaria multiflora, androgyna, basi feminea; perigynia oblonga trigona, utrinque stipitata, demum reflexa. Seta ad fructus basim nulla. Stigm. 3.

1. *C. pyrenaica.* * — *Carex pyrenaica Wahlenb.* Act. Holm. 1803. p. 139.

V. Genersichia. *)

Spica solitaria pauciflora, androgyna, basi feminea; perigynia ovato-subglobosa, obsolete trigona, patula. Rhacheola ad fructus basim filiformis biloba. Stigm. 3.

1. *G. obtusata.* * — *Carex obtusata Liljebl.* Vet. Acad. Handl. 1793. p. 69. *C. spicata Schk.* Car. p. 11. n. 5.

VI. Cryptoglochin. *

Spica composita spiculis in capitulum aggregatis, androgynis, superne masculis; perigynia subtriquetra, setam subulatam, apice trilobulatam, e basi nucis emergentem includentia. Stigm. 3.

---

*) Sam. Genersich M. Dr. Physicus Leutsoviensis, Nestor Botanicorum Hungariae, scripsit Catalogum et Elenchum Plantarum Scepusii.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0108-3

1. *C. curvulus.* * — *Carex curvula All.* pedem. n. 2295.

VII. Schelhammeria Mönch.

Spiculae arcte capitato-aggregatae, involucratae, androgynae, basi masculae; valvae superiores comosae; perigynia lanceolata, pedicellata, longissime rostrata. Seta ad nucis basim nulla. Stigm. 2. Herba annua.

1. *Sch. Cyperoides Reichenb.* Germ. n. 499. *Carex Cyperoides Linn.* Syst. Veg. p. 703.

VIII. Vignea Pal. Beauv.

Spicae compositae aut decompositae, spiculae in rhachi aut ramulis sessiles aut sparsae, androgynae; perigynia plano-convexa, aut rarius gibboso-convexa. Stigm. 2.

A. *Stellulatae:* Spicae compositae, spiculis basi floribus masculis; perigynia plano-convexa, rostrata, demum stellulatim divergentia.

1. *V. stellulata Reichenb.* Germ. n. 389. *Carex stellulata Good.* in Linn. Trans. II. p. 144. *C. Leersii Willd.* Prodr. n. 95.

2. *V. Grypos Reichenb.* Germ. n. 384. *Carex Grypos Schk.* Car. II. f. 193.

B. *Vulpinae:* Spicae compositae aut decompositae, spiculis basi floribus femineis; perigynia plano-convexa, rostrata, demum patentia.

3. *V. divulsa Reichenb.* Germ. n. 406. *Carex divulsa Good.* in Linn. Trans. II. p. 160. *C. nemorosa Lumnitz.* Poson. p. 418.

4. *V. muricata Reichenb.* Germ. n. 390. *Carex muricata Linn.* Spec. II. p. 1382.

β. virens Reichenb. Germ. n. 391. *Carex virens Lam.* Dict. III. p. 384. *C. nemorosa Host.* Austr. II. p. 582. excl. syn. Willd.

γ. contigua. * *Carex contigua Hopp.* in Sturm. Car. VI. n. 2.

5. *V. vulpina Reichenb.* Germ. n. 408. *Carex vulpina Linn.* Spec. II. p. 1382.

β. nemorosa Reichenb. Germ. n. 407. *C. nemorosa Willd.* IV. p. 232. non Lumnitz. *C. vulpina* var. 2. Lumnitz. Poson. n. 922. *C. aristata* Kit. herb.

C. *Chordorrhizae:* Spica composita spiculis in capitulum laxum aggregatis, floribus superne masculis; perigynia imbricata, plano-con-

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0109-1

vexa, nervosa, in rostrum plus minus scariosum bilobum aut bidentatum attenuata.

6. *V. Chordorrhiza Reichenb.* Germ. n. 383. *C. Chordorrhiza Ehrh.* in Linn. Suppl. p. 414.

7. *V. stenophylla Reichenb.* Germ. n. 382. *Carex stenophylla Wahlenb.* Act. Holm. 1803. p. 142. *C. arenaria Lumnitz.* Poson. n. 919. excl. diagn. et syn. fide specim. *C. juncifolia Schk.* Car. p. 26. n. 18. *C. glomerata Host.* Gram. I. p. 32. T. 44.

8. *V. divisa Reichenb.* Germ. n. 398. *Carex divisa Huds.* Angl. p. 405.

β. rivularis. * *Carex rivularis Schk.* Car. f. 87.

9. *V. schoenoides.* * *Carex schoenoides Host.* Gram. I. p. 35. T. 45.

D. *Arenariae:* Spica decomposita, spiculis spicato-congestis, masculae et femineae plerumque androgynis intermixtae; perigynia plano-convexa, nervosa, marginata, marginibus serrulato-scabra, in rostrum bidentatum attenuata.

10. *V. intermedia Reichenb.* Germ. n. 403. *Carex intermedia Good.* in Linn. Trans. II. p. 154. *C. disticha Huds.* Angl. p. 403.

11. *V. arenaria Reichenb.* Germ. n. 405. *Carex arenaria Linn.* Spec. II. p. 1381.

E. *Paniculatae:* Spica composita vel paniculata, spiculis superne masculis; perigynia ovata, gibboso-convexa, laevia; rostrum bidentatum, marginibus serrulato-scabrum.

12. *V. paradoxa Reichenb.* Germ. n. 410. *Carex paradoxa Willd.* Act. Acad. Berol. 1794. p. 39. *C. canescens Host.* Gram. I. p. 43. T. 57.

13. *V. paniculata Reichenb.* Germ. n. 411. *Carex paniculata Linn.* Spec. II. p. 1383. *C. subramosa Kit.* herb. specimen depauperatum.

14. *V. teretiuscula Reichenb.* Germ. n. 409. *Carex teretiuscula Good.* in Linn. Trans. II. p. 163.

F. *Heleonastae:* Spica composita spiculis serie simplici alternatim dispositis, androgynis inferne masculis, rarissime inferioribus mere femineis; perigynia plano-convexa, nervosa, glabra, in rostrum breve ore integrum aut leviter emarginatum glabriusculum attenuata.

15. *V. elongata Reichenb.* Germ. n. 402. *Carex elongata Linn.* Spec. II. p. 1383.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0110-2

16. *V. canescens Reichenb.* Germ. n. 394. *Carex canescens Linn.* Suec. n. 842. *C. curta Good.* in Linn. Trans. II. p. 145.

17. *V. lagopina Reichenb.* Germ. n. 386. *Carex lagopina Wahlenb.* Act. Holm. 1803. p. 145. *C. leporina Linn.* Lapp. 322. *C. approximata Hopp.* exs. Cent. 3.

G. *Ovales:* Spica composita, spiculis serie simplici alternatim dispositis, inferne masculis; perigynia plano-convexa, nervosa angulis marginato-subalata in rostrum bidentatum marginibus serrulato-scabrum attenuata.

a) Radix fibrosa caespitosa.

18. *V. leporina Reichenb.* Germ. n. 396. *Carex leporina Linn.* Spec. II. p. 1381. *C. ovalis Good.* in Linn. Trans. II. p. 148.

b) Radix repens.

19. *V. brizoides Reichenb.* Germ. n. 329. *Carex brizoides Linn.* Spec. II. p. 1381.

20. *V. Schreberi Reichenb.* Germ. n. 397. *Carex Schreberi Schrank.* Bay. Flor. I. p. 278. *C. praecox Schreb.* Spic. p. 63.

H. *Axillares:* Spica composita spiculis alternis, inferne masculis, inferioribus remotissimis, bractea foliacea longa suffultis; perigynia plano-convexa, compressa, superne marginata, in rostrum ore bidentatum marginibus serrulato-scabrum acuminata.

21. *V. remota Reichenb.* Germ. n. 399. *Carex remota Linn.* Spec. II. p. 1383.

IX. Carex Linn.

Spicae plerumque monoicae subsessiles aut pedunculatae, suprema 1 — plures masculae aut rarius androgyna, reliquae femineae; perigynia varia. Stigm. 3 rarius 2.

1. Carices verae: Stigm. 3.

* Spicae plures, terminalis androgyna, basi mascula, reliquae femineae, aut omnes androgynae.

A. *Atratae:* Perigynia erostrata vel rostro brevi tereti truncato, oblique abscisso aut leviter bidentato.

1. *C. atrata Linn.* Spec. II. p. 1386.

2. *C. aterrima Hopp.* Car. n. 52.

3. *C. Buxbaumii Wahlenb.* Act. Holm. 1803. p. 164.

B. *Fuliginosae:* Perigynia oblonga, membranaceo-marginata, rostrata, rostro longo ore submembranaceo bicuspidato.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0111-8

4. *C. fuliginosa Sternb.* et *Hopp.* Denkschr. 1816. p. 163. *C. frigida Host.* Gram. IV. p. 50. T. 90. *C. proboscidea Kit.* herb. *C. magellanica Bot. Scep.* ante Wahlenb.

** Spicae plures, terminalis mascula 1 — plures, reliquae femineae.

† Spica terminalis masc. solitaria.

C. *Ferrugineae:* Spicae plures; masc. solitaria, rarius 2; fem. 2 — 6, plerumque longe pedunculatae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia oblonga, nervosa, rostrata; rostrum marginatum, serrulato-ciliatum, antice planum, ore membranaceo-bilobum aut bidentatum.

5. *C. ferruginea Schk.* Car. I. p. 92. *C. sempervirens Vill.* Delph. II. p. 214. *C. spadicea Baumg.* Transylv. III. p. 308. excl. Schk. et All. synon. *C. varia Host.* Gram. I. p. 59. T. 80. *C. firma β. subalpina Wahlenb.* Carp. n. 961. *C. carpathica Kit.* herb.

6. *C. laevis Kit.* in Willd. Spec. IV. p. 292.

7. *C. firma Host.* Synops. p. 509. *C. pygmaea Kit.* herb.

8. *C. Mielichhoferi Schk.* Car. II. p. 66. *C. ferruginea Scop.* Car. II. p. 225.

D. *Distantes:* Spicae plures; masc. solitaria, rarius 2; fem. 2 — 6, omnes aut saltem infima remotae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia ovata, subinflata, in rostrum antice planum, marginibus plus minus scabriusculum, bidentatum aut bifidum acuminata. Ligula oppositifolia.

9. *C. Hosteana Cand.* Cat. p. 88. *C. Hornschuchiana Hopp.* in Flor. 1842. p. 595. *C. fulva Host.* Gram. IV. p. 53. excl. syn. T. 95.

10. *C. fulva Good.* in Linn. Trans. II. p. 177.

11. *C. distans Linn.* Spec. II. p. 1387. *C. flavescens Host.* Gram. IV. p. 53. T. 96.

*β. halophila.**

γ. flavescens Sand. herb. non Host.

δ. neglecta Degl. in Loisl. Gall. II. p. 298.

E. *Psilostachyae:* Spicae fem. 2 — 4, plerumque longe pedunculatae pendulae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia trigona nervosa, laevissima; rostrum marginatum glabrum, bidentatum bifidumve.

12. *C. brachystachys Schrank.* Bav. I. p. 294. *C. tenuis Host.*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0112-4

Gram. IV. p. 51. T. 92. *C. compressa Kit.* in Willd. Spec. IV. p. 276.

13. *C. sylvatica Huds.* Angl. ed. 1. p. 353. *C. Drymeja Ehrh.* Beitr. II. p. 139. *C. psilostachya Kit.* in Willd. Spec. IV. p. 289. Specimen juvenile.

F. *Leptostachyae:* Spicae fem. 2 — 6, plerumque longe pedunculatae, pendulae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia trigona, glabra; rostrum breve ore truncatum aut leviter emarginatum.

14. *C. strigosa Huds.* Angl. p. 411. *C. leptostachys Ehrh.* Phyt. n. 48. *C. patula Lumn.* Poson. descriptio excl. diagn. et synon.

15. *C. maxima Scop.* Carn. II p. 229. *C. pendula Good.* in Linn. Trans. II. p. 168. *C. Agastachys Linn.* fil. Suppl. p. 414.

16. *C. capillaris Linn.* Spec. II. p. 1386.

G. *Limosae:* Spicae fem. 2 — 4, longe pedunculatae cernuae aut pendulae; bracteae subfoliaceae amplectentes aut brevissime vaginantes; perigynia subrotundo-ovata, lenticulari-compressa; rostello minuto, tereti, truncato.

17. *C. limosa Linn.* Spec. II. p. 1386.

H. *Nitidae:* Spicae fem. 1 — 2, breviter pedunculatae erectae; bracteae vaginantes aphyllae aut foliaceo-mucronatae; perigynia globoso-ovata, striata, glabra, nitidaque; rostrum teres, ore membranaceum oblique truncatum aut bilobum.

18. *C. alba Scop.* Carn. II. p. 216.

19. *C. nitida Host.* Gram. I. p. 53. T. 71. *C. verna Schk.* Car. p. 89. *C. conglobata Kit.* in Willd. Spec. IV. p. 281. *C. semicylindrica Kit.* herb.

20. *C. supina Wahlenb.* Act. Holm. 1803. p. 158. *C. campestris Host.* Gram. IV. p. 49. T. 88. *C. glomerata Schk.* Car. I. p. 79. *C. rostrata Schott.* in Schrad. Journ. I. fasc. 2. p. 493. *C. pusilla Kit.* herb.

I. *Lasiocarpae:* Spicae fem. 1 — 3, sessiles, aut infima breviter pedunculata; bracteae amplectentes aut breviter vaginantes, membranaceae aut foliaceo-mucronatae; perigynia pubescentia aut tomentosa, obovato-trigona; rostrum breve ore truncatum aut leviter emarginatum.

* Radix fibrosa.

21. *C. montana Linn.* Suec. II. n. 845. *C. collina Willd.*

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0113-0

Spec. IV. p. 260. *C. emarginata Kit.* herb. et Willd. Spec. IV. pag. 262.

β. coarctata Kit. herb. valvis ciliolatis.

22. *C. pilulifera Linn.* Spec. II. p. 1385.

23. *C. gynobasis Vill.* Delph. II. p. 206. *C. dlpestris All.* Ped. n. 2329. *C. diversiflora Host.* Gram. I. p. 53. T. 70.

** Radix stolonifera.

24. *C. ericetorum Poll.* Palat. II. n. 886. *C. ciliata Willd.* Spec. IV. p. 261.

25. *C. praecox Jacq.* Austr. V. p. 23. T. 446. *C. ericetorum Lumn.* Poson. n. 932. non Poll. *C. truncatula Kit.* herb.

β. umbrosa Host. Gram. I. pag. 52. T. 69.

γ. rhizostachya Loisl. Gall. II. p. 309.

δ. pyriformis Lang. herb.

26. *C. trachyantha Dorner.* herb.

27. *C. tomentosa Linn.* mant. p. 123. *C. filiformis Lumn.* Poson. n. 933. non Linn.

β. angustifolia Kit. herb.

K. *Ornithopodae:* Spicae fem. 1 — 3, pedunculatae, erectae; bracteae vaginantes aphyllae; perigynia pubescentia, obovato-trigona, brevissime rostrata, ore emarginata.

28. *C. humilis Leyss.* Hall. p. 175. n. 845. *C. clandestina Good.* in Linn. Trans. II. p. 167.

29. *C. ornithopoda Willd.* Spec. IV. p. 255.

30. *C. digitata Linn.* Spec. II. p. 1384.

L. *Miliaceae:* Spicae fem. 2 — 3, densiflorae, pedunculatae, cernuae, bracteae vaginantes foliaceae; perigynia elliptico-oblonga, obtusa, erostrata.

31. *C. pallescens Linn.* Spec. II. p. 1386.

M. *Laxiflorae:* Spicae fem. 2 — 4, pedunculatae laxiflorae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia subgloboso-ovata, rostrata; rostrum teres oblique truncatum.

32. *C. panicea Linn.* Spec. II. p. 1387.

33. *C. pilosa Scop.* Carn. 1162.

N. *Oligocarpae:* Spicae fem. 1 — 2, laxiflorae, breviter pedunculatae, erectae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia ventricoso-trigona, in rostrum bidentatum aut bifidum subito acuminata.

34. *C. brevicollis Lam.* et *Cand.* Flor. Franc. IV. p. 295. *C. rhynchocarpa Heuff.* Flor. 1833. p. 364. *C. bifida Kit.* herb.?

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0114-6

β. puberula * perigyniis puberulis.

35. *C. Michelii Host.* Synops. p. 507.

36. *C. depauperata Good.* in Linn. Trans. II. p. 181.

O. *Flavae:* Spicae fem. 2 — 3, approximatae, subsessiles; bracteae vaginantes foliaceae, patentes; perigynia subrotundo-ovata, inflata, in rostrum antice planum, margine serrulato-scabrum, ore bidentatum acuminata.

37. *C. extensa Good.* in Linn. Trans. II. p. 175.

38. *C. flava Linn.* Spec. II. p. 1384. *C. patula Host.* Gram. I. p. 48. T. 63.

39. *C. Oederi Ehrh.* Calam. n. 79.

†† Spicae terminales masculae plures.

a. Perigynia glabra.

P. *Secalinae:* Spicae fem. 3 subsessiles; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia plano-convexa, in rostrum acute bifidum, membranaceo-marginatum, ciliato-serratum, antice planum acuminata.

40. *C. secalina Wahlenb.* Act. Holm. 1803. p. 151. *C. hordeiformis Host.* Gram. I. p. 57. T. 76.

Q. *Flaccae:* Spicae fem. 2 — 3, pedunculatae, cernuae; bracteae breviter vaginantes, foliaceae; perigynia elliptico-oblonga, compresso-convexa, scabriuscula; rostellum brevissimum ore truncatum aut subemarginatum.

41. *C. glauca Scop.* Carn. II. p. 223. *C. flacca Schreb.* Spic. app. p. 150. *C. recurva Good.* in Linn. Trans. II. p. 148.

β. *alpina Heuff.* herb.

γ. *transylvanica Heuff.* herb.

δ. *erecta Heuff.* herb.

R. *Paludosae:* Spicae fem. 2 — 4, breviter pedunculatae erectae; bracteae amplectentes foliaceae; perigynia oblongo-ovata aut conica, nervosa, in rostrum breve bidentatum aut bicuspidatum attenuata.

42. *C. palùdosa Good.* in Linn. Trans. II. p. 202.

β. *Kochiana Cand.* Cat. p. 89.

43. *C. riparia Curt.* Lond. fasc. IV. T. 60. *C. crassa Ehrh.* Beitr. IV. p. 43.

44. *C. nutans Host.* Gram. I. p. 61. T. 83.

S. *Vesicariae:* Spicae fem. 2—4, breviter pedunculatae erectae; bracteae amplectentes foliaceae; perigynia subgloboso-ovata, inflata, nervosa; rostrum compressum bicuspidatum.

45. *C. ampullacea Good.* in Linn. Trans. II. p. 207.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0115-1

46. *C. vesicaria Linn.* Spec. II. p. 1388.

T. *Pseudocyperi:* Spicae masc. subbinae; fem. 4 — 6, longe pedunculatae, pendulae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia ovato-lanceolata, nervosa, in rostrum bicuspidatum attenuata; valvae linearisubulatae.

47. *C. Pseudocyperus Linn.* Spec. II. p. 1387.

b. Perigynia hirta.

U. *Trichocarpae:* Spicae masc. 1 — 2, fem. 2 — 3, subsessiles erectae; bracteae amplectentes foliaceae; perigynia ovata, turgida, in rostrum breve bicuspidatum attenuata.

48. *C. filiformis Linn.* Spec. II. p. 1385.

V. *Hirtae*: Spicae fem. 2 — 3, subsessiles erectae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia ovata, plano-convexa, in rostrum bicuspidatum acuminata.

49. *C. hirta Linn.* Spec. II. p. 1389.

β. hirtaeformis Pers. Synops. II. p. 547.

2. Carices desciscentes: Stigm. 2.

X. *Auritae:* Spicae fem. 2 — 3, subsessiles, erectae; bracteae amplectentes vel brevissime vaginantes, basi biauriculatae, foliaceae; perigynia elliptica, plana; rostrum brevissimum teres, oblique truncatum aut leviter emarginatum.

50. *C. caespitosa Good.* in Linn. Trans. II. p. 195. *Vignea caespitosa Reichenb.* Germ. n. 416.

β. alpina Gaud. Helv. VI. p. 70. *C. saxatilis Kit.* herb. plant. hung.

51. *C. dacica Heuff.* Plant. Ban. rar. fasc. n. 40. *C. saxatilis Baumg.* Trans. III. p. 296.

52. *C. stricta Good.* in Linn. Trans. II. p. 196. *C. caespitosa Linn.* Spec. II. p. 1388. *C. varia Lumn.* Poson. n. 942. *Vignea stricta Reichenb.* Germ. n. 415.

51. *C. acuta Linn.* Spec. II. p. 1388. *Vignea acuta Reichb.* Germ. n. 417.

Bericht über die Arbeiten der botanischen Section bei der vierten Versammlung der italienischen Naturforscher und Aerzte zu Padua im September 1842.

(Fortsetzung.)

Sitzung am 27. September 1842.

Die zoologische und botanische Section sind unter dem Vorsitze

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0116-7

46. *C. vesicaria Linn.* Spec. II. p. 1388.

T. *Pseudocyperi:* Spicae masc. subbinae; fem. 4 — 6, longe pedunculatae, pendulae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia ovato-lanceolata, nervosa, in rostrum bicuspidatum attenuata; valvae linearisubulatae.

47. *C. Pseudocyperus Linn.* Spec. II. p. 1387.

b. Perigynia hirta.

U. *Trichocarpae:* Spicae masc. 1 — 2, fem. 2 — 3, subsessiles erectae; bracteae amplectentes foliaceae; perigynia ovata, turgida, in rostrum breve bicuspidatum attenuata.

48. *C. filiformis Linn.* Spec. II. p. 1385.

V. *Hirtae*: Spicae fem. 2 — 3, subsessiles erectae; bracteae vaginantes foliaceae; perigynia ovata, plano-convexa, in rostrum bicuspidatum acuminata.

49. *C. hirta Linn.* Spec. II. p. 1389.

β. hirtaeformis Pers. Synops. II. p. 547.

2. Carices desciscentes: Stigm. 2.

X. *Auritae:* Spicae fem. 2 — 3, subsessiles, erectae; bracteae amplectentes vel brevissime vaginantes, basi biauriculatae, foliaceae; perigynia elliptica, plana; rostrum brevissimum teres, oblique truncatum aut leviter emarginatum.

50. *C. caespitosa Good.* in Linn. Trans. II. p. 195. *Vignea caespitosa Reichenb.* Germ. n. 416.

β. alpina Gaud. Helv. VI. p. 70. *C. saxatilis Kit.* herb. plant. hung.

51. *C. dacica Heuff.* Plant. Ban. rar. fasc. n. 40. *C. saxatilis Baumg.* Trans. III. p. 296.

52. *C. stricta Good.* in Linn. Trans. II. p. 196. *C. caespitosa Linn.* Spec. II. p. 1388. *C. varia Lumn.* Poson. n. 942. *Vignea stricta Reichenb.* Germ. n. 415.

51. *C. acuta Linn.* Spec. II. p. 1388. *Vignea acuta Reichb.* Germ. n. 417.

Bericht über die Arbeiten der botanischen Section bei der vierten Versammlung der italienischen Naturforscher und Aerzte zu Padua im September 1842.

(Fortsetzung.)

Sitzung am 27. September 1842.

Die zoologische und botanische Section sind unter dem Vorsitze

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0116-7

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Heuffel Johann (Janos) A.

Artikel/Article: Caricineae in regnis Hungariae, Croatiae, Slavoniae, magnoque Transylvaniae principatu sponte nascentes 527-536