Illustrationes plantarum orientalium ou Choix de plantes nouvelles ou peu connues de l'Asie occidentale, par M. le comte JAUBERT et M. ED. SPACH. VI—XI. Livrais. Paris, RORET. Tab. 51—100. in fol.

(Vergl. Flor. 1843. Bd. II. S. 411. etc.)

Tab. 51. *Eunomia Aubretii* n. sp. Hiebei die Bemerkung, dass alle Eunomien geflügelte Schötchenklappen besitzen und sich von den Aethionemen nur durch den Mangel der Anhängsel an den Staubfäden unterscheiden. Tab. 52. *Hutchinsia chrysantha* n. sp. Die einzige bekannte *Hutchinsia* mit gelben Blumen. Tab. 53. A. *Meniocus grandiflorus* n. sp. Nach den Verf. unterscheidet sich die Gattung *Meniocus* von *Alyssum* nur durch die vollkommen flachen Klappen der Schötchen. Tab. 53. B. *Meniocus filifolius* n. sp. Tab. 54. *Quercus castaneaefolia C. A. Meyer.* Tab. 55. *Q. persica* n. sp. Tab. 56. *Q. cypria* n. sp. Tab. 57. A. *Q. trojana Webb.* Tab. 57. B. *Q. calliprinos Webb.* Tab. 58. *Q. Aucherii* n. sp. Tab. 59. *Argyrolobium crotalarioides* n. sp. Der Beschreibung dieser Pflanze schicken die Verf. eine Uebersicht sämmtlicher Argyrolobien der südlichen Halbkugel voraus, indem sie dieselben zunächst in 2 Reihen (Series) *Homophylla* und *Heterophylla* theilen, dann in der ersten die Sectionen *Crotalarioides*, *Cytisoides*, *Lotoides*, *Eremolobium*, *Tephrosioides* und *Emodiana*, in der zweiten aber die Sectionen *Trigonelloides* und *Ornithopodioides* aufstellen, und bei jeder die ihr angehörigen Species diagnosiren. Unter der Sectio *Cytisoides* finden wir auch den *Cytisus argenteus L.* als *Argyrolobium Linnaeanum Walpers* aufgeführt. Tab. 60. *Argyrolobium trigonelloides* n. sp. Tab. 61. *Taverniera gonoclada* n. sp. Tab. 62. *T. ephedroidea* n. sp. Tab. 63. *Botryolotus persicus* n. gen. et sp. Diese neue Gattung erhält den Character: Legumen (indehiscens?) sublanceolatum v. acinaciforme, rectum, elongatum, obtusissimum, compressum, chartaceum, transverse striatum, subreticulatum, nervo filiformi ad suturam trophospermicam marginato v. anguste alato cinctum, stylo filiformi immutato persistente uncinulatum, abortu 1—3-spermum (Caetera Meliloti). Durch die Bildung der Frucht von *Melilotus* und *Trigonella* gleich verschieden, nähert sie sich vielleicht mehr der Gattung *Melissitus Medic.* et *Mönch.*, welche Seringe, ohne dieses viel frühere Synonym zu citiren, als *Pocockia* wieder hergestellt hat. Tab. 64. *Sphaerophysa microphylla* n. sp. Tab. 65. *Stechmannia Staehelinae DeC.* Tab. 66. *St. ramosissima* n. sp. Tab. 67. *Derdesia macrocephala* = *Jurinea macrocephala DeC.* Diese dem Pater Giovanni Derdesian, apostolischen Präfecten der katholischen Armenier, in dessen Armen Aucher Eloy am 6. October 1838 verschied, gewidmete Gattung unterscheidet sich von *Jurinea* und den andern Serratuleen durch die Regelmässigkeit der Blume und die Bildung der Staubgefässe, und nähert sich dadurch mehr den Carlineen, besonders *Cousinia*. In dieselbe Verwandtschaft gehört Tab.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0330-5

68. *Outreya carduiformis*, nach dem französischen Consul zu Trapezunt benannt. Tab. 69. *Lonicera persica* n. sp. Tab. 70. *L. nummulariaefolia* n. sp. Tab. 71. *L. orientalis Lam.* Tab. 72. *L. caucasica Pallas.* Tab. 73. *L. Aucherii* n. sp. Tab. 74. *Gaillonia Oliverii A. Rich.* Tab. 75. *G. Richardiana* n. sp. Tab. 76. *G. incana* n. sp. Tab. 77. *G. Bruguierii A. Rich.* Tab. 78. *G. criantha* n. sp. Tab. 79. *G. hymenostephana* n. sp. Tab. 80. *G. calycoptera* n. sp. Tab. 81. *G. crucianelloides* n. sp. Dieser artigen Suite von Gaillonien geht ein Conspectus specierum voraus, worin neben den genannten auch noch *G. humifusa* n. sp. und *G. Aucherii* = *Jaubertia Aucheri* aufgeführt werden. Ein gleicher Conspectus specierum wird von den Asperulen aus dem Subgenus *Sherardiana* gegeben und von diesen Tab. 82. A. *Asperula azurea* n. sp., Tab. 82. B. *A. setosa* n. sp. und Tab. 83. *A. sherardioides* n. sp. abgebildet. Tab. 84. *Cytisopsis dorycniifolia* n. gen. et sp. Diese neue Gattung der Leguminosen gehört zur Gruppe der Anthyllideen (Koch), obschon die sie constituirende Art in ihrer Beblätterung den Dorycnien, in dem oberflächlichen Ansehen der Blüthen aber den Cytisen aus der Untergattung *Tubocytisus* gleicht. Sie unterscheidet sich von *Anthyllis* durch die sitzenden, gefingerten und nebenblattlosen Blätter, durch den nach dem Verblühen mit den Blumenblättern abfallenden Kelch, die dem Kiele nicht anhängenden Flügel, und überdiess durch die dicke, verlängerte, lederartige und zweiklappige Frucht. Tab. 85. *Statice arabica* n. sp. Tab. 86. *St. Borei* n. sp. Tab .87. *St. sisymbriifolia* n. sp. Tab. 88. *St. plantaginiflora* n. sp. Tab. 89. *St. androsacea* n. sp. Diese, so wie die folgenden Arten, gehören einem eigenthümlichen, wie es scheint, rein orientalischen Subgenus *Armeriastrum* an, das sich durch die bleibenden, lederartigen, nadelförmigen und stechenden Blätter, die in zweizeilige Aehren gestellten Blüthen und die kegelförmigen Narben vor den übrigen Staticen sehr auszeichnet, und mit demselben Rechte wie *Armeria* als eigne Gattung gelten könnte. Die Verf. definiren in dem Conspectus specierum 21 hiezu gehörige Arten und bilden davon noch ab: Tab. 90. *St. Tournefortii* n. sp, Tab. 91. *St. glumacea* n. sp. Tab. 92. *St. Hohenackeri* n. sp. Tab. 93. *St. Oliverii* n. sp. Tab. 94. *St. acerosa Willd.* Tab. 95. *St. lepturoides* n. sp. Tab. 96. *Ononis Aucherii* n. sp. Tab. 97. *Aristolochia hirta L.* Tab. 98. *A. Bottae* n. sp. Tab. 99. *A. Aucherii* n. sp. Tab. 100. A. *Billardieri* n. sp.

Mit diesem ersten Hundert Tafeln schliesst sich der erste Band dieses Werkes, dem wir auch ferner den gedeihlichsten Fortgang wünschen. F.

Anzeigen.

Flora Germanica exsiccata edita a Societate Florae Germaniae. Centuria XXV. corante L. Reichenbach. Lipsiae, apud Fried. Hofmeister, 1844.

Inhalt: 2401. Potamogeton lanceolatus Sm. 2402. P. longifolius Gay. 2403. Elymus arenarius L. 2404. Lagurus ovatus L. 2405. Polypogon mon-

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06161-0331-1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: 27

Autor(en)/Author(s): Jaubert J.

Artikel/Article: Illustrationes plantarum orientalium ou Choix de plantes nouvellcs ou peil conuues de l'Asie occidentale 748-749