# Flora.

Nro. 4.

Regensburg, am 28. Januar 1839.

## I. Original-Abhandlungen.

1. *Diagnoses generum specierumque novarum in Abyssinia a cl. Rüppell detectarum.* Auctore G. Fresenius, Professore Francofurtensi.

(Continuatio.)

*Leguminosæ.*

*Trifolium simense Fresen.* Tr. caule ramoso procumbenti-erecto, petiolo communi ultra stipulas haud producto, stipularum apicibus lanceolatis longe subulato-cuspidatis, foliolis oblongo- et lanceolato-linearibus obtusiusculis argute serrulatis glabris, venis parallelis rectis, petiolulis villosis, capitulis solitariis axillaribus globosis longepedunculatis, pedunculis villosis folio longioribus, tubo calycino multinervio glabro, laciniis subulato-setaceis ciliatis corolla brevioribus tubum suum subæquantibus, infima longiore.

Species pulchra, in provincia Simen observata. Corollæ in sicco purpureo-vel carneo-roseæ. Calyx flavescenti-albidus. Stipulæ apice interdum (sub foliolis) macula atro-violacea notatæ. Alæ elongatæ vexillum æquantes.



Regensburgische Botanische Gesellschaft

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0053-2

*Trifolium polystachyum Fresen.* Tr. caule adscendente ramoso, petiolo communi ultra stipulas haud producto, stipularum apicibus lanceolatis mucronato-cuspidatis, foliolis glabris argute serrulatis venis parallelis rectis, inferioribus oblongo-cuneatis truncatis mucronatis, superioribus oblongo-lanceolatis mucronatis, spicis cylindricis (1—1½‴ longis), pedunculis axillaribus pubescentibus folio longioribus, tubo calycino decemnervio basi (pedicello præsertim) laciniisque inferne villosis, laciniis subulatis rigidis corolla subdimidio brevioribus et tubum suum subæquantibus, infima longiore.

Flores in sicco purpurei. Carina apice intense violacea.

*Trifolium calocephalum Fresen.* Tr. caule repente, petiolo communi ultra stipulas producto (1—2 Pollicari), stipulis latis nervosis membranaceis, apicibus ovatis obtusis mucronulatis, foliolis oblongo-cuneatis emarginatis denticulatis glabris, venis parallelis rectis, capitulis axillaribus longe-pedunculatis paucifloris, tubo calycino decemnervio glabro, laciniis lanceolatis longe subulato-cuspidatis margine membranaceis ciliatis subæqualibus, tubo suo duplo longioribus et corolla dimidio brevioribus.

Pulcherrima species, in provincia Simen lecta. Capitula in speciminibus nostris tantum sexflora, floribus magnis violaceis 7—8‴ longis. Calyces fere Trifolii alpini, at minores; stamina diadelpha, filamenta alternatim majora et hæc apicem versus dilatata. Ovarium lineari-oblongum 9-spermum;

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0054-8

stylus compressus, glaber; stigma capitatum. Secundum habitum et characteres plurimos omnino Trifolium, præsertim ovario polyspermo (fructus maturus deest) a cæteris Trifoliis paululum recedere videtur.

*Trifolium Rüppellianum Fresen.* Tr. caule erecto ramoso sparsim piloso, petiolo communi ultra stipulas producto (1 — 1½ poll.), stipulis latis nervosis ovatis apicibus lanceolatis acuminato-cuspidatis, foliolis obovato-cuneatis apiculatis dentatis glabris, capitulis axillaribus globosis pedunculatis, pedunculis sparsim pilosis folio longioribus, tubo calycino decemnervio glabro, laciniis æqualibus subulatis basi hirsutiusculis apice (in capitulis nondum evolutis) parum uncinatis, tubo suo sublongioribus corolla brevioribus.

In provincia Simen lecta. Petala in sicco purpurea venis saturatioribus striato. Filamenta tria præ cæteris apice in laminam spathulatam dilatata.

*Trifolium tembense Fresen.* Tr. petiolo communi ultra stipulas producto (½ — 1¾ poll.), stipulis latis nervosis apicibus ovatis cuspidatis, foliolis obovatis et obovato-oblongis argute subduplicato-serratis glabris, capitulis axillaribus subrotundis pedunculatis, pedunculis folio brevioribus subglabris, tubo calycino decemnervio glabro, laciniis subæqualibus lanceolato-subulatis basi ciliatis apice subuncinato-curvatis, tubo suo longioribus, corolla subbrevioribus.

Lecta in itinere e prov. Temben versus Simen. Præcedenti habitu quodammodo affinis, at characte-

ribus datis satis distincta. Corollæ venis coloratis striatæ, præsertim apice in sicco violaceæ.

*Trifolium semipilosum Fresen.* Tr. caule procumbente cum petiolis pedunculisque villoso, petiolo communi ultra stipulas producto, stipulis villosis nervosis apicibus lineari-lanceolatis acuminatis, foliolis obovatis v. subrotundis basi cuneatis, retusis v. leviter emarginatis denticulatis, supra glabris, subtus foliolo terminali nervo medio et margine, foliolis lateralibus dimidio altero subsericeo-villosis, altero glabris, venis subarcuatis, capitulis axillaribus subrotundis pedunculatis, pedunculis folio sublongioribus, tubo calycino decemnervio subvilloso, laciniis lanceolato-subulatis æqualibus villoso-ciliatis tubum suum æquantibus, corolla subdimidio vel triplo brevioribus.

In provincia Simen lecta. Specimina majora *Trifol. repenti* affinia, at jam primo intuitu floribus majoribus, pedunculis brevioribus, stipulis, indumento diversa. Adsunt quoque exemplaria minora habitu alpino insignia, caulibus pluribus e radice longa lignosa cæspitosis. Flores in sicco flavescentes. Ovarium villosum.

*Trifolium bilineatum Fresen.* Tr. caule, petiolis pedunculisque patentim villosis, petiolo communi ultra stipulas producto, stipulis ovatis nervosis villosis apicibus lanceolatis cuspidatis, foliolis ovatis v. ovato-oblongis mucronulatis dentatis basi cuneatis utrinque margineque villosis, capitulis ovato-globosis pedunculo folio longiori insidentibus, calycibus vil-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0056-9

losissimis decemnerviis, laciniis subulatis corolla brevioribus, quatuor æqualibus, infima longiore, leguminibus ovalibus monospermis.

Flores in sicco violacei. Calyx post anthesin subinflatus. Alæ carina paullo longiores, hæc in curvatura apicem versus lineis duabus elevatis albidis in apiculum brevem exeuntibus instructa. Ovarium apice pilosum.

*Trifolium procumbens L.*

*Cassia didymobotrya Fresen.* C. foliolis 5—7-jugis lanceolatis mucronatis breviter pubescentibus v. subglabris, petiolo eglanduloso, stipulis e basi subrotunde-auriculata subulatis, racemis ex axillis superioribus, folio longioribus, leguminibus compressis lato-linearibus leviter arcuatis pubescentibus.

Racemi florentes gemini, inferior superiori longior. Bracteæ caducæ, concavæ, ovatæ, breviter acuminatæ. Sepala obtusa. Petala venis nervisque crassis coloratis picta. Antheræ apice biporosæ.

*Cassia goratensis Fresen.* C. ramis pedunculisque rubro-fuscis tomentosis, foliolis 9—10-jugis ovato-oblongis oblongisque, apice obtusiusculo e nervo medio excurrente mucronatis, supra pubescentibus, subtus sublanato-pubescentibus, glandula ovato-oblonga acuta inter paria, floribus longe pedunculatis in corymbis compositis, ovariis angustelinearibus compressis sericeo-tomentosis.

Glandulæ ovato-oblongæ, acutæ, breviter stipitatæ, fuscæ, apice nigræ, etiam in inflorescentia obviæ. Foliola $1\frac{1}{2}$—2‴ longa, $\frac{3}{4}$‴ lata. Sepala ob-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0057-5

tusa, margine ciliata, exteriora basi et medio sericeo-pilosa, cum petalis in sicco aurantiaca. Antheræ apice biporosæ.

*Cassia holosericea Fresen.* C. foliolis 7—8-jugis oblongis apice rotundatis v. retusis brevissime mucronulatis, utrinque molliter pubescentibus, petiolo eglanduloso, stipulis lanceolatis subulato-acuminatis altera basi subrotunde-auriculatis, racemis axillaribus folio brevioribus, leguminibus subfalcato-ellipticis holosericeis super semina turgidis.

In flora Massauensi obvia. E Sectione Senna. Sepala oblonga obtusa basin versus sensim attenuata, v. lineari oblonga. Petala nervis venisque atropurpureis picta. Antheræ apice biporosæ. Legumina 10—12‴ longa, 6‴ lata.

*Cassia occidentalis L.* E flora Massauensi.

*Fillæa? Brucei Fresen.* F. aculeis rameis petiolaribusque uncinatis, spinis stipellaneis rectis, foliis bipinnatis, pinnis 8—10-jugis, foliolis 7—12-jugis oblongo-æquilatis obtusis, racemis spiciformibus in apice ramorum subpaniculatis.

Racemi in apice ramorum 5—8, inflorescentiam subpaniculæformem formantes, pedunculati, confertiflori, $2\frac{1}{2}$—$3\frac{1}{2}$ poll. longi. Calycis tubus brevis carnosus, extus, ut pedicelli, pubescens, limbus quinquepartitus; petala basi villosa cum staminibus infra villosis fauci calycis inserta; in floribus vix evolutis stamina laciniis calycis opposita longiora, petalis opposita breviora. Stigma urceolato-infundibuliforme.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0058-1

Ovarium lanuginosum breviter stipitatum. (Ovaria matura vel satis evoluta desunt.)

Procul dubio planta hæc *Kantuffam* Brucei (tab. 14. ed. gall. in 4to.) refert, ideoque Pterolobium lacerans R. Br. nondum descriptum huc pertinet; quoad folia et habitum cum Mimosis pluribus armatis convenit, structura vero et numero floris (calycis nempe, petalorum, staminibus 10, ovario lanuginoso, floribus quoque hermaphroditis) *Fillææ* Flor. Senegamb. respondet ideoque ut altera species hujus generis, at propter foliationem diversam et fructum ignotum cum signo? a me hic proponitur.

(Continuabitur.)

2. *Jahresbericht aus Dalmatien pro 1838;* von Prof. Franz Petter in Spalato.

Der Botanik in Dalmatien ist in diesem Jahre (1838) eine grosse Ehre widerfahren. Wie bereits aus öffentlichen Blättern bekannt ist, hatte Se. Maj. König Friedrich August von Sachsen dieses Land mit seiner Gegenwart beglückt. Die Reise wurde, wie es scheint, bloss in der Absicht unternommen, um die hier angehäuften botanischen Schätze auf ihrem heimischen Boden zu schauen. Wenn die allgemeine Zeitung kürzlich recht berichtet hat, so beschäftigt sich Hr. Biasoletto in Triest, welchem die Ehre zu Theil ward, Se. Maj. den König begleiten zu können, mit der Aufgabe, dem Publikum einen umfassenden Bericht über diese Reise vorzulegen. *) Möge es ihm bei

*) Eine kleine Brochure über diese Reise hat bereits der

Ovarium lanuginosum breviter stipitatum. (Ovaria matura vel satis evoluta desunt.)

Procul dubio planta hæc *Kantuffam* Brucei (tab. 14. ed. gall. in 4to.) refert, ideoque Pterolobium lacerans R. Br. nondum descriptum huc pertinet; quoad folia et habitum cum Mimosis pluribus armatis convenit, structura vero et numero floris (calycis nempe, petalorum, staminibus 10, ovario lanuginoso, floribus quoque hermaphroditis) *Fillææ* Flor. Senegamb. respondet ideoque ut altera species hujus generis, at propter foliationem diversam et fructum ignotum cum signo? a me hic proponitur.

(Continuabitur.)

2. *Jahresbericht aus Dalmatien pro 1838;* von Prof. Franz Petter in Spalato.

Der Botanik in Dalmatien ist in diesem Jahre (1838) eine grosse Ehre widerfahren. Wie bereits aus öffentlichen Blättern bekannt ist, hatte Se. Maj. König Friedrich August von Sachsen dieses Land mit seiner Gegenwart beglückt. Die Reise wurde, wie es scheint, bloss in der Absicht unternommen, um die hier angehäuften botanischen Schätze auf ihrem heimischen Boden zu schauen. Wenn die allgemeine Zeitung kürzlich recht berichtet hat, so beschäftigt sich Hr. Biasoletto in Triest, welchem die Ehre zu Theil ward, Se. Maj. den König begleiten zu können, mit der Aufgabe, dem Publikum einen umfassenden Bericht über diese Reise vorzulegen. *) Möge es ihm bei

*) Eine kleine Brochure über diese Reise hat bereits der

seinen guten Kräften nur nicht an der für eine solche Arbeit nöthigen Zeit gebrechen!

Aber nicht nur in botanischer Beziehung, sondern auch in historischer, ist die Erscheinung eines gekrönten Hauptes auf dalmatischem Boden eine merkwürdige. Die Annalen der Geschichte bewahren uns nur sehr wenige Beispiele von Erscheinungen so hoher Gäste auf. Ungarns König Koloman, der Eroberer der Hauptstadt Zara, kam als Feldherr mit dem Schwerte in der Hand in das Land. Diess geschah 1105; denn weiter wollen wir in das verworrene Dunkel der Landesgeschichte nicht zurückgehen. Stephan II. kam ebenfalls an der Spitze seiner Kriegsleute dahin (1124). Bela IV. betrat Dalmatien als Vertriebener, fliehend vor den Mongolen, welche sein Reich verheerten (1142). Englands ritterlicher König Richard Löwenherz, von Menschen und Elementen verfolgt, landete am Eiland Lacroma bei Ragusa (1196). König Sigmund von Ungarn, ebenfalls ein Flüchtling, that dasselbe an derselben Stelle (1396). Nur die Könige Ludwig I. von Ungarn und Ladislaus von Neapel verweilten unter günstigeren politischen Verhältnissen in Dalmatien; ersterer 1371,

---

sächsische Konsul in Triest, Hr. Sartorio, welcher sich ebenfalls in des Königs Begleitung befand, in deutscher und italienischer Sprache veröffentlicht, und bei Gebrüder Battara in Zara ist ein italienischer Abdruck davon, betitelt „Viaggio di S. M. Federico Augusto Re di Sassonia alla Dalmazia" erscheinen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0060-0

letzterer 1403. Gar traurig und schaurig war der Brautzug der Braut des Königs von Neapel Beatrix durch Dalmatien im Jahre 1476. Sultan Mohamed liess nämlich durch seine Renner Kroatien und Dalmatien durchstreifen, und auf der ganzen Strecke, welche die königliche Braut zog, sengen und brennen, schlachten und morden. Kirchen und Klöster wurden geplündert und den Flammen preisgegeben, Nonnen und Priester auf den Altären geschändet und geschlachtet und des viehischen Gräuels mehr verübt. Auf der ganzen Strecke, welche die königliche Braut zog, trat ihr das Bild des Jammers und der Zerstörung entgegen. Oft schlug sie ihr Nachtlager inmitten von Trümmern und rauchenden Brandstätten auf, wo wenige Stunden vorher noch die Barbaren gehauset und geschmauset hatten, und die frischen Leichname der Erschlagenen lagen unbeerdigt umher. So erzählt das Factum der Freiherr von Hammer in seiner unvergleichlichen Geschichte der Osmanen (II. Bd. S. 529). Eben so tragisch war die Reise der königlichen Wittwe Elisabeth von Ungarn, welche, von ihren rebellischen Unterthanen gedrängt, im Jahre 1385 in Dalmatien Schutz suchen wollte, aber bei Diakovar gefangen und ihrem Feinde, dem Gross-Prior der Templer auf Wrana (bei Zara) ausgeliefert ward. Der abentheuerliche Ernst Graf von Mansfeld betrat ebenfalls als ein Flüchtling das Land, dort die Ruhe findend, welche er auf der Welt nicht

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0061-6

gefunden hatte (1626). *) Nun tritt eine fast zweihundertjährige Pause ein; denn erst im Jahre 1818 war es, wo weiland Kaiser Franz I. an der Seite seiner erlauchten Gemahlin Carolina Augusta, das Füllhorn des Guten auf das Land schüttend, Dalmatien bereiste. Mit Franz I. beginnt eine neue Aera der Civilisation für Dalmatien, wie unter dem grossen Augustus zur Zeit der Römerherrschaft eine neue für dasselbe begonnen hatte. — Se. Maj. König Friedrich August von Sachsen betrat — Dank sey es dem glücklichen Zeitalter der Eisenbahnen, der Dampfschiffahrt, der Industrie als Folge des Weltfriedens — Dalmatien unter glücklichen politischen Verhältnissen. — Ihn führ-

*) Im Conversations-Lexicon heisst es, dass Mansfeld stehenden Fusses und in voller Rüstung auf zwei seiner Adjutanten gestützt, seines thatenreichen Lebens letzten Augenblick erwartete, und dass diess in einem Dorfe bei Zara geschehen sey, und dass der Gestorbene in Spalato begraben wurde. In Iselin's historischem Lexicon ist das Dorf, wo Mansfeld verschied, Urakovicz genannt, und nach Bosnien versetzt. Ich konnte weder über das Eine noch das Andere eine Spur auffinden. In Dalmatien wenigstens existirt kein Dorf mit Namen Urakovicz; eine Begräbnissstätte Mansfeld's ist in Spalato ganz unbekannt, so wie des ganze historische interessante Factum. Wahrscheinlich wurde Mansfeld's Leiche nach Deutschland geschafft, und wenn ihm auch seine Getreuen einen Denkstein gesetzt hatten, so wurde er sicherlich bald zerstört, da Mansfeld bekanntlich ein eifriger Protestant und noch dazu ein Apostat war.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0062-2

ten nicht der blutige Ruf des Krieges, nicht gewonnene oder verlorene Schlachten, politische Zwecke, sondern andere Motive hierher, und in dieser Beziehung ist die Reise Königs Friedrich August wesentlich verschieden von dem Erscheinen aller seiner Vorgänger. Schon der Umstand, dass Friedrich August die Spitze des Pflanzen spendenden Biokovo-Berges (leider etwas zu früh, da der Winter lang anhielt) bestiegen hatte, verdiente dort auf dem Punkte, wo er stand, der Nachwelt erzählt zu werden, denn Jahrhunderte werden vergehen, ehe wieder ein gekrönter Fürst der Erde dort wandeln wird. — Die Bewohner Dalmatiens empfingen Höchstdenselben in Liebe und Ehrfurcht, als einen nahen Anverwandten der Herrscher-Familie, welcher sie als treue Unterthanen angehören, und als einen mit dem deutschen Volke und dessen Geschichte identificirten Fürsten. Möge Höchstderselbe nur recht viele freundliche Erinnerungen mit sich fortgenommen haben.

Ausser dieser botanisch-historisch-merkwürdigen Erscheinung habe ich für heuer fast wenig zu berichten. Unter den Pflanzen, mit welchen ich im Jahreslaufe meine Sammlung und meinen Katalog bereichert habe, sind: *Campanula Scheuchzeri*, *Gentiana ciliata*, *Gnaphalium dioicum*, *Rhamnus Alaternus*, *Viscum Oxycedri*. Die ersten drei Pflanzen kommen auf einem Grenzberge bei Sign vor. *Rhamnus Al.* am Wasserfalle bei Scardona. Dem *Viscum Oxyc.* hatte ich lange vergeblich nachgespürt,

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0063-8

endlich entdeckte ich es auf der Hügelkette, welche den Hafen Milná auf der Insel Brazza umgibt. Auch bei Metcovich im Narenta-Distrikt kommt es vor, aber ebenfalls nicht im Thale, sondern hoch oben. Mein Freund, der Forstcommissär Kargl, hat diesen Sommer von hier aus einen Ausflug auf den Berg Kamenschnizza gemacht. Derselbe liegt sieben Wegstunden südöstlich von Sign, hart an der türkischen Grenze. Er bestieg ihn am 7. August und fand auf dem Gipfel noch Schnee. Er schildert die Vegetation daselbst als ungemein üppig und wahrhaft überraschend.

Für Ichthyologen möchte es vielleicht Interesse haben, zu wissen, dass heuer in unsern Gewässern zwei grosse Fische aus der Familie der Haie gefangen wurden. Der erste (am 3. April) wog 900 Pf. peso grosso. Die hiesigen Fischer nennen ihn *pesce manzo*, d. i. Fischochs, weil das Auge des Fisches dem Auge des Ochsen sehr ähnlich ist. Wahrscheinlich ist es *Squalus griseus*. Ein anderer Hai wurde am 22. Mai gefangen. Die Fischer nannten ihn *pesce spada*, d. ist Schwertfisch, weil er einen schwertähnlichen Schwanz hat. Er wog 350 Pf. Den Schwanz, welcher 6 Fuss lang ist, bewahrt ein Bekannter von mir auf. Dieser Hai ist nach meiner Meinung der *Squalus vulpes*. Das Fleisch von beiden wurde zum Verkaufe ausgeschnitten: jenes des Schwertfisches gilt für sehr schmackhaft. Die grosse Leber der Haie enthält sehr viel Fett und wird ausgekocht, und der Thran an die Gärber

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0064-3

verkauft. Ein noch grösseres Fischungeheuer wurde am 4. Mai bei einem heftigen Sturme aus Südost bei Budua im Kreise Cattaro an den Strand geschwemmt. Nach der Beschreibung, welche in der Zarner Zeitung davon gemacht ward, wurde sein Gewicht auf 120 Ctr. geschätzt. Er nahm einen Raum von 20 Klafter ein (occupò uno spazio di 20 Klafter? hiess es). Der Fisch war schon im ersten Grade der Fäulniss. Es war wahrscheinlich ein *Cachelot (Physeter macrocephalus)*, welcher sich aus dem hohen Norden hierher verirrt hatte. Derlei Fische verdienten ausgebalgt zu werden, denn sie sind gute Schaustücke in Naturalien-Kabineten für die gaffende Menge. Einen *Squalus griseus* liess einer meiner Bekannten voriges Jahr ausbalgen. Er zahlte für die Haut, welche in seiner Gegenwart nach seiner Angabe abgenommen wurde, 3 fl. Zwei Menschen arbeiteten fünf Tage lang mit dem Ausbalgen, weil es ein sehr mühsames Geschäft ist, das viele Fett von der dicken Haut abzulösen. Die Arseniksalbe kostete ihn 10 fl., und für das Uebrige legte er andere 10 fl. aus. Das ist freilich eine Ausgabe, welche nicht Jeder machen kann. Ein Ichthyolog würde, im Vorbeigehen gesagt, in Spalato gute Beute mschen. Er dürfte sich nur mit den Fischern in Rapport setzen, welche oft die seltensten Fische in ihren Netzen finden. Unsere Fischer sind meistens Puliesen, welche ihr Fach sehr gut verstehen.

Einer andern zoologischen Merkwürdigkeit muss

ich noch erwähnen. Einer meiner Bekannten hatte diesen Sommer von einem hiesigen Schiffer einen jungen Schakal (*Canis aureus*) gekauft. Der Schiffer sagte mir, dass er, als er mit seinem Schiffe in einem Hafen der Insel Curzola im Kreise Ragusa vor Anker lag, deren drei acquirirt habe. Als er einst in der Nacht ein Geräusch hörte, sprang er auf das Schiffdeck und sah bei dem Schimmer des Mondes, wie zwei vom Schiffe entsprungene Schakale dem Lande zu schwammen; denn er hatte sie im Schiffsraum frei herumlaufen lassen, in der Meinung, dass sie noch zu klein wären, um auf die Flucht zu denken. Den übrig gebliebenen dritten hatte mein Freund im dritten Stockwerke seines Hauses in eine Kammer eingesperrt. Da gefiel es der Bestie zur Nachtzeit, wo diese Thiere stets lebendiger sind als bei Tage, das Fenster einzustossen und auf die Gasse zu springen, wo sie todt gefunden wurde. Ein lebendes ausgewachsenes Exemplar hatte vor mehreren Jahren der Kreishauptmann von Ragusa nach Wien gesandt, wo ich es 1832 noch in Schönbrunn gesehen hatte. Ein ausgebalgtes Exemplar hatte ich ebenfalls später meinem in Griechenland verstorbenen Freund Michahelles nach München gesandt. Ersteres erregte unter den Naturforschern der Kaiserstadt grosses Aufsehen, weil es noch immer Zweifler gab, welche das Daseyn der Schakale in Europa und insbesondere auf österreichischem Boden bestritten. Die Schakale haben sich im Kreise Ragusa in mehreren Gegenden ein-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0066-5

gebürgert, und namentlich auf den Inseln Curzola und Giuppana und auf der Halbinsel Sabbioncello, welche Curzola gegenüber liegt.

Schliesslich wiederhole ich, dass ich noch immer bereit bin, Jenen mit aller Bereitwilligkeit zu dienen, welche dalmatische Pflanzen durch mich beziehen wollen. Die Bedingnisse und das Vorräthige sind aus den frühern Anzeigen und Jahresberichten bekannt.

## II. Botanische Notizen.

1. Professor Graham gab in *Edinb. n. phil. Journ.* Jul. — Oct. 1836 ein Verzeichniss von Pflanzen von einer Excursion Anfang Augusts 1835 in der südwestlichen Spitze *Schottlands*, mit Standortangaben: darin unter andern: *Ajuga pyramidalis*, auch auf Orkney; *Alyssum calyc.*, an nur zwei Orten in Schottland; *Artemisia maritima*; *Bartsia viscosa*; *Carex capillaris*, *extensa*, *fulva*; *Carum verticillat.*, an der Westküste hie und da häufig; *Erodium marit.*; *Habenaria chlorantha*; *Heleosciad. nodiflorum* gemein, aber nicht im östlichen Schottland; *Jungermannia Mackaii*; (*Lepid. Smithii* in Berwicksh); *Lamium intermedium*; *Linnæa* bei Edinburg; *Malva moschata*, an der Küste von Galloway *wild*; *Nenuphar pumilum*, *Oenanthe pimpinelloides*, gemein; *Polygonum maritimum*; *Scirpus Savii* häufig; *Silene angl.*, *conica*, *noctifl.*; *Solanum nigrum*, *selten* in Schottland, eingeschleppt; *Specularia hybrida*; *Symphytum offic.* var. fl. fere *nigro*; *Thalictr. alpinum*;

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0067-1

gebürgert, und namentlich auf den Inseln Curzola und Giuppana und auf der Halbinsel Sabbioncello, welche Curzola gegenüber liegt.

Schliesslich wiederhole ich, dass ich noch immer bereit bin, Jenen mit aller Bereitwilligkeit zu dienen, welche dalmatische Pflanzen durch mich beziehen wollen. Die Bedingnisse und das Vorräthige sind aus den frühern Anzeigen und Jahresberichten bekannt.

## II. Botanische Notizen.

1. Professor Graham gab in *Edinb. n. phil. Journ.* Jul. — Oct. 1836 ein Verzeichniss von Pflanzen von einer Excursion Anfang Augusts 1835 in der südwestlichen Spitze *Schottlands*, mit Standortangaben: darin unter andern: *Ajuga pyramidalis*, auch auf Orkney; *Alyssum calyc.*, an nur zwei Orten in Schottland; *Artemisia maritima*; *Bartsia viscosa*; *Carex capillaris*, *extensa*, *fulva*; *Carum verticillat.*, an der Westküste hie und da häufig; *Erodium marit.*; *Habenaria chlorantha*; *Heleosciad. nodiflorum* gemein, aber nicht im östlichen Schottland; *Jungermannia Mackaii*; (*Lepid. Smithii* in Berwicksh); *Lamium intermedium*; *Linnæa* bei Edinburg; *Malva moschata*, an der Küste von Galloway *wild*; *Nenuphar pumilum*, *Oenanthe pimpinelloides*, gemein; *Polygonum maritimum*; *Scirpus Savii* häufig; *Silene angl.*, *conica*, *noctifl.*; *Solanum nigrum*, *selten* in Schottland, eingeschleppt; *Specularia hybrida*; *Symphytum offic.* var. fl. fere *nigro*; *Thalictr. alpinum*;

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0067-1

*Trifol. ornithopodoides; Tritic. loliac.* (*Tulipa sylv.* bei Edinburg. *Viola flavicornis*, um Edinburg häufig).

2. Ueber die Zeit, um welche die Kartoffeln in der Oberpfalz des Königreichs Bayern zu kultiviren angefangen wurden, erzählt die Chronica oder kurze Beschreibung der churfürstlichen Stadt Amberg etc., zusammengebracht durch Mich. Schwaiger, Burgermeister daselbst. Neu herausgegeben und mit Erläuterungen etc. versehen von Felix Joseph Lipowsky. München, 1818. — Erläuterung Nr. 129. S. 129. — — „Diesen" (den Erdäpfelbau) „führte der Stadtpfarrer Joh. Heinrich „Werner, ein geborner Franke, bald nach seiner „Ankunft (1716) zu Amberg ein, und sein Vetter, „Joh. Georg Zinkl, der anfangs Stadtkaplan „zu Amberg gewesen, dann Pfarrer zu Deining „im Jahr 1724 geworden, verbreitete denselben."

Eine Chronik, die der Bauer Andreas Spies zu Eschenfelden von seinem Leben (1699 bis 1781) auf 60 Bogen schrieb (mitgetheilt vom k. Revierförster F. A. Filchner zu Bärnhof 1831) erzählt:

„Zur Zeit 1700 seind die Kraut-Dorschen in „unsserm Land herumb angefangt worden zu Pflan„zen, und bauen, und umb 1730 seind die Erdöbfel „und Erdbiern in ganzen Nordgau auch herumb „aufkommen, und mit grossen Nuzen gebaut wor„den. Ist auch das unnütze und verthunliche (ver„schwenderische) Cave-Sauffen aufkommen, um die „Zeit 1779 seind die bollische Erdäbfel *) bei uns „aufkommen."

*) Eine sehr wuchernde, aber eben so ungesunde Sorte dieser Frucht.

(Hiezu Literber. Nr. 2.)

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06933-0068-7

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1839

Band/Volume: 22

Autor(en)/Author(s): Fresenius Georg

Artikel/Article: Diagnoses generum specierumque norarum in Abyssina a cl. Rüppell detectarum 49-64