Allgemeine
botanische Zeitung.

Nro. 18. Regensburg, am 14. Mai 1837.

I. Original-Abhandlungen.

Musci frondosi Germaniæ ad methodum naturalem dispositi — auctore E. Hampe.

I. Musci frondosi veri.

A. *Hypneae.*

I. *Hookeria Sm.*
1. lucens ej.

II. *Leskea Hedw.*
1. complanata Hedw.
2. trichomanoides ej.
3. attenuata ej.
4. incurvata ej.
+ brachyclados Schwægr.
5. polycarpa Ehrh.
6. paludosa Hedw.
7. exilis Stark.
+ Frœlichii Brid.
8. subenervis Schwgr.
9. subtilis Hedw.
10. polyántha Hedw.
11. pallescens Sm. Hdw.
12. sericea Hedw.

III. *Climacium Web. M.*
1. dendroides eor.

IV. *Hypnum Linn.*

α. *Isothecium Brid.*
1. curvatum Sw.
2. myosuroides L.
3. rufescens Dicks. Sm.
β. chryseon.
4. julaceum Schwægr.
β. apiculatum Hüb.
? Syn. Lesk. julacea Br.

β. *Stereodon et Hypnum Brid.*

a. disticha.
5. undulatum L.
6. sylvaticum L.
7. denticulatum Huds.
+ β. obtusum Wahlb.
8. riparium L.

b. aduncа.
9. pulchellum Dicks.
10. silesiacum P. d. B.
11. badense Braun.
12. cupressiforme L.
+ β. protuberans Br.
γ. fastigiatum Br.
δ. crispatissimum.
ε. filiforme Vill. etc.
13. palustre L.
β. luridum Br.
γ. subsphæricarpon Schwægr.
14. molle Dicks.
β. alpestre Sw.
15. incurvatum Schrad.
16. rugosum Ehrh.
+ plicatum Schl.
17. scorpioides L.
18. lycopodioides Schw.
19. fluitans L.
polycarpon et diffusum Blandow.
20. uncinatum Hedw.
β. callichroum Brid.
21. aduncum L.
β. revolvens Sw.
22. filicinum Hedw.
β. fluviatile Sw.
γ. Vallis clausæ Brid.
23. commutatum Hedw.
β. falcatum Brid.
24. molluscum Hedw.
25. Crista castrensis L.
c. squarrosa.
(conica)
26. stellatum Schreb.
27. chrysophyllum Brid.
28. Halleri. L. fil.
29. dimorphum Brid.
β. tectorum.
30. reflexum Stark.
β. Hookerianum.
31. squarrosum L.
32. loreum L.
33. triquetrum L.
34. brevirostre Ehrh.
(rostrata)
35. longirostre Ehrh.
36. prælongum L.
37. Stokesii Turn.
38. Schleicheri Schwgr.
Syn. abbreviatum Turn.
— curvisetum Brid.
39. strigosum Hoffm.
d. julacea.
40. catenulatum Brid.
41. heteropterum Bruch.
(Pterogonium al.)

e. turgida.
(rostrata.)
42. præcox Hedw.
43. murale Neck.
β. intextum Voit.
+ adnatum Hedw.
44. confertum Dicks.
α. serrulatum Huds.
β. rotundifolium Scop.
γ. megapolitanum W. et M.
45. ruscifolium Neck.
β. lætevirens Angl.
γ. prolixum Dicks.
(conica.)
46. stramineum Dicks.
+ cirrosum Schwægr.
47. trifarium W. et M.
+ sarmentosum Wahlb.
48. purum L.
49. illecebrum L.
50. Schreberi Willd.
+ nemorosum Koch.
51. cuspidatum L.
+ neglectum Schwægr.
52. cordifolium Hedw.
+ contiguum N. ab E.
f. vaga.
(dendroidea.)
53. splendens Hedw.
54. umbratum Ehrh.
55. tamariscinum Hedw.
β. delicatulum.
+ arrhizon Brid.
56. abietinum L.
57. Blandowii W. et M.
58. alopecurum L.
(decumbentia conica.)
59. albicans Neck.
60. lutescens Huds.
61. salebrosum Hoffm.
62. nitens Schreb.
63. populeum Hedw.
β. trachypodium et
γ. petrophilum Fk.
+ bavaricum Voit.
64. plumosum L.
Syn. alpinum Sw.
pseudoplumosum Br.
aquaticum Fk.
65. rutabulum L.
β. flavescens Br.
+ heterophyllum Hüb.
66. Starkii Br.
β. capillaceum ej.
67. velutinum L.
β. sericeum Fk.
γ. intricatum Hedw.
68. Laureri Fk.
69. serpens L.

70. confervoides Schw. (rostrata.)
71. Teesdalii Sm.
72. tenellum Dicks.
73. piliferum L.
β. minus.
Syn. H. Schleich. quor.

V. Anacamptodon Brid.
1. splachnoides ej.

VI. Neckera Hedw.
1. crispa ej.
2. pumila ej.

VII. Cryptopodia Rœhl.
1. pennata ej.

VIII. Cryphœa Brid.
1. heteromalla ej.

IX. Anomodon Hook.
1. repens Fürnr.
2. striatus ej.
3. nervosus ej.
4. cladorrhizans ej.
5. viticulosus Hook.
6. curtipendulus ej.

X. Leptodon Mohr.
1. Smithii ej.

XI. Pterogonium Schwgr.
1. filiforme Schw.
2. gracile ej.

XII. Leucodon Schwægr.
1. sciuroides ej.
+ morensis Schl.

XIII. Fabronia Raddi.
1. pusilla ej.
2. octoblepharis Schw.

B. *Drepanophylleæ.*

XIV. Fissidens Hedw.
1. bryoides Hedw.
β. exilis ej.
γ. osmundioides ej.
2. incurvus W. et. M.
3. taxifolius Hedw.
4. adianthoides ej.
+ Octodiceras Julianum Savi.

XV. Schistostega W. et M.
1. osmundacea eor.

C. *Bryeæ.*

XVI. Mnium Hedw.
1. undulatum ej.
2. cuspidatum ej.
3. affine Bland.
+ rugicum Laur.
4. spinosum Voit.
5. hornum L.
6. rostratum Schwägr.
7. punctatum Hedw.
+ latifolium Schwægr.
8. serratum Hedw.
Syn. Polla orthorhyncha Brid.
9. stellare Hedw.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0296-2

XVII. Bryum Dill.

1. pyriforme Hedw.
2. argenteum L.
   β. julaceum Schrad.
3. Funckii Schwægr.
4. alpinum L.
5. capillare L.
   (obconicum et Ferchelii.)
   + 6. boreale Schw.
7. atropurpureum W. et M.
8. cæspititium L.
   β. cirratum Hornsch.
   γ. subrotundum Brid.
   δ. pohliæforme ej. etc.
9. pallescens Schwægr.
   (intermedium et hybridum.)
10. pallens Hedw.
11. turbinatum Hedw.
    β. Schleicheri Schw.
12. ventricosum Dicks.
    α. bimum Hedw.
    β. pseudotriquetrum ej.
    γ. Duvalii Voit.
13. roseum Schreb.
14. tortifolium Brid.
    (Mnium cyclophyllum Schwægr.

XVIII. Webera Hedw.
(Bryum al.)

1. carnea Bruch. Fürnr.
   + pulchella Bruch. Fürnr.
2. erythrocarpa Hampe.
3. annotina Schwægr.
4. gracilis Bruch.
   (Bryum versicolor Braun.)
5. Wahlenbergii Bruch. Fürnr.
   β. glacialis Br. Fürnr.
6. Ludwigii Br. Fürnr.
   + cucullata Br. Fürnr.
7. cruda Br. Schwægr.
8. elongata Br. Schw.
   (macrocarpa, acuminata, minor.)
9. longicollis Hedw.
   Web. alpina Hornsch.
   — grimsulana Brid.
10. nutans Hedw.
    β. bicolor Hornsch.
    γ. subdenticulata Brid.
    δ. longiseta Brid.
    ε. geniculata.
11. julacea Bruch. Fürnr.
    (Bryum filiforme Dicks.)

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0297-8

XIX. Pohlia Hedw.

1. Zierii Schwægr.
2. demissa Hornsch.
3. imbricata ej.
4. inclinata Sw.
   Syn. paradoxa Hüb.
   β. uliginosa Bruch.
5. longiseta.
6. varnensis Schwægr.
7. lacustris.
8. polymorpha H. et H.
   (Syn. tenella et brachycarpa.)
9. gracilis H. et H.
   β. xanthocarpa.
10. arcuata. eor.
11. curviseta eor.

XX. Paludella Brid.

1. squarrosa ej.

XXI. Aulacomnion Schwægr.

1. palustre ej.
   β. polycephalum.
2. turgidum ej.
3. androgynum ej.

XXII. Timmia Hedw.

1. megapolitana ej.
2. austriaca ej.
   β. bavarica.

XXIII. Meesia Hedw.

1. longiseto Hedw.
   α. tristicha.
   β. hexasticha.
2. uliginosa Hedw.
   β. alpina Fk.
   γ. angustifolia Br.
3. minor Brid.
4. dealbata Sw.

XXIV. Cinclidium Sw.

1. stygium ej.

XXV. Ptychostomum Hornsch.

1. cernuum ej.
2. compactum ej.

XXVI. Mielichhoferia Hornsch. et N. ab E.

2. nitida eor.
2. elongata eor.
   (Oreas Brid.)

D. *Bartramieæ.*

XXVII. Bartramia Hdw.

1. fontana Sw.
   β. falcata.
2. marchica W.
3. Halleriana Hedw.
4. crispa Sw.
5. pomiformis Hedw.
6. ithyphylla Brid.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0298-4

7. Oederi Sw.
8. stricta Brid.

XXVIII. Catascopium Brid.

1. nigritum ej.
2. Martianum Fürnr. (Weissia al.)

XXIX. Conostomum Sw.

1. boreale ej.

E. *Fontinaleæ.*

XXX. Fontinalis L.

1. antipyretica L.
2. squamosa Hedw.

XXXI. Cinclidotus P.d.B.

1. fotinaloides ej.

XXXII. Anœctangium Hedw.

1. aquaticum ej.

F. *Buxbaumieæ.*

XXXIII. Buxbaumia Hall.

1. aphylla L.
β. indusiata Brid.

XXXIV. Diphyscium W. et M.

1. foliosum eor.

G. *Polytricheæ.*

XXV. Polytrichum L.

1. commune L.
2. formosum Hedw.
3. gracile Menz.
4. juniperinum Willd.
5. strictum Menz.
6. septentrionale Sw.
7. piliferum Hedw.
β. Hoppii Hornsch.
8. alpinum L.
9. urnigerum Sw.
10. aloides Hedw.
11. nanum Hedw.
β. subrotundum Menz.

XXXVI. Catharinæa Ehr.

1. Callibryum Ehrh. (undulata Brid.)
2. angustata Brid.
3. hercynica Ehrh.

H. *Orthotricheæ.*

XXXVIII. Orthotrichum Hedw.

1. coarctatum P. d. B. (tortile Bruch.)
2. crispum Hedw.
3. crispulum Hornsch.
β. Ludwigii Schwgr.
4. Hutchinsiæ Sm.
5. rivulare Sm.
6. Lyellii Hook.
7. striatum Hedw.
8. patens Bruch.
β. stramineum ej.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0299-1

9. affine Schrad.
α. fallax Bruch.
β. tenellum ej.
γ. pumilum Sw.
δ. speciosum N. ab E.
10. rupestre Schwægr.
β. Sehlmeyeri Hornsch.
11. obtusifolium Schrad.
β. Rogeri Brid.
12. diaphanum Schrd.
13. anomalum Hedw.
β. Flörkeanum Hornsch.
γ. aureum Mart.
14. cupulatum Hoffm.
β. confertum Bruch.
γ. Sturmii Hornsch.

XXXVIII. Macromitrium Br.

1. Drummondii.
Orthotrichum Dr. al.

XXXIX. Ptychomitrium Fürnr.

1. polyphyllum ej.
2. geniculatum Hampe. (Grimmia geniculata Schr.)

XL. Coscinodon Spr.

1. Persoonii Hampe. (Grimmia cribrosa Pers.)

Notarisia Hampe (Linnæa XI.) (Brachypodium Brid. (Pyramidontium Hampe olim.)

1. italica. Syn. Grimmia glyphomitrioides Bals. et Notar. prodrom. Bryol. Mediolanensis.

XLI. Tetraphis Hedw.

1. Browniana Hook.
β. repanda Fk.
γ. ovata ej.
2. pellucida Hedw.

I. *Zygodonteæ.*

XLII. Zygodon Hook.

1. conoideus ej.
2. virtdissimus Brid.

XLIII. Brachyodus Frnr.

1. trichodes ej.

XLIV. Hymenostylium

1. lapponicum Fürnr.
+ Mougeotii Bruch.

XLV. Harrisonia Adans.

1. Hornschuchiana Spr.
2. cæspititia.
Gymnostum cæspitiur et subulatum Bryol.

3. compacta.
Gymnostom. æstivum Hedw.

K. *Encalypteæ.*

XLVI. Encalypta Hedw.

1. vulgaris ej.
β. lævigata.
2. commutata Bryol. g.
β. microphylla.
3. apophysata Bryol. g.
β. microphylla.
4. rhabdocarpa Schw.
5. ciliata Hedw.
+ cylindrica Fk.
6. streptocarpa Hedw.

L. *Grimmieæ.*

XLVII. Racomitrium Brid.

1. microcarpon ej.
β. obtusum.
2. sudeticum ej.
3. patens Brid.
4. lanuginosum Brid.
5. heterostichum ej.
β. alopecurum Schw.
Syn. fastigiatum Wallr.
6. canescens Brid.
β. ericoides Brid.
7. fasciculare Brid.
8. protensum Braun.
Syn. aquaticum et cataractarum Brid.
9. aciculare Brid.
β. viride.
10. riparium Brid.

XLVIII. Grimmia Hedw.

1. apocarpa Hedw.
β. robusta Brid.
γ. gracilis Schl.
δ. alpicola Sw.
ε. rivularis Brid.
2. maritima Turn.
3. conferta Fk.
+ fusca Bryol.
+ urceolaris Bryol.
4. plagiopus Schwægr.
5. crinita Brid.
6. Donniana Sm.
β. sudetica Spr.
γ. obtusa Schwægr.
δ. alpestris Schleich.
7. ovata W. et M.
β. patens Bryol. germ.
γ. obliqua —
δ. sciuroides —
ε. cylindrica —
8. affinis Bryol. germ.
β. ramosissima —
9. elongata Kaulf.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0301-2

10. atrata Mielichh.
11. elliptica Fk.
(Grimmia commutata Hüb.)
12. leucophæa Grew.
(Dryptodon lævigatus Brid.)
13. funalis Bruch.
β. incurva (Trichostom. Hornsch.)
γ. cæspititium (Dryptodon Brid.)
14. trichophylla Grew.
(Grimmia Schultzii Hüb.)
15. pulvinata Sm.
16. orbicularis Bruch.
(Gr. africana Arnott.)
17. arenaria Hampe.
18. apiculata Hornsch.
19. incurva Schwægr.
(G. cernua Bryol.)
20. uncinata Kaulf.
† torquata Hornsch.
† spiralis Hook.

XLIX. Schistidium Brid.

1. ciliatum ej.
β. imberbe Hook.
2. pulvinatum Brid.

M. *Leucophaneæ.*

L. Leucobryum Hampe.

1. vulgare ej.
Syn. Dicranum glaucum Hedw.

N. *Dicraneæ*
vel Weissieæ.

LI. Didymodon Hedw.

1. homomallus ej.
2. capillaceus ej.
β. distichus Brid.
3. flexicaulis Schw.
4. longirostris W. et M.
5. glaucescens W. et M.
6. trifarius Sw.
β. luridus Hornsch.
7. obscurus Kaulf.

LII. Cynodon Brid.

1. inclinatus ej.
2. latifolius ej.
(huc Dermatodon cernuus Hüb.)

LIII. Ceratodon Brid.

1. purpureus ej.
β. purpurascens.
γ. Celsii.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0302-8

LIV. Dicranum Hedw.

1. scoparium Hedw.
2. majus Turn.
3. congestum Br.
   β. rupestre ej.
   γ. longirostre Schw.
4. undulatum Ehrh.
   + conglomeratum (Oncophorus Brid.)
5. Schraderi W. et M.
6. spurium Hedw.
7. elongatum Schwægr.
8. heteromallum Hedw.
9. subulatum Hedw.
10. varium Hedw.
11. sudeticum Schw.
12. + strictum Schw.
13. longifolium Ehrh.
14. flagellare Hedw.
15. montanum Hedw.
    β. Hostianum Schw.
    + interruptum Brid.
16. flexuosum Hedw.
    β. fragile Angl.
    δ. penicillatum Brid.
    + pyriforme Schultz.
17. longipilum Turn.
    + cirratum Hornsch.
18. polycarpon Ehrh.
19. crispum Hedw.
    β. rufescens ej.
20. Schreberianum Hedw.
21. gracilescens Flörk.
    β. Oncophorus Brid.
22. squarrosum Schrad.
23. pellucidum Hedw.
24. falcatum Schrad.
25. Starkii W. et M.
26. virens Sw.
27. strumiferum Ehr.
28. cerviculatum Hedw.
    β. pusillum ej.
    γ. flavidum Schw.
    + paradoxum Fk. (Trichost. paradox. Hüb. quid?)

LV. Trematodon Reich.

1. ambiguus Schwægr.
   + brevicollis Hornsch.

LIV. Weissia Hedw.

α. dentibus angustis fragilibus.

1. fugax. Hedw.
   β. leptodon Brid.
2. denticulata Brid.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0303-4

3. apiculata Bryol. (mucronulata Bruch.)
4. Rudolphiana Bryol.
5. gymnostomoides.
β. fallax Sehlm.
6. crispula Hedw.
β. falcata Bryol.
7. compacta Schwægr.
β. dentib. solidis sæpe apice vel ad basim fissis. (Afzelia Ehrh.)
8. controversa Hedw.
β. microdus Bryol.
γ. microstoma —
δ. humilis —
9. Schisti Brid.
10. cirrata Hedw.
β. Bruchiana Bryol.
γ. amblyodon Brid.
11. cylindrica Bruch.
12. serrulata Fk.
13. torquescens Brid.
+ procera Bryol.
14. flexuosa Bruch.
15. acuta Hedw.
γ. *calcicolæ*. (fol. rigidis.)
16. calcarea Hedw.
17. tristicha Brid.
β. Seligeri W. et M.
18. pusilla Hedw.
19. recurvata Brid.
20. verticillata Schwægr.
+ zonata Brid.
+ fornicata —

LVII. Hymenostomum R. Br.

1. microstomum R. Br.
β. brachycarpon Bryol.
γ. obliquum. —
2. squarrosum Bruch.
3. rutilans Hedw.
+ subglobosum Bryol.

LXIII. Gymnostomum Hedw.

1. tenue Schrad.
2. calcareum Hornsch.
3. gracillimum Bryol.
4. curvirostrum Ehrh.
β. microcarpa Bryol.
γ. pomiforme —
δ. brevisetum —
5. rupestre Schwægr.
β. stelligerum Sm.
γ. pallidisetum Bryol.
δ. æruginosum —
ε. articulatum —
6. tortile Schwægr.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0304-0

LIX. Astomum.

(Phasca angustifolia perennia.)

(Ph. dieranoidea.)

1. rostratum.
2. crispum.
β. polycarpum.
3. subulatum.
4. palustre.
5. alternifolium.

O. *Funarieæ.*

LX. Funaria Hedw.

1. hygrometrica ej.
β. minor.
2. Mühlenbergii ej.

LXI. Physcomitrium Brd.

1. sphæricum Fürnr.
2. tetragonum ej.
3. fasciculare Brid.
4. + Bonplandii.
5. pyriforme.

LXII. Ephemerum.

(Phasca annua funarioidea. Calyptra campanulata grandis latere semel fissa folia plerumque serrata grandicellulosa.)

1. patens Hedw.
β. megapolitanum Schultz.
2. pachycarpon Schw. Syn. recurvifol. Dicks.
3. muticum Schreb.
4. nitidum Hedw.
β. Prochnowianum Fk.
5. cohærens Hedw.
β. Lucasianum Bryol.
γ. Flotowianum Fk.
6. crassinervium Schw.
β. stenophyllum Voit.
7. serratum Hedw.
β. angustifolium.
γ. tenerum Bruch.

P. *Splachneæ.*

LXIII. Splachnum L.

1. ampullaceum L.
2. sphæricum L.
β. gracile Schwægr.
3. tenue Dicks.
β. serratum Hedw.
γ. flagellare Brid.
4. angustatum Sw.
5. mnioides L. fil.
β. Brewerianum Hdw.
6. urceolatum Hedw.

LXIV. Dissodon Grev. Arn.

1. Frœlichianus eor. (Splachnum al.)

LXV. Systylium Hornsch.

1. splachnoides ej.

LXVI. Eremodon Brid.
1. Rudolphianus Hrnsch.
2. splachnoides Brid.
LXVII. Tayloria Hook.
1. splachnoides ej.
LXVIII. Bruchia Schw.
1. vogesiaca ej.
LXIX. Voitia Hornsch.
1. nivalis ej.
Q. *Desmatodonteæ.*
LXX. Trichostomum Hd.
1. nervosum Bruch.
2. piliferum Sm.
3. latifolium Schwægr.
β. Laureri.
γ. glaciale.
4. viridulum Bruch.
5. rigidulum ej.
(Didymodon al.)
Syn. Desmatodon rupestris Fk.
6. Barbula Schwægr.
LXXI. Anacalypta Rœhl.
1. latifolia Bruch.
β. pilifera.
2. Starkeana ej.
3. affinis ej.
4. cæspitosa ej.
5. lanceolata Rœhl.
β. conata.
6. tophacea Bruch.
7. recurvirostra ej.
LXXII. Tortula Sw.
1. rigida Sw.
2. brevirostris Hook.
3. aloides Bruch.
LXXIII. Barbula Hedw.
1. muralis Timm.
β. æstiva Schultz.
2. membranifolia Schltz.
3. unguiculata Hedw.
(var. numerosæ.)
4. Dicksoniana Schltz.
5. obtusifolia Schw.
7. revoluta Mohr.
β. Hornschuchiana Schultz.
8. convoluta Hedw.
9. paludosa Schwægr.
β. Funkiana Schultz.
10. fallax Hedw.
β. vinealis Br.
γ. gracilis Schwægr.
δ. brevicaulis ej.
11. inclinata Schwægr.
12. tortuosa ej.
LXXIV. Syntrichia Hdw.
1. subulata Hedw.
Syn. Barbula hercynica Brid.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0306-2

2. mucronifolia Schwgr.
3. ruralis Hedw.
β. lævipila Brid.
γ. latifolia ej.

LXXV. Pottia Ehrh.

1. Heimii Fürnr.
β. affinis.
γ. Systylium.
2. eustoma Ehrh.
β. truncata.
3. minutula Frnr.
β. rufescens.
γ. conica.
4. cavifolia Ehrh.
5. acaulis Frnr.

(Gymnostoma latifolia.)

LXXVI. Phascum.

1. bryoides Dicks.
2. rectum With. Sm.
3. curvicollum Ehrh.
4. cuspidatum Schr.
β. piliferum ej.
γ. affine Bryol.
δ. elatum Brid.
ε. curvisetum Brid.
5. carniolicum Fl.
6. Flörkeanum W. et M.
β. badium Voit.

II. Musci frondosi spurii.

A. *Cladocarpi.*

LXXVII. Archidium Brd.

1. phascoides ej.

LXXVIII. Sphagnum Dll

1. cymbifolium Dill.
β. minus Hook.
Syn. compactum Brid.
2. rigidum Bryol. germ.
β. immersum
3. molluscum Bruch.
4. squarrosum Pers.
β. tenellum ej.
5. subsecundum Nees.
β. rufescens Schultz.
6. acutifolium Ehrh.
β. capillifolium.
7. cuspidatum Ehrh.
β. plumosum.
γ. hypnoides.

B. *Schistocarpi.*

LXXIX. Andreæa Ehrh.

1. petrophila ej.
2. Rothii W. et M. (alpina et rupestris auct.)
3. nivalis β. Hook. Syn. A. Grimsulana Br.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0307-8

II. Notizen zur Zeitgeschichte.

Hr. Dr. Graf in Laybach wurde von der medicinisch-botanischen Gesellschaft in London zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt.

Der durch mehrere pomologische Abhandlungen rühmlichst bekannte Hr. Apotheker Liegel in Braunau hat von der philosophischen Fakultät der Universität in München die Doctorwürde erhalten.

Se. Majestät der König von Preussen haben dem Universitätsgärtner Dr. Dietrich zu Jena die grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft zu ertheilen geruht.

Der Botaniker Dr. Thornton zu London ist am 21. Januar an einer langwierigen schmerzvollen Krankheit gestorben.

Am 24. Januar starb daselbst der Stifter der Horticultural-Society, Joseph Sabine.

Der als botanischer und geognostischer Schriftsteller, besonders durch seine Untersuchungen über die Venetianischen Provinzen vortheilhaft bekannte Graf Giuseppe Marzari Pencati, geb. 1779 zu Vicenza, ist am 30. Juni 1836 gestorben.

Hr. Dr. Med. Schrader aus Hildesheim wird binnen Kurzem eine Reise in die südwestlichen Staaten Nordamerika's antreten, um daselbst naturhistorische Gegenstände zu sammeln. Freunde der Naturkunde in Deutschland, welche an deren Ausbeute Theil nehmen wollen, könnnen durch Vermittlung des Hrn. Dr. Bergmann in Hildesheim Aktien à 6 Thaler erhalten.

(Hiezu Beiblatt 5.)

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06929-0308-4

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1837

Band/Volume: 20

Autor(en)/Author(s): Hampe Georg Ernst Ludwig

Artikel/Article: Musci frondosi Germaniae ad methodum naturalem dispositi 273-288