Allgemeine
botanische Zeitung.

Nro. 27. Regensburg, am 21. Juli 1836.

I. Original-Abhandlungen.

Botanische Beobachtungen von Hrn. Prof. J. F. Tausch in Prag. (Schluss.)

48. *Corydalis lutea Sieb.* herb. fl. austr., um Montfalcone gesammelt, scheint eine von *C. lutea Pers. Koch* in Sturm fl. germ. c. ic. verschiedene Art zu seyn, und verdient wenigstens bis zu ihrer genaueren Kenntniss als var. β. *polita* bezeichnet zu werden, indem deren Blätter auf beiden Seiten grün und glänzend, und nicht unten grau-grün sind, und deren Schoten, wenigstens die unreifen, 4mal kürzer sind, als die Blumenstielchen.

49. *Cistus laurifolius L.* Unter diesem Namen kommen 2 verschiedene Arten vor, als:

C. laurifoliis (L. spec. 736 c. syn. opt.) foliis petiolatis ovato-ellipticis lanceolatisve utrinque acutis 3-nerviis supra lævissimis subtus tomentosis, petiolis basi connatis, pedunculis terminalibus sub-3-floris, calycibus obtusis, stigmate globoso-depresso sessili. Colitur in hortis Pragens. Calyx 3-phyllus obtusus pilis stellatis tomentosus. Petala alba basi lutea. Germen magnum subglobosum holosericeum.

C. floribundus Tausch: foliis petiolatis lato-ova-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0039-3

tis acuminatis 3-nerviis supra lævissimis subtus tomentosis, petiolis basi connatis, pedunculis terminalibus elongatis multifloris, floribus verticillato-umbellatis, calycibus cuspidatis, stigmate parvo capitato brevissime stipitato. Ex Gallia attulit Sieber, an vero spontanea? an culta? Petala ut videtur ex sicco alba basi immaculata. Germen globosum albo-villosum.

50. Cistus grandiflorus Tausch: foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis nudis viscosis 3-nerviis petiolatis, petiolis villosis basi dilatatis, pedunculis terminalibus longissimis 2-floris, pedicellis calycibusque ovatis obtusis villosis, stigmate depresso-capitato sessili.

Nomine *C. longifolii Lam.* in hortis occurrit, cujus diagnosi nullo modo convenit. Calycis structura involuta, licet 5-sepala, multum accedit ad *C. laurifolium*, quocum et in hoc convenit, quod calyx præter villos adhuc pilis stellatis brevibus tectus sit. Petala alba.

51. Cistus viscosissimus Tausch: foliis petiolatis oblongo-lanceolatis 3-plinerviis rugosis viscosis margine revolutis, junioribus subvillosis, pedunculis terminali-axillaribus folio longioribus 3-floris calycibusque cordato-angulatis hirsutis, stigmate capitato sessili.

Petala alba. Germen pilis stellatis canescens. In hortis nomine *C. purpurei β. albiflori* occurrit, quocum vix nisi genericam affinitatem habet. *C.*

monspeliensi L. quidquam accedit, qui vero jam foliis sessilibus 3-nerviis differt.

52. Cistus capensis L. wird in Cand. prodr. fälschlich mit *C. laxus Ait.* verbunden, indem *C. laxus Ait,* dem *C. hirsutus Lam.* so verwandt ist, dass man ihn auch *C. hirsutus β. undulatus* nennen könnte, indem er sich von *C. hirsutus* durch nichts als längere nud wellenförmige Blätter unterscheidet. Man zieht aber in Gärten nicht selten eine Art nnter dem Namen des *C. populifolii*, die der Linnéischen Diagnose von *C. capensis* ziemlich nahe kommt, und die man demnach auch dafür gelten lassen kann, als *C. capensis L.* spec. 736: foliis petiolatis ovato-lanceolatis 3-plinerviis margine sæpe denticulatis utrinque nudis, facie lævigatis, pedunculis terminali-axillaribus aggregatis longissimis multibracteatis multifloris, pedicellis calycibusque cordato-angulatis villosis, stigmate capitato sessili. Corolla alba, in sicco flava.

53. Acacia lunata Sieb. Cand. prodr. Wenn man die von Sieber flor. Nov. Holl. n. 461 ausgegebene Pflanze zur Hauptnorm annimmt, so ist die in hiesigen Gärten gezogene *A. lunata* eine davon verschiedene Art, als *A. falcinella Tausch:* phyllodiis glabris lanceolatis falcatis utrinque acuminatis mucrone hamato terminatis 1-nerviis penniveniis margine versus basim 1-glandulosis, capitulorum racemis phyllodia subæquantibus, ramulisque glabris laxis.

A. lunata Sieb. phyllodiis glabris lanceolatis

subfalcatis obtusissimis mucrone calloso terminatis, basi sensim attenuatis et margine 1-glandulosis 1-nerviis vix penniveniis coriaceis, capitulorum racemis phyllodia subæquantibus, ramulisque glabris strictis.

54. Acacia spathulata Tausch: phyllodiis obovato-oblongis obtusissimis mucrone obliquo terminatis basi longe attenuatis 4-nerviis ceterum multinerviis, spicis axillaribus 2—3, ovario albo-lanato, leguminibus rectis.

In hortis sub varietatibus *A. longifoliæ* occurrit, a qua differt phyllodiis latissimis obtusissimis margine versus basim obsolete glandulosis, spicis magis aggregatis pallidissimis, nec aureis, germinibus niveo-lanatis; ab *A. Sophora* non absimili differt phyllodiis longioribus, basi longius attenuatis et subdimidiatis, leguminibus rectis.

55. Acacia crassiuscula Wendl. Hort. ist von *A. crassiuscula Sieb.* herb. fl. Nov. Holl. n. 464 verschieden, und letztere als *A. Sieberiana* zu scheiden.

56. Psoralea spicata L. Unter diesem Namen kommen in Gärten 2 Arten vor, wovon die eine im Hort. Kewensis gebaute mit der Diagnose in Cand. prodr. vollkommen übereinstimmt, die andere aber sehr verschieden ist und der *P. bracteata L.* am nächsten steht, als: *P. parviflora Tausch:* foliis 3-foliolatis, foliolis obovato-cuneiformibus adunco-mucronatis minutissime punctato-pellucidis glabriusculis, ramulis junioribus sericeis, capitulis terminalibus oblongis densissimis bracteatis, calycibus co-

rollam subexcedentibus. Nomine *P. spicatæ* jam pridem in hort. Prag. exstabat, nuperrime quoque e seminibus ab Eklonio nomine *P. argenteæ* communicatis enata est.

57. *Gladiolus marmoratus Tausch:* spica secunda imbricata multiflora, spathis flores æquantibus, corollæ ringentis (punctatissimæ) laciniis obtusis: 3 superioribus æqualibus erectis, inferiore media lateralibus majori, foliis ensiformibus abbreviatis.

Habitat ad Caput bon. spei, unde bulbus a D. Eklonio allatus in horto Exc. com. Salm hoc autumno fructificavit.

Scapus simplex 1½ pedalis foliosus. Folia ensiformia margine diaphano scabriusculo cincta. Spica sub 10-flora imbricata densa. Spatha exterior cujuslibet floris lato-lanceolata carinata 2″ longa herbacea corollam subexcedens. Corolla alba, sed tota punctis subtilissimis confertissimis purpureis adspersa, laciniæ corollæ inferiores præterquam a basi versus apicem macula subrhomboidea ex albo-flavescente insignitæ. Stamina 3 adscendentia. Stylus filiformis stigmate 3-fido, stamina subadæquante. Toto habitu *G. psittacino* proximus.

58. *Gladiolus flabellifer Tausch;* scapo sub-2-stachyo, spica disticha imbricata multiflora, spathis tubum corollæ vix æquantibus, corollæ ringentis laciniis obtusis retuso-mucronulatis: 3 superioribus æqualibus, inferiore media lateralibus majore superiores adæquante, foliis lato-ensiformibus nervosis marginatis.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0043-1

Gladiolus floribundus Hort. Holland. (non Jacq.)

Spathæ angustissimæ, angustissimum corollæ tubum æquantes. Corolla pro genere major pallidissime incarnata unicolor, laciniis 3 inferioribus macula lineari-lanceolata purpurea pictis.

59. Crinum odoratissimum Tausch: bulbo cylindrico, foliis loriformibus lato-lanceolatis margine denticulatis, umbella sessili multiflora, laciniis limbi lato-lanceolatis tubo brevioribus, stylo staminibus declinatis breviore.

Colitur in hortis Pragens. sub *C. erubescente*, a quo differt magnitudine majori in omnibus, laciniis limbi lato-lanceolatis, nec lineari-lanceolatis, stylo staminibus breviore.

60. Crinum inodorum Tausch: bulbo pyramidato, foliis loriformibus lato-lanceolatis margine denticulatis, umbella multiflora sessili, laciniis limbi linearibus tubo brevioribus, staminibusque stylo longioribus erectis.

Nomine *C. americani* colitur in hort. Pragens.

Scapus compressus una cum spatha 2-phylla subæquali membranacea purpurascens. Umbella 9—10-flora. Corolla alba inodora, laciniis limbi linearibus canaliculatis stamina excedentibus erectis, imo et fructificatione peracta erectæ manent. Tubus corollæ obtuse 3-gonus, basi subpurpurascens, laciniis limbi 1 et dimidio fere longior. Stamina erecta stylo longiora.

61. Luzula maxima Cand. Unter diesem Namen hat man bisher 2 Arten vermischt, als:

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0044-7

L. maxima Cand. Host gram. 3, t. 98 opt.: foliis lato-lanceolatis margine pilosis, cyma suprade-composita bractea foliacea multo longiore, pedicellis ultimis glomerato-sub-3-floris, perianthii laciniis oblongis acuminatis capsulam æquantibus.

L. Sieberi Tausch: foliis lineari-lanceolatis margine pilosis, cyma decomposita bractea lineari multo longiore, pedicellis divaricatis glomerato-sub-3-floris, perianthii laciniis ovatis mucronatis capsula brevioribus.

J. maximus β. angustifolius Sieb. herb. fl. Austr.

L. maxima Reichenb. fl. exc. scheint der Diagnose nach hieher zu gehören, wie aber der *J. nemorosus Host.* (campestris L.) dazu gezogen werden konnte, ist unbegreiflich.

62. Potamogeton setaceus L. Unter diesem Namen gab ich in meinem Herbario Fl. Boh. universali eine Pflanze aus, die diesen Namen wahrhaft verdient, und denselben auch behalten könnte, da *P. setaceus L.* von den neueren Autoren gänzlich ausgelassen wird und höchstwahrscheinlich nur *P. densus β. angustifolius* seyn dürfte, indess, um allen Collisionen auszuweichen, finde ich es rathsamer diesen Namen abzuändern, als

P. condylocarpus Tausch: foliis lineari-setaceis 1-nerviis basi stipulatis, spica pauciflora, fructibus verrucoso-3-carinatis. Habitat in fossis stagnantibus Bohemiæ.

63. Pothos acaulis Jacq. Unter diesem Namen

werden in Prager Gärten drei verschiedene Arten gezogen, als:

P. acaulis Jacq. am. t. 153. Linn. spec. 1675: acaulis, foliis strictis spathulato-lanceolatis basi obtusis et subcarinatis brevissime petiolatis penniveniis subtus reticulatis, scapo tereti, spadice cylindrico longissimo spatham lanceolatam multo excedente. Hæc species e hortis Dresdensibus allata est, et iconi Jacquini exacte respondet. Petioli teretes 1 — 1½″ longi. Folia exsiccatione utrinque elevato-reticulata fiunt, uti in insequentibus.

P. brachypodus Tausch: acaulis, foliis strictis obovato-oblongis spathulatis basi obtusis brevissime petiolatis penniveniis, venis erecto-excurrentibus remotis, scapo tereti, spadice cylindrico gracili (violaceo) spatha lanceolata recta marginibus involuta quidquam longiore. Nomine *P. acaulis* e horto Berolinensi venit, similemque (sed misere exsiccatum) spontaneum e Martinica habeo a Siebero. Quoad folia ampla spadix parvus triplo fere brevior ac in antecedente.

P. longifolius Tausch: acaulis, foliis oblongo-spathulatis basi longe attenuatis et acuminatis petiolatis penniveniis subbullatis splendentibus subtus reticulatis, petiolis (spithamæis) subtus teretibus levissime 2-lineatis, scapo tereti, spadice cylindrico elongato spatha lanceolata longiore. Nomine *P. acaulis* a longinquo in hort. bot. Prag. exstat. Folia 3 — 4′ longa, apice plus minusve reclinata, minime stricta. Toto habitu ad *P. crassinervium* maxime accedit.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0046-9

64. Pothos Scolopendrium Hort. wird in Sprengel's syst. als Synonym zu *P. acaulis Jacq.* gezogen. Ich habe davon nur getrocknete Blätter gesehen, und muss denselben trotz seiner nächsten Verwandtschaft zu *P. acaulis* dennoch für spezifisch verschieden halten, indem die Blätter desselben exacte lanceolata, utrinque acuminata, margine remote undata, et ut videtur minime stricta sind, und die Blattvenen eine weit mehr aufsteigende Richtung beobachten.

65. Pothos oblongifolius Hort. Auch unter diesem Namen kommen 2 verschiedene Arten vor, als

P. oblongifolius: caule repente, foliis longe petiolatis oblongis 3-nerviis parallele venosis, nervo medio utrinque obtuso, lateralibus margini approximatis, petiolis supra sulcatis, ceterum exacte teretibus, scapo tereti, spadice cylindrico spatham lanceolatam subæquante.

P. erythrurus Tausch: caule repente, foliis longe petiolatis oblongis 3-nerviis parallele venosis, nervo medio utrinque acuto, lateralibus margini approximatis, petiolis acutangulatis, scapo apice subangulato, spadice cylindrico spatha lanceolata basi colorata quidquam longiore. Præter characteres indicatos antecedente multo minor in omnibus.

66. Cyperus procerus Rottb. t. 5. fig. 3. Diese Art brachte Sieber mit *C. Monti L.* vermengt, und wahrscheinlich von dem österreichischen Litorale bei Aquilegia, und ich will hier um so mehr,

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0047-4

da diese als eine zur deutschen Flora gehörige Art gewiss eine grössere Theilnahme finden dürfte, jene Botaniker darauf aufmerksam machen, die Gelegenheit haben in jenen Gegenden nachzusuchen, und diesen Standort zu bewähren. *C. procerus* sieht allerdings dem *C. Monti* sehr ähnlich, unterscheidet sich aber schon durch den culmus trigonus, nicht acutissime triqueter, durch die umbella magis composita, radiis nonnullis longissimis magis compositis, und durch die umbellæ partiales involucellatæ, nicht subnudæ. In Sprengel's syst. wird diese Art durch grundfalsche Synonyme ganz entstellt, und man findet sogar den *C. elongatus Sieb.* herb. ægypt., der sich schon durch den culmus teres sektionsweise unterscheidet, dazu gezogen.

67. *Osmunda regalis L.* flor. dan. t. 217 bon. Diese nördliche Pflanze scheint mir von der im südlichen Europa wachsenden spezifisch verschieden, und ich nenne letztere *O. Plumieri* (Plum. fil. 35, t. B, fig. 4): fronde bipinnata apice fructificante, pinnulis lineari-lanceolatis elongatis basi subcordato-obliquis dense serrulatis, panicula terminali fructificante contracta. Specimina mea lecta sunt in Corsica.

Pinnæ sub 13-jugæ cum impari, pinnulis angustis valde elongatis, venis tenuioribus et valde confertis, et hinc etiam densissime serrulatis. Ceterum pinnæ et pinnulæ oppositæ aut alternæ uti in *O. regali*, et priores sæpe remotissimæ.

68. *Pteris aquilina L.* Von dieser gemeinen

Pflanze gibt es 2 Hauptformen, welche, wenn sie nicht getrennt werden, die von den neuesten Systematikern derselben ertheilten Diagnosen ungültig und zu Schanden machen, und worin ich eben einen tüchtigen Grund zur Trennung derselben gefunden zu haben glaube, als

P. aquilina: fronde 3-partita, partitionibus triangularibus patentibus sub-3-plicatopinnatis, pinnulis lanceolatis subfalcatis basi subconfluentibus, stipite elongato.

Filix fœmina. Fuchs hist. 596 (icon unica et verissima habitum totum exprimens inter omnes a Willdenowio spec. pl. 5, p. 402 recensitas).

P. brevipes Tausch herb. Fl. Boh. univ.: fronde oblonga 3-plicato-pinnata stipite multoties longiore, pinnis oblongis erectis 2-pinnatis sessilibus basi auriculato-decussantibus, pinnulis ovatis discretis.

Simillima habitu *P. aquilinæ*, sed notis pluribus facillime discernenda, nempe stipite brevissimo, nec frondem subadæquante, fronde teneriore, pinnis oblongis arrectis, æqualiter magisque distantibus, sessilibus, basi auriculato-decussantibus, nec 3-angularibus, et infimis valde remotis patentibus petiolatis nudis, pinnulis brevibus ovatis a basi ipsa discretis remotisque, nec lanceolato-falcatis basi subconfluentibus.

II. Gesellschafts-Versammlungen.

Sitzung der königl. botanischen Gesellschaft am 11. Mai.

Dr. Fürnrohr legt im Auftrage des Verfas-

Pflanze gibt es 2 Hauptformen, welche, wenn sie nicht getrennt werden, die von den neuesten Systematikern derselben ertheilten Diagnosen ungültig und zu Schanden machen, und worin ich eben einen tüchtigen Grund zur Trennung derselben gefunden zu haben glaube, als

P. aquilina: fronde 3-partita, partitionibus triangularibus patentibus sub-3-plicatopinnatis, pinnulis lanceolatis subfalcatis basi subconfluentibus, stipite elongato.

Filix fœmina. Fuchs hist. 596 (icon unica et verissima habitum totum exprimens inter omnes a Willdenowio spec. pl. 5, p. 402 recensitas).

P. brevipes Tausch herb. Fl. Boh. univ.: fronde oblonga 3-plicato-pinnata stipite multoties longiore, pinnis oblongis erectis 2-pinnatis sessilibus basi auriculato-decussantibus, pinnulis ovatis discretis.

Simillima habitu *P. aquilinæ*, sed notis pluribus facillime discernenda, nempe stipite brevissimo, nec frondem subadæquante, fronde teneriore, pinnis oblongis arrectis, æqualiter magisque distantibus, sessilibus, basi auriculato-decussantibus, nec 3-angularibus, et infimis valde remotis patentibus petiolatis nudis, pinnulis brevibus ovatis a basi ipsa discretis remotisque, nec lanceolato-falcatis basi subconfluentibus.

II. Gesellschafts-Versammlungen.

Sitzung der königl. botanischen Gesellschaft am 11. Mai.

Dr. Fürnrohr legt im Auftrage des Verfas-

sers ein Prachtexemplar der Schrift: Beiträge zur Pflanzengeographie von Oswald Heer, Zürich 1835, vor, und macht dabei auf die wesentlichen Verbesserungen aufmerksam, welche der Verf. in der genaueren Bestimmung der Standorte und der jeder Lokalität eigenthümlichen Vegeation anzubringen versucht hat.

Ebenso gewährt das von Hrn. Prof. Nees v. Esenbeck in Bonn übersandte 10te Heft seiner Genera plantarum Floræ germanicæ die angenehme Hoffnung, dieses dem Bedürfnisse der Zeit und den Anforderungen der Wissenschaft gleich zusagende Unternehmen rasch gefördert zu sehen.

Hr. Apotheker Funck in Gefrees überschickt das 39ste Heft seiner kryptogamischen Gewächse, besonders des Fichtelgebirgs und ein Exemplar des *Octodiceras Julianum*, welches Hr. Noellner, ein junger Pharmaceut aus Darmstadt, vor Kurzem in der sächsischen Schweiz als Beitrag zur deutschen Flora entdeckt hat.

Dessgleichen sendet Hr. Pfarrer Schönheit in Singen eine Parthie seltener norddeutscher Pflanzen, die von Mitgliedern des unter seiner Direction stehenden botanischen Tauschvereins gesammelt worden, und Hr. Dr. Suffrian in Dortmund die seltneren, in seiner Gegend vorkommenden Gewächse als willkommene Beiträge für das Herbarium der Gesellschaft.

Von dem würtembergischen Reiseverein ist als treffender Actienantheil die erste Centurie arabi-

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0050-0

scher Pflanzen von der Reise des Hrn. Dr. Schimper eingegangen. Die Schönheit und Vollständigkeit der Exemplare findet, in Betracht der vielen Schwierigkeiten, mit denen der Botaniker in jenen Gegenden zu kämpfen hat, allgemeine Anerkennung.

Als correspondirende Mitglieder werden vorgeschlagen und aufgenommen:

Hr. Dr. Oswald Heer, Professor in Zürich.
„ Dr. Suffrian in Dortmund.

Sitzung der königl. botanischen Gesellschaft am 8. Juni 1836.

Als eingegangene Beiträge für die Bibliothek werden vorgelegt:

1) Nova Acta physico-medica Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ naturæ curiosorum. Tom. XVII. p. II. Vratislaviæ et Bonnæ 1835.
2) Dr. J. E. Herberger, systematisch-tabellarische Uebersicht der chemischen Gebilde organischen Ursprungs mit genauer Angabe der Eigenschaften im Zustande der Einfachheit, und in jenem der Verbindung mit andern Körpern. Erste Lieferung. Die electropositiven organisch-chemischen Gebilde. 1831. Zweite Lieferung. Die elektronegativen organisch-chemischen Gebilde. Nürnberg 1836.
3) Dr. A. Zawadzki, Flora der Stadt Lemberg, oder Beschreibung der um Lemberg wildwachsenden Pflanzen, nach ihrer Blüthezeit geordnet. Lemberg 1836.
4) Dr. C. Griesselich, kleine botanische Schriften. I. Theil. Carlsruhe 1836.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0051-5

scher Pflanzen von der Reise des Hrn. Dr. Schimper eingegangen. Die Schönheit und Vollständigkeit der Exemplare findet, in Betracht der vielen Schwierigkeiten, mit denen der Botaniker in jenen Gegenden zu kämpfen hat, allgemeine Anerkennung.

Als correspondirende Mitglieder werden vorgeschlagen und aufgenommen:

Hr. Dr. Oswald Heer, Professor in Zürich.
„ Dr. Suffrian in Dortmund.

Sitzung der königl. botanischen Gesellschaft am 8. Juni 1836.

Als eingegangene Beiträge für die Bibliothek werden vorgelegt:

1) Nova Acta physico-medica Academiæ Cæsareæ Leopoldino-Carolinæ naturæ curiosorum. Tom. XVII. p. II. Vratislaviæ et Bonnæ 1835.
2) Dr. J. E. Herberger, systematisch-tabellarische Uebersicht der chemischen Gebilde organischen Ursprungs mit genauer Angabe der Eigenschaften im Zustande der Einfachheit, und in jenem der Verbindung mit andern Körpern. Erste Lieferung. Die electropositiven organisch-chemischen Gebilde. 1831. Zweite Lieferung. Die elektronegativen organisch-chemischen Gebilde. Nürnberg 1836.
3) Dr. A. Zawadzki, Flora der Stadt Lemberg, oder Beschreibung der um Lemberg wildwachsenden Pflanzen, nach ihrer Blüthezeit geordnet. Lemberg 1836.
4) Dr. C. Griesselich, kleine botanische Schriften. I. Theil. Carlsruhe 1836.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0051-5

5) Dr. W. R. Weitenweber, Beiträge zur gesammten Natur- und Heilwissenschaft. Erstes Heft. Prag 1836.

6) F. S. Iser, dissertatio circa Phytotoxicologiam e plantis venenatis Bohemiæ indigenis Papaveraceas exhibentem. Pragæ 1834.

7) J. Frisch, dissertatio de Colchicacearum virtute medica. Pragæ 1835.

8) A. Tausch, dissertatio de inflorescentia. Pragæ 1835.

9) C. T. Beilschmied, Jahresbericht der königl. schwedischen Akademie der Wissenschaften über die Fortschritte der Botanik im Jahre 1828. Breslau 1835.

10) G. Moretti Guido allo studio della fisiologia vegetabile e della Botanica. Fasc. I. et II. Pavia 1835.

11) Ejusd., il Botanico italiano ossia discussioni sulla Flora italica Nr. I. II, III. Pavia 1826.

Das Herbarium erhält als Zuwachs:

1) S. Garovaglio, i Muschi dell' Austria inferiore. Dec. I.—III. Auch unter dem Titel: die Laubmoose von Unter-Oestreich. Milano.

2) Ejusd., i Muschi rari della Provincia di Como, auch unter dem Titel: die seltensten Laubmoose der Provinz Como. Dec I.—III. Milano.

Der botanische Garten erhält von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg eine reichhaltige Sendung seltener Sämereien.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0052-1

Zu correspondirenden Mitgliedern werden aufgenommen:

Hr. Dr. Garovaglio, Assistent der botanischen Lehranstalt an der Hochschule zu Pavia.

Hr. Dr. Herberger, Apotheker in Rheinzabern.

„ „ Zawadzki, Professor an der Lehranstalt für den Regular-Klerus in Lemberg.

Sitzung der königl. Gesellschaft am 13. Juli.

Für die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen:

1) Aorsberättelser om Vetenskapernas Framsteg, afgifne af Kongl. Vetenkaps-Academiens embetsmän d. 31. Mars 1834. Stockholm 1834.

2) Kongl. Vetenskaps - Academiens Handlingar, för aor. 1834. Stockholm 1835.

3) Dr. F. G. Dietrich, neuer Nachtrag zum vollständigen Lexikon der Gärtnerei und Botanik. Fünfter Band. Ulm 1836.

4) E. Poeppig et St. Endlicher, nova genera ac species plantarum. Tom. I. Dec. I. — X. Lipsiæ 1835.

5) Dr. Hugo Mohl, über die Verbindung der Pflanzenzellen unter einander. Tüb. 1835.

6) Derselbe, Untersuchungen über die Entwicklung des Korkes und der Borke auf der Rinde der baumartigen Dicotyledonen. Tüb. 1836.

7) Derselbe, Untersuchungen über die Lenticellen. Tübingen 1836.

8) E. H. F. Meyer, Commentariorum de plantis Africæ australioris, quas collegit J. F. Drege, Vol. I. Fasc. I. Lipsiæ 1835.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0053-7

Zu correspondirenden Mitgliedern werden aufgenommen:

Hr. Dr. Garovaglio, Assistent der botanischen Lehranstalt an der Hochschule zu Pavia.

Hr. Dr. Herberger, Apotheker in Rheinzabern.

„ „ Zawadzki, Professor an der Lehranstalt für den Regular-Klerus in Lemberg.

Sitzung der königl. Gesellschaft am 13. Juli.

Für die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen:

1) Aorsberättelser om Vetenskapernas Framsteg, afgifne af Kongl. Vetenkaps-Academiens embetsmän d. 31. Mars 1834. Stockholm 1834.

2) Kongl. Vetenskaps - Academiens Handlingar, för aor. 1834. Stockholm 1835.

3) Dr. F. G. Dietrich, neuer Nachtrag zum vollständigen Lexikon der Gärtnerei und Botanik. Fünfter Band. Ulm 1836.

4) E. Poeppig et St. Endlicher, nova genera ac species plantarum. Tom. I. Dec. I. — X. Lipsiæ 1835.

5) Dr. Hugo Mohl, über die Verbindung der Pflanzenzellen unter einander. Tüb. 1835.

6) Derselbe, Untersuchungen über die Entwicklung des Korkes und der Borke auf der Rinde der baumartigen Dicotyledonen. Tüb. 1836.

7) Derselbe, Untersuchungen über die Lenticellen. Tübingen 1836.

8) E. H. F. Meyer, Commentariorum de plantis Africæ australioris, quas collegit J. F. Drege, Vol. I. Fasc. I. Lipsiæ 1835.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0053-7

Für das Herbarium sendet:

1) Hr. Apoth. Grabowski in Oppeln: eine Auswahl vorzüglich seltner schlesischer Gewächse.

2) Hr. Dr. E. Frivaldszky in Pesth: 1½ Centurie seltner Pflanzen aus der europäischen Türkei.

Den botanischen Garten bereichert Hr. Ruppprecht in Wien mit Stecklingen sämmtlicher von ihm cultivirter Varietäten des *Chrysanthem. indicum.*

Die königl. Gesellschaft sieht sich wiederholt in dem angenehmen Fall, für diese zahlreichen und grösstentheils sehr werthvollen Geschenke ihren auswärtigen Freunden und Correspondenten den innigsten Dank hiemit öffentlich auszudrücken.

III. Botanische Notizen.

So eben am Schlusse dieses Blattes erhalten wir folgende interessante Mittheilung des Hrn. Prof. Göppert, die wir um so schneller mittheilen zu müssen glauben, als sie durch eine unerklärliche Verspätung erst jetzt in unsere Hände gelangt ist.

„Dem Unterzeichneten, der sich schon längere Zeit mit Untersuchung fossiler Gewächse beschäftigt, ist es geglückt, Blüthen aus der Braunkohle der Wetterau zu empfangen, in denen er noch wohlerhaltenen *Pollen* von bestimmter Form entdeckte. Die nähere Beschreibung und Abbildung dieser merkwürdigen Pflanze der Vorwelt, die Einsender der Mittheilung des Hrn. Hofr. Keferstein verdankt, werden die nächsten Verhandlungen der k. k. Leopoldinisch-Carolin. Akademie hieselbst liefern."

Breslau den 15. März. H. R. Göppert, Prof.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0054-3

Für das Herbarium sendet:

1) Hr. Apoth. Grabowski in Oppeln: eine Auswahl vorzüglich seltner schlesischer Gewächse.

2) Hr. Dr. E. Frivaldszky in Pesth: 1½ Centurie seltner Pflanzen aus der europäischen Türkei.

Den botanischen Garten bereichert Hr. Ruppprecht in Wien mit Stecklingen sämmtlicher von ihm cultivirter Varietäten des *Chrysanthem. indicum.*

Die königl. Gesellschaft sieht sich wiederholt in dem angenehmen Fall, für diese zahlreichen und grösstentheils sehr werthvollen Geschenke ihren auswärtigen Freunden und Correspondenten den innigsten Dank hiemit öffentlich auszudrücken.

III. Botanische Notizen.

So eben am Schlusse dieses Blattes erhalten wir folgende interessante Mittheilung des Hrn. Prof. Göppert, die wir um so schneller mittheilen zu müssen glauben, als sie durch eine unerklärliche Verspätung erst jetzt in unsere Hände gelangt ist.

„Dem Unterzeichneten, der sich schon längere Zeit mit Untersuchung fossiler Gewächse beschäftigt, ist es geglückt, Blüthen aus der Braunkohle der Wetterau zu empfangen, in denen er noch wohlerhaltenen *Pollen* von bestimmter Form entdeckte. Die nähere Beschreibung und Abbildung dieser merkwürdigen Pflanze der Vorwelt, die Einsender der Mittheilung des Hrn. Hofr. Keferstein verdankt, werden die nächsten Verhandlungen der k. k. Leopoldinisch-Carolin. Akademie hieselbst liefern."

Breslau den 15. März. H. R. Göppert, Prof.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05180-0054-3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1836

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Tausch Ignaz Friedrich

Artikel/Article: Botanische Beobachtungen 417-432