XV.

Verzeichniß jener Pflanzen, die ich im Jahr 1793 in der hiesigen Gegend gesammelt, und eingelegt habe. Vom Herrn Beneficiat Schmidt in Rosenheim.

Acer campestre.
Achillea Ptarmica, selten.
— flore pleno, wild.
Adonis autumnalis.
Adoxa Moschatellina.
Aegopodium Podagraria.
Aira flexuosa.
Ajuga pyramidalis.
Alchemilla alpina.
Allium Moly ?
— vineale, selten.
— urfinum, häufig.
Alopecurus agrestis.
Amaranthus Blitum.
Anagallis arvensis.
— phoenicea Schranck.
Andromeda poliifolia.

Anthericum calyculatum.
— ramosum.
Anthoxanthum odoratum.
Aquilegia vulgaris, wild.
Arabis alpina.
— thaliana.
Arenaria serpyllifolia.
— trinervia.
Arnica Bellidiastrum.
— montana.
Asperula odorata.
Asplenium Trichomanes.
Astrantia major.
Atropa Belladona, häufig.
Brassica Napus.
Campanula glomerata.
— patula.
— Speculum, selten.
Cardamine amara.
Centaurea montana.
— Scabiosa.
Cerastium arvense.
— strictum.
Circaea alpina, selten.
— lutetiana.
Chaerophyllum sylvestre.
Colutea frutescens.

Convallaria bifolia.
— multiflora.
— polygonatum.
— verticillata.
Cornus sanguinea.
Crataegus Aria.
— Oxyacantha.
Cucubalus bacciferus.
Cyperus fuscus.
Cypripedium Calceolus.
Dentaria bulbifera.
— pentaphyllos.
Draba verna.
Echium vulgare.
Epilobium angustifolium flore albo.
— grandiflorum.
— parviflorum.
— roseum.
Equisetum arvense.
— palustre.
— sylvaticum.
Erica carnea.
Erigeron acre.
— canadense.
Eriophorum polystachion.
— vaginatum.
Eupatorium cannabinum.

Euphorbia Lathyris, in meinem Garten.
— platyphyllos.
— verrucosa.
Euphrasia Odontites.
Evonymus europaeus.
Festuca fluitans.
Fumaria bulbosa, häufig.
Galium Aparine.
— palustre.
— sylvaticum.
— pusillum.
— uliginosum.
— verum.
Genista germanica.
Gentiana asclepiadea.
— ciliata.
Geranium moschatum.
— palustre.
— sylvaticum.
Geum rivale.
— urbanum.
Gratiola officinalis. häufig.
Helleborus niger.
Hieracium Auricula.
— dubium.
— Pilosella.
— pyrenaicum.

Hypericum humifusum, häufig.
Hippocrepis comosa.
Hippophae rhamnoides, häufig.
Iasione montana.
Impatiens Noli tangere.
Inula dysenterica, häufig.
— salicina.
Iris pseudoacorus.
Iuncus articulatus.
— bufonius.
— campestris.
— pilosus.
Lathraea squammaria, häufig.
Leontodon autumnale.
— danubiale.
Leonurus Cardiaca.
Lichen caninus.
— ciliaris.
— islandicus.
— saxatilis.
— scriptus.
Lonicera Xylosteum.
Lunaria annua.
Lycopodium radicans, häufig.
Lysimachia vulgaris, zweierley Abarten davon.
— nemorum.
— thyrsiflora.

Marsilea quadrifolia, ohne Zahl.
Martynia annua.
Medicago falcata.
— lupulina.
Melampyrum pratense.
— sylvaticum.
Mercurialis perennis, häufig.
Mespilus Amelanchier.
Moehringia muscosa.
Momordica Elaterium, häufig.
Myagrum paniculatum.
Myosotis annua Sehranck.
— palustris Roth.
Myriophyllum verticillatum.
Nigella damascena.
Nymphaea lutea.
Ophrys Corallorhiza,
— Monorchis.
— ovata, häufig.
Orchis bifolia.
— latifolia.
— maculata.
— militaris.
— Morio.
— sambucina.
Origanum Majorana.
Oxalis Acetosella.

Papaver Rhoeas
— Somniferum.
Paris quadrifolia, häufig.
Pedicularis paluſtris.
Phyteuma orbicularis.
— ſpicata.
Pinguicula alpina.
— vulgaris, häufig.
Pollichia Galeobdolon.
Polycnemum arvenſe.
Polygala amara.
— Chamaebuxus.
— vulgaris.
Polygonum Biſtorta.
Polypodium Lonchitis.
— Thelipteris.
Potamogeton lucens.
— natans, häufig.
Potentilla opaca.
— verna.
Prunus Padus.
— ſpinoſa.
Pulmonaria anguſtifolia, ſelten.
Ranunculus aconitifolius, häufig.
— alpeſtris häufig.
— bulboſus.
— divaricatus.

Ranunculus nivalis.
— peltatus.
— peucedanifolius.
— sceleratus.
Rhamnus catharticus.
— Frangula.
Rhinanthus Alectorolophus.
Rumex Acetosella.
— alpinus.
— crispus.
— sanguineus.
Sagina procumbens.
Sagittaria sagittifolia.
Salix monandra.
Salvia pratensis.
— officinalis.
Sambucus nigra.
— racemosa.
Scabiosa columbaria.
— sylvatica.
Scherardia arvensis.
Scrophularia aquatica.
— nodosa.
Sedum acre.
— album.
Senecio Jacobaea.
Serapias ensifolia.

Serapias rubra.
Silene rupeſtris.
Siſon inundatum, häufig.
Siſymbrium amphybium.
Sium latifolium.
Solanum Dulcamara.
Soldanella alpina.
Solidago Virga aurea.
Spergula arvenſis.
— nodoſa.
Spiraea Aruncus.
Stachys paluſtris.
Stellaria graminea.
Symphytum tuberoſum.
Tamarix germanica.
Taxus baccata.
Teucrium Scordium.
Thalictrum aquilegifolium.
Thlaſpi arvenſe.
— Burſa paſtoris.
— ſaxatile.
Thymus Acinos.
— alpinus.
— Serpyllum.
Tilia europaea.
— cordata.
Trollius europaeus.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04916-0248-3

Turritis hirsuta.
Tussilago alpina.
— hybrida.
Urtica pilulifera, wild.
Vaccinium Myrtillus.
— Oxycoccos.
— uliginosum.
— Vitis idaea.
Valantia cruciata.
Valeriana dioica.
— officinalis.
— saxatilis.
— tripteris.
Verbascum Blattaria.
— nigrum.
Veronica Lappago.
— serpyllifolia.
— urticaefolia.
Viburnum Opulus.
Vinca minor, häufig.
Viola biflora.
— canina.
— hirta.

Erheblichere Druckfehler.

Seite		Zeile				
Seite	21.	Zeile	6.	Materica	lies	Materia.
—	24.	—	2.		—	
—	—	—	3.	Jene	—	iene.
—	47.	—	17.	phisiologisch	lies	physiologisch.
—	—	—	20.	phisiologischen	—	physiologischen.
—	48.	—	1.	aus	—	in
—	113.	—	23.	Halitus	—	Habitus.
—	125.	—	20.	Lesebüchern	—	Lehrbüchern.
—	161.	—	4.	Heracleum Angelica sylvestris.	—	Angelica sylvestris.
—	168.	—	22.	Polypodium foemina	lies	Polypodium Filix foemina
—	169.	—	1.	Adianthum	wird	ausgestrichen.
—	175.	—	2.	enthällt	—	enthält.
—	194.	—	21.	abgenommen	lies	abgewonnen.
—	212.	—	14.	Abhandlung	—	Abhandlung.
—	216.	—	12.	Lisimachia	—	Lysimachia.
—	219.	—	19.	daß	—	das
—	236.	—	8.	Achillea flore pleno.	—	Achillea Ptarmica flore pleno.
—	237.	—	14.	Belladona	—	Belladonna.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst

Jahr/Year: 1794

Band/Volume: 1794

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: XV. Verzeichniß jener Pflanzen, die ich im Jahr 1793 in der hiesigen Gegend gesammelt, und eingelegt habe. Vom Herrn Beneficiat Schmidt in Rosenheim. 236-245