Anmerkung. Die Blätter vollkommen eyförmig, eben so fein als bey der Weißbirke, aber größer, und die kleinern Sägezähne noch schärfer als bei ihr, (die Länge des Blattes 2″3‴; die Breite 1″7‴); beide Seiten gleichgrün; die Zweige eckig: ihre Rinde rothbraun. Mir (sagt der Herr Verfasser) scheint sie hinlänglich von den Birken und Erlen verschieden, und eine eigene Art auszumachen, die zwischen beiden in der Mitte steht.“

---

## XI.

## Nachtrag zu dem Verzeichniße der Pflanzen, welche um Regensburg wild wachsen.

---

Der Herr Hofrath und Leibarzt Schäffer hat in dem schon erwehnten Versuche einer medicinischen Ortbeschreibung der Stadt Regensburg, u. s. w. das Nahmen-Verzeichniß der in dieser Gegend wachsenden Pflan-

Anmerkung. Die Blätter vollkommen eyförmig, eben so fein als bey der Weißbirke, aber größer, und die kleinern Sägezähne noch schärfer als bei ihr, (die Länge des Blattes 2″3‴; die Breite 1″7‴); beide Seiten gleichgrün; die Zweige eckig: ihre Rinde rothbraun. Mir (sagt der Herr Verfasser) scheint sie hinlänglich von den Birken und Erlen verschieden, und eine eigene Art auszumachen, die zwischen beiden in der Mitte steht.“

---

## XI.

## Nachtrag zu dem Verzeichniße der Pflanzen, welche um Regensburg wild wachsen.

---

Der Herr Hofrath und Leibarzt Schäffer hat in dem schon erwehnten Versuche einer medicinischen Ortbeschreibung der Stadt Regensburg, u. s. w. das Nahmen-Verzeichniß der in dieser Gegend wachsenden Pflan-

zen mitgetheilt. Seit zwey Jahren habe ich diese Gegend öfters durchbotanisirt, und noch mehr Pflanzen angetroffen; einige auch meinen botanischen Freunden zu verdanken. Sämmtliche Pflanzen trage ich gegenwärtig nach, und ich finde es billig, denen, die von meinen Freunden zuerst gefunden worden, ihren Nahmen beyzusetzen, um sie zu mehrern Entdeckungen in dieser pflanzenreichen von Botanisten noch so wenig besuchten Gegend aufzumuntern, und ihnen meine Dankbegierde öffentlich zu bezeigen.

## *I.* Classis. Monandria.

Callitriche,
autumnalis, Herbstwasserstern.

## *II.* Classis. Diandria.

Veronica,
scutellata, schildförmiger Ehrenpreis.
Utricularia,
vulgaris, gemeiner Wasserschlauch.

## *III.* Classis. Triandria.

Schoenus,
nigricans, schwärzliches Strickgras.

Scirpus,
maritimus, Meerstrandsſemſen.
Panicum,
ſanguinale, Bluthirſe. (Duval.)
Cynoſurus,
durus, hartes Kammgras.

## *IV.* Classis. Tetrandria.

Cuſcuta,
Epithymum, kleine Flachsſeide.
Potamogeton,
criſpum, krauſeblättriges Saamkraut.
gramineum, grasartiges Saamkraut.
puſillum, kleines Saamkraut.
marinum, Meer-Saamkraut. (Funck.)

## *V.* Classis. Pentandria.

Lithoſpermum,
purpureo coeruleum, purpurblauer Steinſaamen.
Lyſimachia,
thyrſiflora, Sumpfweiderich. (Funck.)
Anagallis,
coerulea, blauer Gauchheil.
Atropa,
Belladonna, Tollbeeren.

Chenopodium,
polyspermum, vielsaamiger Gänsefuß.
Caucalis,
grandiflora, großblümiger Klettenkörbel.
Selinum,
Chabraei, Chabre's Silge.
Sium,
angustifolium, schmalblättriger Wassermerk.
Pimpinella,
magna, große Pimpinelle.
Sambucus,
racemosa, traubenförmiger Holunder.
Linum,
tenuifolium, schmalblättriger Lein.
perenne, beständiger Lein.

## *VI.* Classis. Hexandria.

Ornithogalum,
nutans, überhängende Vogelmilch. (Funck.)
Scilla,
bifolia, zweyblättriger Sternhyacinth.

## *VIII.* Classis. Octandria.

Epilobium,
parviflorum Schreb. kleinblumiger Weiderich.

## X. Classis. Decandria.

Dianthus,
Armeria, wilde Bartnelke.
Cucubalus,
bacciferus, Beerentragender Behen. (Funck.)
Arenaria,
tenuifolia, schmalblättriges Sandkraut.
Sedum,
villosum, rauhe Fettehenne.

## XI. Classis. Dodecandria.

Euphorbia,
Lathyris, Springkraut. (Funck.)
helioscopia, Sonnen-Euphorbie.

## XII. Classis. Icosandria.

Pyrus,
communis, wilder Birnbaum.
Malus, wilder Holzapfelbaum.
Potentilla,
opaca, schattige Potentille.

## XIII. Classis. Polyandria.

Aconitum,
Napellus, blauer Sturmhut.
Adonis,
vernalis, Frühlingsadonis.

## XIV. Classis. Didynamia.

Mentha,
gentilis, kleine Müntze.
Stachys,
germanica, teutscher Roßpoley. (Stallknecht.)
arvensis, Acker-Roßpoley.
Melissa,
Nepeta, Katzen-Melisse. (Stallknecht.)
Prunella,
grandiflora, großblümige Prunelle.
Antirrhinum,
Cymbalaria. Cymbelkraut. (Duval.)
majus, großer Dorant.

## XV. Classis. Tetradynamia.

Cochlearia,
Armoracia, Meerrettig. (Funck.)
Sisymbrium,
arenosum, Sandrauke.

## XVI. Classis. Monadelphia.

Geranium,
syluaticum, Wald-Storchenschnabel.

## XVII. Classis. Diadelphia.

Pisum,
arvense, Acker-Erbse.

Ervum,
monanthos, einblumige Linse.
Colutea,
arboreſcens, baumartige Blasleinſenne. (Funck.)
Aſtragalus,
Cicer, kichernartiger Traganth.
Trifolium,
aureum Pollich, Goldklee.

## XVIII. Classis. Polyadelphia.

Hypericum,
humifuſum, kleinſtes Johanniskraut.

## XIX. Classis. Syngenesia.

Scorzonera,
lanata Schrankii, wollige Scorzonere.
Leontodon,
hiſpidum, mit ſteifen Borſten beſezter Löwenzahn.
danubiale Pollich. An der Donau wachſender Löwenzahn.
Carduus,
paluſtris, Sumpf-Diſtel.
Tuſſilago,
Petaſites, Peſtilenzwurz.

Aſter,
annuus, jährige Sternblume.
Calendula,
officinalis, gewöhnliche Ringelblume.
Viola,
montana, Bergviole.

## XX. Classis. Gynandria.

Serapias,
Lonchophyllum, weiße Stendelwurz.

## XXI. Classis. Monoecia.

Carex,
brizoides. zittergrasartige Segge.
axillaris, Achſelſegge.
caneſcens, graulichte Segge.
diandra Schranck. Zweymännige Segge.
paniculata, riſpenförmige Segge.
praecox Jacq. Frühlings-Segge.
ericetorum Pollich. Heide-Segge.
filiformis, fadenförmige Segge.
glauca Scopol. meergrüne Segge.
Amaranthus,
Blitum, Maier-Amaranth.

## XXII. Classis. Dioecia.

Salix,

repens, kriechende Weide.
aurita, rundblättrige Werftweide.
Hydrocharis,
morsus ranae, Froschbiß.
Taxus,
baccata, Beerentragender Eibenbaum.

*XXIII.* CLASSIS. POLYGAMIA.

Acer,
platanoides, Berg-Ahorn, Lehne.

*XXIV.* CLASSIS. CRYPTOGAMIA.

Polypodium,
Phegopteris, Buchen-Tüpfelfarn (Funck)
crenatum Schranck. gekerbter Tüpfelfarn.
Polytrichum,
serratum Schranck. sägeartiges Haarmoos.
Mnium,
pellucidum, durchscheinendes Sternmoos.
fontanum, Quell-Sternmoos.
palustre, Sumpf-Sternmoos.
hygrometricum, hygrometisches Sternm.
Bryum,
glaucum, meergrünes Knotenmoos.
viridulum, grünlichtes Knotenmoos.
caespititium, Rasen-Knotenmoos.
striatum sylvaticum, gestreiftes Knotenmoos. (Duval)

Hypnum,
delicatulum, zartes Aſtmoos.
criſta caſtrenſis, Federbuſch-Aſtmoos.
abietinum, Tannen-Aſtmoos.
compreſſum, zuſammengedrücktes Aſtmoos.
ſquarroſum, ſperrichtes Aſtmoos.
dendroides, Bäumchen-Aſtmoos.
ſericeum, ſeidenartiges Aſtmoos.
ſerpens, kriechendes Aſtmoos.

Jungermannia,
aſplenioides, Milzkraut-Jungermannie.
bicuſpidata, zweyfachgeſpitzte Jungermannie.
complanata, plattſchuppigte Jungermannie. (Funck.)
epiphylla, Blätterblühende Jungermannie.

Marchantia,
conica, Kegelförmige Marchantie.

Lichen,
ſcriptus, characteriſtiſche Flechte. (Funck)
pertuſus, durchſtochene Flechte. (Funck)
fuſco-ater, braunſchwarze Flechte.
atroalbus, weißſchwarze Flechte. (Duval)
cinereus, graue Flechte.
niger, ſchwarze Flechte.
fagineus, Buchenflechte.
ſubfuſcus, braune Schildflechte. (Duval)

pulmonarius, Lungen-Flechte.
furfuraceus, Kleyenartige Flechte.
farinaceus, mehlichte Flechte.
subulatus, pfriemenförmige Flechte.
floridus, Sterntragende Flechte.

Tremella,
Juniperina, Wachholdergallerte. (Duval)
Nostoch, Nostoch. (Funck)

Byssus,
velutina, seidenartige Staubpflanze.
antiquitatis, schwarze Staubpflanze.
saxatilis, Stein-Staubpflanze.
candelarius, Licht-Staubpflanze.
lactea, Kalkartige Staubpflanze. (Duval)

---

## XII.

## Beyträge zu des Herrn Dr. Roths Tentamen Florae germanicae.

---

### Pentandria, Mononynia.

1. Symphitum tuberosum.
S. foliis semidecurrentibus: summis op-

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst

Jahr/Year: 1790

Band/Volume: 1790

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: XI. Nachtrag zu dem Verzeichniße der Pflanzen, welche um Regensburg wild wachsen 115-125