pulmonarius, Lungen-Flechte.
furfuraceus, Kleyenartige Flechte.
farinaceus, mehlichte Flechte.
subulatus, pfriemenförmige Flechte.
floridus, Sterntragende Flechte.

Tremella,
Juniperina, Wachholdergallerte. (Duval)
Nostoch, Nostoch. (Funck)

Byssus,
velutina, seidenartige Staubpflanze.
antiquitatis, schwarze Staubpflanze.
saxatilis, Stein-Staubpflanze.
candelarius, Licht-Staubpflanze.
lactea, Kalkartige Staubpflanze. (Duval)

XII.

Beyträge zu des Herrn Dr. Roths Tentamen Florae germanicae.

Pentandria, Mononynia.

1. Symphitum tuberosum.
S. foliis semidecurrentibus: summis op-

pulmonarius, Lungen-Flechte.
furfuraceus, Kleyenartige Flechte.
farinaceus, mehlichte Flechte.
subulatus, pfriemenförmige Flechte.
floridus, Sterntragende Flechte.

Tremella,
Juniperina, Wachholdergallerte. (Duval)
Nostoch, Nostoch. (Funck)

Byssus,
velutina, seidenartige Staubpflanze.
antiquitatis, schwarze Staubpflanze.
saxatilis, Stein-Staubpflanze.
candelarius, Licht-Staubpflanze.
lactea, Kalkartige Staubpflanze. (Duval)

XII.

Beyträge zu des Herrn Dr. Roths Tentamen Florae germanicae.

Pentandria, Mononynia.

1. Symphitum tuberosum.
S. foliis semidecurrentibus: summis op-

positis. Linn. syst. veget. p. 187. Baiersche Flora Nr. 336. Ectyp. pl. ratisb. Tab. 37.

Hab. in nemoribus umbrosis subhumidis prope Ratisb. et in Palatinat. sup. 24

Digynia.

2. Selinum Chabraei.

S. vaginis foliorum caulinorum planis flaccidis pendulis. Linn. syst. veget. pag. 279. Baiersche Flora Nr. 464. Herb. viv. pl. select. Nr. 12.

Hab. in sylvaticis umbrosis prope Ratisbonam passim. 24.

Hexandria, Monogynia.

3. Scilla bifolia.

S. floribus erectiusculis paucioribus. Linn. syst. veg. p. 329. Baiersche Flor. Nr. 535.

Habit. in Insul. danubial. prope Ratisb. copiose. 24.

Octandria, Monogynia.

4. Erica herbacea.

E. antheris muticis exsertis, corollis oblongis, stylo exserto, foliis quaternis floribus secundis. Linn. syst. veg. p. 370.

Erica carnea Baierſche Flora Nr. 601.
Eſt. pl. ratisb. Tab. 42.
Hab. in pinetis ſabuloſis prope Ratisbonam et in Palatinat. ſuperior. copioſe. ♄.

Didynamia, Gymnoſpermia.

5. Meliſſa Nepeta.
M. pedunculis axilaribus dichotomis folio longioribus, caule adſcendente hirſuto. Linn. ſyſt. veget. p. 542.
Eſt. pl. ratisb. Tab. 397.
Habit. in montoſis aſperis prope Stauf. circa Ratisb. copioſe. ♃.

Diadelphia, Decandria.

6. Cytiſus capitatus.
C. floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, foliolis ovatis. Linn. ſyſt. veg. p. 666. Eſt. pl. ratisb. Tab. 399.
Habit. in nemoribus umbroſis circa Ratisbonam copioſe. ♄.

7. Cytiſus ſupinus.
C. floribus pedunculatis ſubbinatis, foliis villoſis, caulibus decumbentibus fruteſcentibus. Linn. ſyſt. veget. p. 667.
Eſt. pl. ratisb. Tab. 46.

Habit. in asperis saxosis circa. Ratisbonam frequens. ♄.

Monoecia, Triandria.

8. Carex ericetorum.

C. spica mascula terminali obverse ovata, obtusa; foemineis sessilibus ovatis, capsulis pubescentibus. Poll. flor. palat. Nr. 886. Baiersche Flora Nr. 147. Herb. viv. pl. select. Nr. 48.

Habit. in collibus apricis arenosis, circa Ratisbonam copiose. 4.

XIII.

Botanische Briefe.

Dritter Brief.

Ich wählte im Anfange des Brachmonaths die sogenannten Schwefelweissen Berge, zu meiner Excursion, welche sich vor einigen Jahren durch eine unterirdische Naturerscheinung bekannt gemacht haben, und an der

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst

Jahr/Year: 1790

Band/Volume: 1790

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: XII. Einträge zu des Herrn Dr. Roths Tentamen Florae germanicae. 125-128