19. Polygala amara.
20. Cytisus capitatus.
21. Chrysocoma Linosyris.
22. Carex humilis Leyss.
23. — brizoides.
24. Holcus odoratus.
25. Polypodium Dryopteris.

XX.

Erklärung der Abbildungen.

Tab. 1. Lycopodium clavatum foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. Linn. system. veg. p. 942. Kolbenmooß, Bärlapp, Trutenfuß.

Anmerkung. Der Saame dieses Gewächses ist in Apotheken unter dem Nahmen Sem. Lycopodii bekannt genug; das Gewächs selbst aber ist wohl nicht so allgemein bekannt, da man es an den wenigsten Orten selbst sammelt, ob es gleich fast überall wächst. Es giebt einige Abarten, welche einzelne oder

auch drey Aehren haben; bey mehrern Exemplaren dieses Taschenbuchs sind solche Abarten abgedruckt.

Tab. 2. Heriteria anthericoides. Baierſche Flora erſter Band Nro. 580.

Scheuchzeria Pseudoasphodelus foliis ensiformibus, bracteis triphyllis stipulaceis Roth. Tent. flor. germ. Tom. I. p. 159. Tom. II. pag. 419. cum descriptione.

Gedrukt mit Zeitleriſchen Schriften.

Errata:

Seite	Zeile	ſtatt	lies
5	13	denjenigen	diejenigen
15	13	Jhnen	Sie
—	16	Jhnen	Sie
24	12	Negensburg	Regensburg
30	3	Blumne	Blume
36	4	überhaupt	überhaupt
38	11	haben	habe

Regensburgische Botanische Gesellschaft

TAB . I



Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0227-3

TAB . II



Regensburgische
Botanische
Gesellschaft

Universitätsbibliothek
Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr04790-0228-9

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst

Jahr/Year: 1790

Band/Volume: 1790

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: XX. Erklärung der Abbildungen 181-182