

d'un beau violet, rarement blanches, disposées par petits paquets. ①. Mai-juillet. (V. D.)

Décombres, lieux cultivés. — Aia. Sous le rocher de Pierre-Châtel, à l'entrée des grottes. R.

364. CYNOGLOSSUM (Tournef.). CYNOGLOSSE.

Calice à 3 segments égaux; corolle en entonnoir, à tube court, à gorge fermée par des écailles convexes, conniventes, épaissies au sommet; fruit formé de 4 carpelles comprimés, attachés au style par leur face interne. Plantes herbacées.

* Corolle en entonnoir; style allongé et persistant.

1410. C. OFFICINALE (L.). C. OFFICINALE. (Vulg. Langue-de-chien.)

Plante couverte d'une pubescence courte et grisâtre, et exhaltant une odeur fade et fétide. Tige de 4-8 déc., droite, rameuse; f. molles, oblongues-lancéolées, les inf. rétrécies en pétiole, les sup. demi-amplexicaules; carpelles à surface sup. plane et entourée d'un rebord saillant; fl. d'un rouge sale, non veinées, disposées en grappes terminales et axillaires. ②. Mai-juillet. (V. D.)

b. var. *bicolor*. Fl. blanches, à gorge d'un rouge sale.

c. var. *angustifolia*. F. lancéolées et très-étroites.

Bord des chemins, lieux incultes. A. C. — Var. c. Au-dessus de Couzon, au pied des carrières.

1411. C. PICTUM (Ait.). C. À FLEURS RATÉES.

Diffère du précédent 1° par les carpelles à surface sup. un peu convexe et dépourvue de rebord saillant; 2° par les fl. d'un bleu pâle, rayées de blanc et de violet. ②. Mai-juillet. (V. D.)

Bord des chemins, lieux incultes; mais moins commune que la précédente.

1412. C. MONTANUM (L.). C. DE MONTAGNE.

Tige de 4-8 déc., droite, rameuse; f. luisantes et presque glabres en dessus, parsemées en dessous de quelques poils un peu rudes, les inf. elliptiques et atténuées en pétiole, les moyennes rétrécies à la base et comme spatulées, les sup. oblongues et demi-amplexicaules; carpelles non entourés ou à peine entourés d'un rebord; fl. rougeâtres ou violacées, non veinées, disposées en grappes grêles, non accompagnées de bractées. ②. Juin-juillet.

Forêt d'Arvières, sur le Colombier du Bugey. R.

** Corolle en soucoupe; style très-court.

1413 C. LAPPULA (Scop.). C. BARDANE. — C. Clusii (Lois.). — *Myosotis lappula* (L.). — *Echinospermum lappula* (Lehm.).

Plante hérissée de poils rudes. Tige de 2-4 déc., droite, ferme, rameuse au sommet; f. oblongues, les inf. atténuées en pétiole, très-rudes, couvertes dans leur vieillesse de petits