Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

Bulletin de la Société Botanique de France

ISSN: 0037-8941 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tabg17

Rapport Sur L'herborisation Du 21 Juillet Au Reculet

M. V. Personnat

To cite this article: M. V. Personnat (1869) Rapport Sur L'herborisation Du 21 Juillet Au Reculet, Bulletin de la Société Botanique de France, 16:10, XCIX-CIII, DOI: 10.1080/00378941.1869.10839533

To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1869.10839533


Published online: 08 Jul 2014.


Submit your article to this journal


Article views: 5


View related articles

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17

Download by: [185.97.32.18] **Date:** 14 June 2016, At: 05:53

Nous remarquons l'abondance de certaines plantes dans les prés inclinés que nous traversons :

Trifolium cæspitosum.
Botrychium Lunaria.
Carex sempervirens.
Calamintha alpina.
Crocus vernus (fruits passés).

Nous entrons dans une partie de la forêt de sapins, où les rochers, entassés les uns sur les autres et couverts de mousse, rendent la marche extrêmement pénible ; la fatigue et les difficultés du chemin ne nous permettent pas d'herboriser facilement. Nous récoltons cependant :

Lycopodium annotinum.
— Selago.
Thalictrum aquilegifolium.
Anemone alpina.
— narcissiflora.
Maianthemum bifolium.
Rhododendron ferrugineum.
Sedum atratum.
Rosa alpina (et ses variétés).
Barbula tortuosa.
Rhamnus alpinus.
Chroolepus aureum (C.)
Erinus alpinus.
Campanula thyrsoidea (A.C.)
Daphne alpina.
Rubus saxatilis.
Polypodium Dryopteris.
Lysimachia nemorum.
Dentaria digitata.
Bartramia Halleriana.

Nous arrivons à un chemin moins fatigant ; la descente s'effectue rapidement par un sentier parallèle à celui par lequel nous avons monté. Nous revoyons au passage quelques espèces trouvées déjà le matin : *Mulgedium alpinum*, *Tozzia alpina*, *Trifolium montanum*, *Ribes petræum*, les *Dentaria* et les Anémones, etc. — Mais nous avons hâte de descendre et de prendre nos voitures. Nous rentrons aux Rousses à six heures.

RAPPORT DE M. V. PERSONNAT SUR L'HERBORISATION DU 21 JUILLET AU RECULET (1).

Le 20 juillet, j'arrivais à Gex, pensant y rejoindre la Société botanique, qui devait y tenir une séance ce jour-là, faire le lendemain une herborisation au Reculet, et clôturer sur ce sommet de 1720 mètres la session extraordinaire de 1869.

Je fis tout d'abord l'heureuse rencontre de mon ami, M. Baudin, receveur des contributions indirectes à Gex, et botaniste aussi habile que zélé, qui m'apprit que les dernières nouvelles de la Société s'arrêtaient aux Rousses ; qu'après une herborisation à la Dôle, ses membres avaient dû se séparer, renonçant, par des raisons encore inconnues, à accomplir jusqu'au bout le programme.

M. Baudin apprit bientôt que quelques autres botanistes de Genève et de

(1) Il a été décidé par la Commission du Bulletin que le compte rendu de cette herborisation, qui faisait partie du programme, serait très-utilement joint au numéro de la session du Jura.

Bulletin de la Société Botanique de France 1869.16:XCIX-CIII.

Savoie étaient venus, les uns jusqu'à Gex, quelques autres jusqu'à Ferney; mais étaient repartis presque aussitôt, aussi désappointés que nous l'étions nous-mêmes du contre-temps qui nous privait de l'honneur d'accompagner l'illustre professeur président de la session, et du plaisir de revoir nos amis des anciens jours.

Toutefois, moins abattus que nos confrères en l'aimable science des fleurs, nous résolûmes de compléter le programme et de nous rendre le lendemain au Reculet.

A dix heures du soir, M. Andreæ, pharmacien à Fleurier, arrivant de Nyons, et qui avait laissé la Société au Creux-du-Vent, décida qu'il se joindrait à nous, et le lendemain, 21, nous partions tous les trois pour Thoiry, dans la voiture de M. Baudin, gracieusement mise à notre disposition.

Notre but n'étant pas d'explorer la plaine, nous la traversâmes rapidement, en remarquant toutefois de magnifiques touffes de *Dianthus superbus* L. en pleine floraison sur la lisière des bois.

A sept heures, nous quittions Thoiry et commencions l'herborisation autour de la carrière, en cueillant les

Hieracium staticefolium Vill.	Hieracium decipiens G.G.
— Auricula L.	Fumaria procumbens G.G.
— prænltum Vill., et sa variété.	Epilobium rosmarinifolium Hœnke.

Au-dessus de la carrière et dans un petit bois de chênes, à une altitude d'environ 600 mètres, nous recueillîmes les espèces suivantes :

Trifolium medium L.	Campanula aggregata Nocca et Balb.
Pimpinella magna L, *var.* rosea Reut.	Melampyrum silvaticum L.
Bupleurum falcatum L.	Sideritis hyssopifolia L.
Peucedanum Oreoselinum Mœnch.	Phalangium ramosum Lam.
Libanotis montana All.	Epipactis atrorubens Hoffm.
Senecio flosculosus Jord.	

Nous entrâmes alors dans des taillis rocailleux et peu touffus, s'élevant en pente rapide jusqu'à la base des premiers rochers, entre 700 et 1000 mètres d'altitude, et où nous pûmes successivement récolter :

Dianthus monspessulanus L.	Abies pectinata DC.
Cotoneaster vulgaris Lindl.	Juniperus alpina Clus.
Arctostaphylos officinalis Wimm. et *var.* angustifolia Payot.	Cracca major Franken.
	Calamagrostis varia Schrad.
Amelanchier vulgaris Mœnch.	Festuca glauca Schrad.
Genista tinctoria L.	Brachypodium pinnatum Rœm. et Schult.
Galium verum L. (que M. Andreæ suppose devoir produire une matière colorante assez abondante).	Bromus erectus Huds.
	Kœleria cristata Pers.
	Elymus europæus L.
Gentiana Cruciata L.	

Laissant alors à droite le *Creux-de-Prancieux*, par lequel nous comptions redescendre, nous grimpâmes par un soleil brûlant une assise de roches

Bulletin de la Société Botanique de France 1869.16:XCIX-CIII.

calcaires nues et escarpées qui nous offrirent une végétation magnifique et une abondante récolte, dont les espèces principales furent :

Laserpitium Siler L.
Globularia vulgaris L.
— cordifolia L.
Alsine Bauhinorum Gay.
Scrofularia Hoppii Koch.
Centaurea alpestris Hegetschw.
Sempervivum juratense Jord.
Teucrium montanum L.
Helianthemum grandiflorum DC.
Hypericum Richeri Vill.
Leucanthemum atratum Timb.-Lag.

Nous étions à bout de forces, la chaleur nous accablait, la roideur de la pente nous essoufflait outre mesure, et par-dessus tout, le défaut absolu d'eau nous empêchait d'étancher une soif ardente depuis plus d'une heure, quand nous aperçûmes avec bonheur le chalet d'Ardran, où nous reçûmes un accueil des plus affables et des plus gracieux.

Bien différents des chalets des Alpes, ceux du Jura, et particulièrement celui d'Ardran, se distinguent par une propreté excessive, au dedans comme au dehors ; par des chambres hautes et spacieuses, par un aménagement relativement luxueux, une *fruitière* très-bien tenue et des étables assez vastes pour que le bétail puisse s'y coucher à l'aise.

A midi, nous nous remettions en marche, et dans le vallon même d'Ardran, entre 15 et 1600^{m} d'altitude, sur les pentes herbeuses qui descendent à gauche des rochers supérieurs, nous nous trouvâmes en présence d'une végétation luxuriante, entretenue par des tapis de Mousse, humectée d'eau suintant de la roche. L'énumération des magnifiques récoltes que nous fîmes sur ce petit coin de terre, haut de 100 mètres et large à peine de 200, suffira pour donner une idée des impressions qu'il nous produisait à chaque pas :

Anemone narcissiflora L.
Ranunculus Thora L. et R. aconitifolius L.
Aconitum Anthora L.
Silene quadrifida L.
Gypsophila repens L.
Sagina Linnæi Presl.
Alsine verna L.
Geranium phæum L.
Lathyrus montanus G.G.
Alchimilla vulgaris L.
Geum rivale L.
Sorbus Chamæmespilus Crantz.
Saxifraga oppositifolia L.
— Aizoon L.
Bupleurum longifolium L.
Chærophyllum aureum L.
Astrantia major L.
Valeriana montana L.
Homogyne alpina Cass.
Adenostyles alpina Koch.
Solidago alpestris W. et K.
Senecio Doronicum L.
Soyeria paludosa Godr.
Hieracium villosum L.
— elongatum Willd.
Phyteuma orbiculare L.
Campanula thyrsoidea L.
Pedicularis foliosa L.
Thesium pratense Ehrh.
Euphorbia verrucosa β. montana Caud.
— angulata Jacq.
Lilium Martagon L.
Orchis globosa L.
Nigritella angustifolia Rich.

Quittant à regret ce riant vallon, dont bien certainement nous n'emportions pas toutes les raretés, nous atteignions bientôt un ravin semé de :

Linaria petræa Jord.
Silene brachyata Jord.
Scrofularia Hoppii Koch.
Scabiosa lucida Vill.
Anthyllis Vulneraria L.

Bulletin de la Société Botanique de France 1869.16:XCIX-CIII.

au-dessus duquel nous nous trouvons au pied de la calotte du Reculet. Nous cueillons encore, en l'escaladant, sur les rochers :

Bartsia alpina L.
Bellidiastrum Michelii Cass.
Saxifraga muscoides Wulf.
Draba aizoides L.
Cystopteris fragilis Bernh.
Asplenium viride Huds.

et sur les pâturages, rocailleux ou humides :

Dianthus cæsius Sm.
— juratensis Jord.
Sedum acre L.
Athamanta cretensis L.
Scabiosa lucida Vill.
Galium anisophyllon Vill.
Erigeron alpinus L.
Pinguicula vulgaris L.
Hutchinsia alpina R. Br.
Dryas octopetala L.
Myosotis alpestris Schm.
Saxifraga Aizoon L.
Antennaria dioica DC.
Oxytropis montana DC.
Polygonum viviparum L.
Soldanella alpina L.
Campanula thyrsoides L.
Gentiana Kochiana Perr. et Song.
Urtica dioica L.
Antennaria dioica DC.
Poa alpina L. β. brevifolia G.G.

A ce moment, un splendide panorama se déroule à nos pieds. Nous sommes sur le point culminant du Sâra, à 1720^{m} ; nous dominons d'un côté toutes les cîmes du Bugey, nous devinons le cours du Rhône dans les profondes crevasses qui vont finir aux portes de Lyon ; derrière le fleuve nous apercevons les premiers contre-forts des Alpes dauphinoises ; au nord, nous voyons le Jura, et à l'est Genève et son lac, les Alpes suisses, les Alpes de Savoie, et par dessus toutes les cîmes, se perdant dans les nues, le Mont-Blanc se dresse dans toute sa magique splendeur. Un temps magnifique nous favorise, et nous sommes émerveillés ! Ils étaient bien inspirés, les organisateurs de la session extraordinaire, en décidant une séance de clôture sur le Reculet, et combien nous regrettons que des empêchements, bien sérieux certainement, aient forcé nos maîtres et amis à renoncer à cette dernière partie du programme !

Après ces réflexions, nous reprenons la descente sur les chalets de Thoiry. Chemin faisant, nous récoltons successivement :

Rosa pimpinellifolia L. β. intermedia G.G.
Acer Pseudoplatanus L.
Alchimilla alpina L.
Carduus defloratus L.
Mœhringia muscosa L.
Pinguicula grandiflora Lam.
Bunium Carvi Bieb.
Rhododendron ferrugineum L.
Saxifraga rotundifolia L.
Gentiana lutea L.
Daphne Mezereum L.
Anemone narcissiflora L.
Lamium Galeobdolon Crantz.
Rumex scutatus L.
Centaurea montana L.
Arabis alpina L.
Orchis conopea L.
Erinus alpinus L.
Rhinanthus minor Ehrh.

Au-dessous des chalets de Thoiry, nous cueillons encore :

Plantago montana L.
Campanula rotundifolia var. confertifolia Reut.

Bulletin de la Société Botanique de France 1869.16:XCIX-CIII.

Du Creux-de-Pranciaux, nous emportons les *Trinia vulgaris* L., *Hieracium murorum* L., le *Campanula rhomboidalis* L., et le superbe *Cephalaria alpina* Schrad., qui couronne dignement notre magnifique herborisation.

Nous reprenons notre voiture à Thoiry, et à dix heures du soir, à notre arrivée à Gex, nous trouvons notre ami et confrère l'abbé Chevalier, et l'excellent docteur de Gex, nous attendant, désolés d'avoir ignoré notre départ et sincèrement jaloux de nos riches et abondantes récoltes.

Paris. — Imprimerie de E. Martinet, rue Mignon, 2.

Bulletin de la Société Botanique de France 1869.16:XCIX-CIII.