LXXVI. H. Wolff, *Azorella Dusenii* Patagonica et *A. Mutisiana* Colombiana species novae.

1. **Azorella Dusenii** Wolff, spec. nov. — Tota planta incana vel griseo-viridis glabra, laxe caespitosa. Caules (vel rami ?) semel vel repetite furcato-ramosi, 5—8 cm longi, inferne residuis foliorum emortuorum sat remotis obsiti. Folia pallido- vel incano-viridia, usque 2 cm longa; lamina plana anguste cuneato-ovata, subtus sparse strigosa vel utrinque glabra, 5—7 mm longa, obtusa, breviter triloba, lobo medio quam lateral. majore, omnibus acutis vel acutiusculis, mucronulatis, abrupte in petiolum angustum ½ mm latum quam lamina 2—3-plo longiorem subito in vaginam latam tenuiter suberosam, ad marginem longe albo-ciliato-setulosam dilatatam abiens. Umbellae sublaterales breviter (5 mm) pedunculatae; involucri phylla ± 5 late lanceolata, acuta vel obtusiuscula, inaequalia, pedicellis aequilonga. Flores 4—10; pedicelli inaequilongi quam flores semper longiores; sepala conspicua triangularia acuta. Fructus breviter ovoideo-cubicus a dorso manifeste compressus, ad commissuram angustissimam constrictus, obtuse quadrialatus 3 mm longus; mericarpia dorso levissime excavata, medio uninervia. — Patagonien: Sta. Cruz, auf Grasflächen im Tal des Baches Arrayo Pelgue (Dusén no. 5592); Rio Fosiles, Lago San Martin, 930 m ü. M. (Dusén no. 5960), mit Blüten und Früchten von Januar bis April (Dusén).

Azorella Mutisiana Hieron. msc. in Herb. Berol. — *A. crenata* (Ruiz et Pav.) Pers. var. *mutisiana* Hieron. msc. l. c. — *Fragosa crenata* Kunth in H. B. nov. gen. et spec. V. (1821) 21, von Ruiz et Pav. — *Azorella crenata* α. Wedd. Chlor. and. II. (1860) 195. — Laxissime caespitosa e radice crassa — in specim. vetust. — vel tenui — in specim. junior. — pluricaulis, ramosa vel ramosissima. Folia ad caules ramosque dense disposita, vetustiora vix destructa; petiolus tenuis sensim in vaginam angustam dilatatus ibique subcoriaceus, strigosus, usque 4 cm longus; lamina subcordato-ovata vel late ovata, ± 1½ cm longa et lata, margine toto basi excepta crenato-serrata dentibus superioribus obtusis, rotundatis, inferioribus ± obliquis acutis, utrinque strigosa. Umbellae parvae brevissime pedunculatae; involucri phylla ± 5 linearia acutissima, pellucida, pedicellos aequantia. Flores 5—7. — Colombia: Páramo da Guanacas, Cuaca, in locis humidis, 3000—3500 m s. m. (Lehmann no. 4753); loco non indicato: Mutis in Herb. Humboldt.