

Hab. in cultis ruderalis et viis circa Zara, Scardona, Traù. Flores caerulei. Floret a vere in aestatem. ☉.

Herba procumbens muricato-scabra, foliis oblongo-lanceolatis, saepe oppositis et secundis, integerrimis, floribus axillaribus fasciculatis, pedunculis brevibus in latis folio oppositum saepius dejectis.

CCCLXIX. *Cynoglossum* Tourn.

Instit. rei herb. p. 139. tab. 57.

Char. Calyx quinquefidus aut quinquepartitus, campanulatus, laciniis integris, fructiferis, patentissimis. Corolla hypocraterimorpha vel subrotata, fauce squamis convexis clausa. Achenia depressa undique glochidiata, marginata, gynobasio conico superne affixa. Class. Pentandria. Ord. Monogynia Syst. sex. —

1050. *Cynoglossum officinale* L. sp. pl. ed. II. p. 192.

C. foliis inferioribus ellipticis acutis in petiolum attenuatis, caulinis superioribus subcordato-amplexicaulibus, racemis simplicibus pluribus, corolla unicolore, acheniis dorso planis aequaliter glochidiatis.

var. α . collinum: foliis tomento molli canescentibus, superioribus subcordato-lanceolatis acutis. — Syn. C. officinale Host fl. austr. 1. p. 232. RCHB. fl. exc. p. 344. — Icon. SPENN. in NEES gen. pl. XVII. n. 5. Sow. engl. bot. pl. 92. f. 1. MATTH. sopra Diosc. ed. cit. p. 1250. — Illyr. Gavez. Jezik. passii. Tarpunjacz.

var. β . sylvaticum: foliis supra glabris, superioribus subcordato-oblongis acutis. — Syn. C. sylvaticum HAENKE in JACQ. coll. 2. p. 77. Host fl. austr. 1. p. 233. C. montanum LAM. fl. fr. ed. I. t. 2. p. 277. RCHB. l. c. C. officinale γ . L. sp. pl. ed. II. p. 193. — Icon. Sow. engl. bot. t. 1642. COL. ecphr. p. 175. SABBAT. h. rom. 2. tab. 38.

var. γ . parvifolium: foliis scabris utrinque albo tuberculato-strigulosis, superioribus subcordato-ovatis obtusis.

Hab. locis saxosis sylvaticis in Dalmatia montana supra Dernis, prope Verlika: var. γ . in montibus Vellebith. Flores purpureo-caerulei, venis concoloribus. Floret aestate. ♂.

Usus. Acheniis, vulgo semina, vis narcotica anodyna tribuebatur; nunc exsoleta.

1051. *Cynoglossum pictum* AIT. h. KEW. 1. p. 179. Vis. stirp. dalm. p. 33. Host fl. austr. 1. p. 233. RCHB. fl. exc. p. 344. ALSCH. fl. jadr. p. 48. PETT. bot. Wegw. n. 318.

C. albedo-tomentosum, foliis inferioribus ellipticis obtusis in petiolum attenuatis, caulinis superioribus subcordato-amplexicaulibus oblongo-lanceolatis, racemo conjugato, corolla venis discoloribus reticulata, acheniis dorso convexiusculis aequaliter glochidiatis.

Syn. C. creticum VILL. pl. du Dauph. 2. p. 157. C. cheirifolium JACQ. collect. 3. p. 30. ALSCH. fl. jadr. p. 48. ex herb! non L. — Icon. SIMS bot. mag 2134. cult. CLUS. hist. pl. V. p. 162. f. 2. — Illyr. Gavez. Gavez bjeli. Jezik passii. Tarpunjacz.

Hab. in apricis saxosis incultis, ad vias, ubique frequens. Flores pallide caerulei venis caeruleis reticulati. Floret a vere in aestatem. ♂.

Usus. Folia ulceribus imposita dolorem leniunt, et ad cicatricem disponunt.

Obs. Flores infimi, unus vel alter, interdum foliolo stipantur, et tale probabiliter specimen a memetipso missum, et sine fructu maturo cl. BERTOLONIUS habuit pro C. cheirifolio L. in Fr. ital. vol. II. p. 303. Sed haec species acheniis dorso concavis,